





~~No 150~~
150°

φ $\frac{10-78}{322}$

No 554

$\frac{0-8^{\circ}}{91-P}$ MK

Рубель, И. П.
[Т. 1]

1-й 2-й

ПОЛНЫЙ И ВСЕОБЩІЙ
ЛЕЧЕБНИКЪ,
ИЛИ
ПОЛНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ВРАЧЕ-
БНОЕ НАСТАВЛЕНІЕ НАРОДУ,

Содержащее въ себѣ ясное и подробное описаніе
всѣхъ возможныхъ признаковъ, всѣхъ причинъ и
разныхъ средствъ къ излеченію всякихъ какъ вну-
треннихъ, такъ и наружныхъ болѣзней, случаю-
щихся разнаго состоянія людямъ: съ показаніемъ
составовъ, дѣйствій и пріемовъ лекарствъ вкупѣ съ
осторожностями, при употребленіи оныхъ

наблюдаемыми,

которое на Латинскомъ языкѣ сочинилъ и Матема-
тическимъ образомъ въ седьми часяхъ расположилъ

ИВАНЪ ФРИДРИХЪ РИБЕЛЬ

Медицины Докторъ

и

Его Свѣщлоспи Князя и Курфирста Бранден-
бургскаго Совѣшникъ,

а на Россійскій языкъ перевелъ съ прѣобщеніемъ 24 хъ
гравированныхъ Анатомическихъ картинъ Ивана Веслин-
гійа Миндана, Кавалера и Анатоміи Доктора, и Фарма-
кологіи или науки о лекарствахъ Христіана Теофила
Зеде, при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ
Медицинскаго Факультета Студентъ

Гома Барсукъ - Мойсеевъ.

Изданіемъ Университетскаго переплетчика
Никишы Водомьянова.

ВЪ МОСКВѢ,

Печатана въ Университетской типографіи
у В. Озеркова 1791 года.



О Д О В Р Е Н І Е .

По приказанію Императорскаго Московскаго Университета Господь Кураторовъ я читалъ книгу подъ заглавіемъ: Полный и всеобщій Лечебникъ, и не нашелъ въ ней ничего противнаго наставленію, данному мнѣ о разсматриваніи печатаемыхъ въ Университетской Тилографіи книгъ: почему она и напечатана быть можетъ. Коллежскій Совѣтникъ, Краснорѣчія Профессоръ, Ценсоръ печатаемыхъ въ Университетской Тилографіи книгъ и Кавалеръ

АНТОНЪ БАРСОВЪ.

ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛѢСТВУ
Дѣйствительному Тайному Совѣшнику,
СЕНАТОРУ,

Медицинской Коллегіи
главному директору

и

Орденѣмъ бѣлаго орла и Св. Анны

КАВАЛЕРУ

ИВАНУ ФЕДОРОВИЧУ
ФОНЬ ФИТИНГОФУ

усерднѣйшее посвященіе.

ВТОРОЙ ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬНОСТЬВО

Милосливый Государь!

Видя многіе олыты кроткаго и благопріязненнаго снисхожденія Вашего, съ которымъ Вы изволите принимать всякіе безъизъятно труды, приносимые Вамъ въ усердную жертву, возымѣлъ смѣлость посвятить имени Вашего Высоколревосходительства сей мой переводъ, такъ какъ ясный знакъ искреннѣйшаго моего къ особѣ Вашей почтенія.

Никому посвященіе сіе такъ не прилично, какъ имени Вашего Высоколревосходительства, тѣмъ лаче, что твореніе сіе есть сообразно съ тѣмъ достохвальнымъ намѣреніемъ Вашимъ, чѣобы снабдить разными изящными врачебными книгами какъ всякаго добраго члена общества, стремящагося снискать познаніе строенія нашего оруднаго тѣла и приобрѣсть средства предварять будущія, и врачевать настоящія болѣзни, такъ наипаче тѣхъ, кои подъ кроткимъ

покровительствомъ вашимъ упражняют-
ся въ той спасительной для человѣче-
ства наукѣ, которой кругъ вѣренъ Вамъ
въ смотрѣніе, и съ которою все благо-
дѣнствіе общества тѣснѣйшимъ соля-
жено союзомъ.

Благосклонное принятіе Ваше сего по-
священія моего воспламенитъ во мнѣ
новое стремленіе къ подобнымъ сему упраж-
неніямъ, а щастіе мое превзойдетъ
мѣры, естли Ваше Высокопревосходи-
тельство позволите съ великодушіемъ,
чтобы я съ глубочайшимъ моимъ къ
особѣ Вашей почтеніемъ и совершенною
преданностію именовался всегда.

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХНДИТЕЛЬСТВО

Милосливый Государь!

Вашъ покорнѣйшій и преданнѣйшій слуга

Гома Барсукъ Мойсеевъ.



ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ

отъ Переводчика.

Хотя уже и много находится у насъ лечебныхъ книгъ, гдѣ предлагаются средства къ излеченію болѣзней, разрушающихъ наше здравіе; однако никакой, каковъ есть сей лечебникъ, къ начертанію котораго цѣлые 28 лѣтъ употреблялъ сочинитель, мы еще не имѣемъ на нашемъ природномъ языкѣ. Его довольно полная, его математическое расположеніе и всевозможное описаніе всѣхъ болѣзней, ихъ причинъ и признаковъ вкупѣ съ показаніемъ средствъ врачевать оныя, заслуживаютъ по справедливости всякую похвалу и уваженіе. А сіе самое и было причиною, что я принялъ трудъ перевести оный въ праздное отъ упражненій время съ иностраннаго на нашъ Россійскій языкъ.

Ничто столько не дѣлало мнѣ затрудненія въ семъ переводѣ, какъ техничeskіе, искусствамъ по есть изобрѣтенные и въ употребленіе введенные, термины: однако я къ изложенію оныхъ такъ, чтобы

Николаевъ 4 всакъ
Николаевъ 4

всякъ могъ разумѣть ихъ Россійски, употреблялъ всѣ возможныя мѣры, не зная впрочемъ, какъ покажется изложеніе оное читателямъ моимъ, коихъ усердія и пріязни ничто для меня вождельннѣе быть не можетъ, когда я въ такомъ случаѣ совершенно увѣренъ быть могу, что они, читая лечебникъ сей не изъ любопытства и пересужденія, но единственно для полученія изъ него себѣ какой либо пользы, копорая единственною цѣлю была его переложенія, извиняшъ всѣ мои, могущія случаться въ семъ, столь многого труда для меня спокующемъ, переводѣ ошибки, совершая тѣмъ такое награжденіе мое, копорого больше я и не желаю, и желать не могу.

Впрочемъ напоминая, что при употребленіи здѣсь представленныхъ разнаго рода лекарствъ всегда должно имѣть вниманіе какъ на лѣта, такъ и полъ, привычку, мѣсто и время, имѣю честь быть всѣмъ преданный слуга.

Предчж.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Объ

Анапомѣи или наукѣ, показывающей строеніе человѣческаго тѣла, также величину, сооруженіе и образъ частей машину онаго составляющихъ; какъ въ натуральномъ ихъ положеніи и связи, такъ и внѣ оныхъ, что ясно и подробно изображаютъ

Анапомическія карты, при концѣ перваго Тома сего Лечебника положенныя.

PLATE II

THESE PLATES ARE THE PROPERTY OF THE
LIBRARY OF THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY
AND ARE NOT TO BE LOANED OUT OR
REPRODUCED IN ANY MANNER WITHOUT
THE PERMISSION OF THE DIRECTOR
OF THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY

PLATE II. THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY

PLATE II. THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY



ГЛАВА I.

О раздѣленіи человѣческаго тѣла и его покровахъ.

§ 1. Знаніе искусственнаго разсѣченія и членораздробленія человѣческаго тѣла, показывающее строеніе или сооруженіе частей трупa, положеніе оныхъ и соединеніе однѣхъ съ другими, называется *Анатомія* (*) (*anatomia*).

(*) Слово *Анатомія* въ собственномъ и пѣсномъ смыслѣ взятое, означаетъ искусственное тѣлѣ разсѣченіе, каковое разсѣченіе въ пользу зрителей часто производится публично: вообще же и въ пространнѣшемъ смыслѣ взятое, знаменуетъ самое анатомическое познаніе всѣхъ частей, ихъ существа, соединенія и пользы, пріобрѣтенное либо изъ частаго разсма-триванія разсѣкаемыхъ тѣлѣ, и изъясненія искуснаго и довольно упражнявшагося анатомика, или изъ чтенія анатомическихъ книгъ, или изъ собственнаго тѣлоразсѣченія. Почему и *Анатомія* раздѣляется на Теоретическую или Умозрительную, и Практическую или Опытную, изъ коихъ первая приходитъ въ извѣстность отъ изъясненія и ученія Профессора анатоміи, а другая

Часть I. А отъ



опшъ самаго тѣлораздробленія ; слѣдственно и анапомики есть двоякѣ : одни теоретическѣе , которые научаются анапомѣи однимъ зрѣнѣмъ , слушанѣмъ и чпенѣмъ книгъ , и бывающъ въ состоянѣи хорошо какъ говорить , такъ и писать объ анатомическихъ вещахъ , хопя сами и никогда не разбѣкали тѣлъ , по отвращенѣю ли своему , или недостатку и другимъ причинамъ ; а другѣе Практическѣе , которые , разбѣкая и пластая разныхъ тѣла , научаются самимъ опытомъ анатомическому свѣдѣнѣю .

Предметъ Анапомѣи есть самое человѣческое тѣло , котораго разбѣченѣе предпринимается для изслѣдованѣя строенѣя онаго , каковое изслѣдованѣе называется посправедливости человѣкословѣмъ (*antropologia*) , при недостаткѣ же человѣческихъ пруповъ , можно пластать тѣла и другихъ животныхъ , и иногда пребуеъ необходимость , чпобы даже и живыхъ разбѣкать животныхъ . Таковая необходимость бываеъ въ показанѣи зрителямъ млеконосныхъ сосудовъ , прѣлпелища пишашельнаго соку , груднаго прошока , движенѣя сердца , боевыхъ жилъ , легкихъ и грудобрюшной перепонки : такъ же въ изслѣдованѣи кругообращенѣя крови и другихъ влагъ , или испыпанѣи зарожденѣя животныхъ , чего въ мертвыхъ человѣческихъ тѣлахъ изслѣдовать не можно , а живыхъ пластать людей есть дѣло варварское , намѣренѣе безбожное . Разбѣченѣе животныхъ называется Зоомѣею (*zootomia*) или соравнительною анапомѣею . (*anatomia comparativa*) .

Анапомѣя иначе еще раздѣляется , хопя безо всякой пользы и нужды , на прим . на Ангѣологѣю , или науку о сосудахъ , какое раздѣленѣе есть изрядное . Но еъли бы кто Ангѣологѣю еще раздѣлилъ на Аршерѣологѣю , или науку о боевыхъ жилахъ , и Флебологѣю или науку о крововозвратныхъ жилахъ ; то сѣе совѣтъ было бы щещено и въ разсужденѣи

сужденіи начальныхъ учениковъ бесполезно, хотя впрочемъ писать въ особенности о такихъ частяхъ и подраздѣленіяхъ анатоміи посправедливости полезно и нужно. Такимъ образомъ сдѣлалъ господинъ Шпрегель Ихоменшологию или науку о тѣлѣсныхъ влагахъ въ особливости, и Ишоншологию или науку о сосудахъ, содержащихъ влаги, каналахъ и плѣвахъ въ особливости же. Чтожъ касается до пользы анатоміи, то всякъ знаетъ, сколь нужна она въ обществѣ, а наипаче для хирурговъ, производящихъ разныя операціи.

§ 2. Тѣло человѣческое раздѣляется на три части, а имянно: на голову, туловище и члены.

§ 3. Къ твердымъ головнымъ частямъ относятся:

1. Частъ, покрывшая волосами, черепъ. *pars capillata.*

2. Передняя частъ головы, чело. *inciput vel bregma.*

3. Задняя частъ головы, затылокъ. *occiput.*

4. Виски, скули. *tempora.*

5. Верхушка, маковка, шѣмя, верхняя частъ головы. *vertex.*

6. Лице, видъ. *facies.*

7. Носъ. *nasus.*

8. Глаза. *oculi.*

9. Щеки, ланипы. *genae.*

10. Уста, ротъ. *os.*

11. Ухо. *auris.*

12. Подбородокъ. *mentum.*

13. Шея. *collum.*

14. Вилки, вилочки, передняя спорона шеи, горло. *jugulum.*

15. Адамово яблоко, кадыкЪ, выпуклина на горлѣ. *Adami rotum.*

16. Передніе, средніе, или разсѣкающіе зубы. *dentes incisores, galafmi.*

17. ЗашеекЪ. *cervix.*

§ 4. кЪ шуловищу шѣла принадлежатЪ:

1. Плеча, рама. *humeri.*

2. Спина, хребетЪ. *tergum, dorsum.*

3. Грудь. *pectus.*

4. Сосцы, шишѣки. *mammæ.*

5. Ложжинка, лощевинка подЪ грудью. *scrobiculus cordis.*

6. Брюхо, животЪ, чрево. *abdomen.*

7. Надчеревная спорона, передняя внѣшняя часть брюха, чпо между пупомЪ и вздохами. *epigastrica regio.*

8. Пупошная спорона. *regio umbilicalis.*

9. Подчеревная спорона, чпо между пупомЪ и лономЪ. *regio hypogastrica.*

10. Чресла, поясница, лядвія. *lumbi.*

11. ЛобЪ, наддѣшпородная часть, покрывная волосами. *pubes.*

12. Пахи. *ingvina.*

13. Ягодищы. *nates.*

§ 5. КЪ членамЪ шѣла относятся:

1. Рука. *manus.*

2. Рама. *brachia.*

3. Плеча. *humeri*.
4. Крыльцо, мышки. *axilla*.
5. Локопъ. *cubitus*.
6. Ручная кисть. *carpus*.
7. Запасъе, пасъ у руки. *metacarpus*.
8. Ладонь. *vola manus*.
9. Пальцы. *digiti*.
10. Нога. *pes*.
11. Бедро, спегно. *femen, femur*.
12. Колѣно. *genu*.
13. Чашка подъ колѣномъ. *poples*.
14. Голень, берцо. *tibia*.
15. Ножныя икры, ляшки. *furæ*.
16. Лодышки. *malleoli*.
17. Плюсны, запяпки у ногъ. *tarsi pedum*.
18. Заплюсны. *metatarsi*.
19. Пяша. *calc*.
20. Ножная поверхность. *dorsum pedis*.
21. Ножная подошва. *planta pedis*.
22. Ножные персты, изъ коихъ самой толстой называется большой палецъ, *pollex, hallux*, откуда имѣетъ происшествіе свое латинской глаголъ *hallucinor, hallucinari*, ошибаюсь, ошибаюсь, погрѣшаю.

§ 6. Тѣло человѣческое состоитъ изъ твердыхъ и жидкихъ частей.

§ 7. Твердые части (§ 6) суть :

1. Кости. *ossa*.
2. Волоши, волокны, мясистыя жилы. *fibræ*.

3. Нервы, чувствительныя жилы. *nervi*.
4. Оболочка, плѣва, покровѢ. *membrana*.
5. Плѣва, плѣна. *tunica*.
6. Связки, связни. *ligamenta*.
7. Хрящи. *cartilagines*.
8. Сухія чувствительныя жилы. *tendines*.
9. Желѣза. *glandulae*.
10. Кровонесущія, боевыя жилы, артеріи. *arteriae*.
11. Крововозвратныя жилы. *venae*.
12. Пасочные, водоносные, питапельную шо еспѣ влагу и другую водяную матерію разносящіе, вонь извергающіе и приносящіе сосуды. *vasa lymphatica*.
13. Мышцы, мясистыя часпи. *musculi*.

§ 8. КѢ жидкимѢ часпямѢ человѣческаго шѣ-
ля опносяся :

1. Кровь. *sanguis*.
2. Урина, моча. *urina*.
3. Питапельной сокѢ. *chylus*.
4. Молоко. *lac*.
5. Мужское сѣмя. *semen, semen*.
6. Жизненной сокѢ, пончайшая жидкость, или влага чувствительныхѢ жилѢ. *fluidum nerveum*.
7. Слезы. *lachrymae*.
8. Сѣра вѢ ушахѢ. *cerumen aurium*.
9. Возгри. *mucus narium*.
10. Слина. *saliva*.
11. Желудочная жидкость, желудочной раз-
творѢ, жидкой чревной сокѢ вѢ желудкѢ и киш-
кахѢ опдѣляемый. *liquor gastricus*.

12. Сокъ поджелудочной мясистой, иначе пригожемясною именуемой, желѣзы. *liquor pancreaticus.*

13. Желчь. *bilis.*

§ 9. Покровы человѣческаго шѣла имѣются сии:

1. Верхняя кожа на шѣлѣ. *epidermis.*

2. Кожа. *cutis.*

3. Сальная плѣва. *membrana adiposa.*

4. Сальная клѣшчепая оболочка, или покровъ подъ кожей *). *panniculus adiposus.*

5. Верхняя тончайшая кожа на шѣлѣ, не имѣетъ ни какого чувствія, а кожа есть весьма чувствительна и несмѣлныя имѣетъ скважины или поры. Сальная плѣва имѣетъ многія салоотворныя доли или часты.

(*) Есть и другая мясистая оболочка, подъ сальною находящаяся, посредствомъ которой животныя приводятъ въ движеніе свою кожу, и шѣмъ прогоняютъ уязвляющія ихъ насѣкомыя. П. Гейстеръ говоритъ, что и у людей находятся такія же оболочки, а наипаче на лицѣ, однако оныя не суть нужны для человѣковъ, имѣющихъ руки и другія способности, которыми они превосходятъ всякихъ животныхъ, покоряя ихъ въ свое владѣніе.

§ 10. Анатомія (или членораздробленіе человѣческаго шѣла) вообще заключаетъ въ себѣ:

1. *Остеологию*, или науку о костяхъ. *osteologiam.*

2. *Миологию*, или науку о мышцахъ. *myologiam.*

3. *Спланхнологию*, или науку о внутренностяхъ. *splanchnologiam.*

4. *Синдесмологию*, или науку о связкахъ. *syndesmologiam.*

5. *Аденологию*, или науку о желѣзахъ. *adenologiam*.

6. *Нервологию*, или науку о чувствительныхъ жилахъ. *nervologiam*.

7. *Ангиологию*, или науку о боевыхъ и крово-возвратныхъ жилахъ. *angiologiam*.

ГЛАВА II.

Объ остеологiи или наукѣ о костяхъ.

§ 11. Тѣло, или средняя и самая твердая часть кости называется *Существомъ* или срединою кости (*diaphysis*;) но выпуклина или опростокъ какой либо кости непосредственно, по естѣ безъ хряща, соединяющаяся съ костью, называется *отросткомъ* (*apophysis*). Если же таковъ опростокъ соединенъ будетъ съ костью посредствомъ хряща, то въ такомъ случаѣ получаетъ имя *причѣска* или *причѣпочной* кости (*epiphysis*).

§ 12. Кости одекаются надкостною плѣвою *) (*periostium*), которая плѣва естѣ весьма тонка и чувствительна. Какъ внутри, такъ и снаружи костей находятся впадины или полоски, дырочки, проходы, пазухи и связки. Въ полостяхъ костныхъ содержится мозгъ, *костнымъ* **) называемый (*medulla*).

*) Ся плѣва, естѣли покрываетъ хрящи, то надхрящевой (*perichondrium*), а естѣли головной черепъ, то надчерепною плѣвою называется (*pericranium*). Ся плѣва служитъ: 1) къ проведенію

нїю сосудовъ въ кости, питанїе онымъ доставляющихъ, 2) къ положенїю предѣловъ рожденїю и умноженїю костей. 3) къ соединенїю опросковъ съ самою костью, и 4) къ прикрѣпленїю сухихъ жилъ и началъ мышковыхъ.

**) Нѣкоторые говорятъ, что сей мозгъ сгущается въ костяхъ отъ сидишры, которую мы въ себя съ воздухомъ вбираемъ, попому что сидишренная кислота сгущаетъ масло, но несправедливо.

§ 13. Членосоединенїя или совокупленїя костей имена и образы сущїя слѣдующїя :

1. Явнобидное членосоединенїе. *diarthrosis*.
2. Неглубоковпалое, или поверхностное членосоединенїе. *Arthrodia*.
3. Глубоковпалое членосоединенїе. *enarthrosis*.
4. Неглубоковспавленное членосоединенїе. *arthrodia*.
5. Непримѣтное или малодвижное членосоединенїе. *synarthrosis*.
6. Хрящепосредственное членосоединенїе. *synchondrosis*.
7. Связепосредственное членосоединенїе. *syndesmosis* f. *synevrosis*.
8. Сплоченїе костей, или сращепосредственное членосоединенїе. *symphysis*.
9. Мясопосредственное членосоединенїе. *symparsis*.
10. Единообразное или протоплинейное членосоединенїе. *harmonia*.
11. Неподвижно-вспавленное или водруженное членосоединенїе. *gomphosis*.
12. Шовъ, швообразное членосоединенїе. *sutura*.

§ 14. Не глубоко впалое членосоединение (§ 13) имѣетъ основная кость (*clavicula*) съ верхнимъ опроскомъ лопатки (*acromium scapulae*).

§ 15. Глубоко впалое членосоединение (§ 13) имѣетъ верхняя часть или голова бедровой кости съ уксусницею, вермлугомъ или глубокою полостью безыменной кости (*cum acetabulo ossis innominati* § 32.).

§ 16. Хрящепосредственное членосоединение изображаетъ соединение реберъ (§ 29), а особливо съ первымъ шейнымъ позвонкомъ, называемымъ осью (*axis*).

§ 17. Связепосредственное членосоединение (§ 13) имѣетъ копчиковая кость или вихрець (§ 27) съ сѣдалищною костью (*ischii os*).

§ 18. Мяsepосредственное членосоединение (§ 13) находится между кобылкою или двуроговою язычною костью (§ 25) и грудиною (*cum sterno*).

§ 19. Безпрерывное или единообразное членосоединение (§ 13) имѣютъ между собою личные кости.

§ 20. Соединение зубовъ съ челюстями называется неподвижнымъ или водруженнымъ членосовокуплениемъ (*gomphosis*).

§ 21. Соединение лобныхъ, верхнихъ головныхъ и височныхъ костей именуется шовомъ или шовообразнымъ членосоединениемъ (*sutura*).

§ 22. Приведеніе и совокупленіе костей трупна, по учиненіи членораздробленія, въ надлежащій порядокъ и естественное положеніе, называется *скелетомъ* или *костякомъ* (skeleton).

§ 23. Вся головная костяная часть называется обыкновенно черепомъ, (cranium), котораго составныя кости суть нижеслѣдующія :

1. Лбина, лобная кость. os frontis.
 2. Теменная, макушкина, чельная кость. os frontipitis, bregmatis.
 3. Затылочная кость. os occipitis.
 4. Височныя кости. ossa temporum.
 5. Клинообразная, основная кость. os sphenoides.
- съ клинообразными опростками и турецкимъ сѣдломъ или полосью основнаго опростка cum sella turcica.
6. Решетообразная кость, ethmoides,
- съ подобнымъ пепушему гребню опросткомъ crista galli, и перемычкою или перегородкою въ ноздряхъ septum narium ;
- гдѣ находяпся губчатые или ноздреватые кости. (ossa spongiosa).

7. Носовыя и слезныя кости ; также челюстные кости , верхняя то есть и нижняя челюсть.

8. Кость въ ноздряхъ безпарною или лемешемъ называемая. vomer.

§ 24. Въ верхней и нижней челюсти родятся 32 зуба, а именно :

1. Восемь ранних*) передних зубов, обыкновенно разсѣкашельными называемых, VIII. dentes incisores, galasmi.

2. Чешыре заостренных, иначе кликами называемых. canini dentes.

3. Шеснадцать коренных зубов, жевательными называемых. molares.

4. И чешыре послѣдних или поздних **) зубов, нравственными или зубами мудрости именуемых. dentes sapientiae.

*) Можешъ быть кто спроситъ, для чего первые зубы выпадають у младенцовъ, а на мѣсто ихъ вырастають другіе? На сіе отвѣчать должно съ Кульмомъ, что оныя выпадають потому, что зубныя ямки при умноженіи младенческихъ лѣтъ умножаются, и болѣе раздаются, а зубы, такъ какъ костяныя шѣла по причинѣ твердости своей скоро умножаться не могутъ и слѣдственно не въ состояніи бывають наполнять оставшихъ пространствъ, почему при жеваніи начинаютъ шатаься и наконецъ выпадають. Припомъ должно знать, что первые зубы не имѣють собственнаго корня, почему послѣдующими зубами весьма легко извергнуты быть могутъ.

**) Зубы согнивши, или выпавши, никогда опять не вырастають; однако были случаи, что даже и у преслѣбыхъ людей опять выросли зубы; о семъ желающіе знать подробно, должны читать сочиненія Огмы Барполина, Сенерта, Везалія и другихъ достойныхъ вѣроистія сочинителей.

§ 25. Къ головнымъ костямъ можно еще приписать язычную двуроговую кость. (os hyoides)

§ 26. Къ слуховымъ костямъ принадлежатъ:

1. Слуховой проходъ внѣшній и внутренній. meatus auditorius.

2. Раковина, улитка, блокѢ. (*concha, cochlea*).
3. Барабанная впадина, или полосѢ въ слуховой костьи. *cavitas tympani*.
4. МолошокѢ, маленькая костючка молошку подобная въ слуховой костьи. *malleus*.
Наковальня, подобная кость наковальни и стременообразная кость. *incus & stapes*.
5. ЛавиринѢ, перепутанные мѢспа въ слуховой костьи. *labyrinthus*.
6. Овальное окно, дира. *fenestra ovalis*.
7. ЕвстахѢева труба, проходѢ. *tuba Eustachiana*.

§ 27. Спинныя или хребетныя кости называются позвонками. ИхѢ находится 34, а именно: 7. шейныхѢ, изѢ коихѢ первой называется *остию* (*axis*), а второй *воротомѢ* или *воротнымѢ* позвонкомѢ, на приѢпочкѢ котораго вращается голова съ первымѢ шейнымѢ позвонкомѢ. (*epistropheus*).

12. 3. ХребетныхѢ и поясничныхѢ. Сіи позвонки, будучи взяты вмѢстѢ, называются истинными позвонками.

Несправедливо же называемые позвонками сущѢ: крестецѢ или крестцовая кость, обыкновенно у анапомиковѢ священной называемая, (*os sacrum*).

Копчиковая кость, вихрецѢ. *) *os coccygis*.

И безыменные или худоименованныя кости; какѢ-то:

Подвздошная кость. *os ileon*.

СѢдалищная кость, *os ischii*,

И лобковая кость. *os pubis*.

- *) О сей косточкѣ должно примѣчать, что она во время родовъ у женщинъ нѣсколько подается назадъ и тѣмъ способствуетъ къ удобному изхожденію младенцевъ на свѣтъ.

§ 28. Соединеніе вышесказанныхъ безыменныхъ костей (§ 27) на конечностяхъ оныхъ называется укусуницею, вертлугомъ или полостью, съ которою голова бедровой кости соединяется. Пространство же между оными находящееся называется тазомъ или лономъ (*pelvis*).

§ 29. Грудныя кости суть: ребра и грудина. Реберъ числомъ по обѣимъ бокамъ имѣется 24, семь верхнихъ, которыя истинными называющіяся; а пять нижнихъ, живыми называемыхъ. Хрящъ, который находится на концѣ грудины, называется мечеобразнымъ хрящемъ *) (*saxtilago xurhoides*).

- *) Должно знать, что сей хрящикъ, будучи подавленъ внутрь, причиняетъ боль, около сердечную называемую, которую чтобы излѣчить, то должно подавленной хрящъ поднять въ верхъ, либо тягучимъ пластыремъ, либо воздушнымъ нососомъ (*anthlia*).

§ 30. Къ грудинѣ относятся еще: распорки, ключики, дужки, или основныя кости,

И лопатки, *claviculae & scapulae*.

Съ опросткомъ вороньему носу подобнымъ *apophysis coracoidea*.

§ 31. Кости членовныя на рукахъ и ногахъ суть слѣдующія:

Раменная или плечевая кость. *os humeri*.

Локошь, *cubitus*,

И лучъ или лучевая кость, *radius*.

Горбатая или выдавшаяся часть локтя называется *гребеннымъ*, *гребнеобразнымъ* по естъ оп-
ропкомъ. *alecropon*.

Ручныя кости суть:

Кисть на рукѣ, *carpus*.

И запястье или пась у руки. *metacarpus*.

Косточки, находящіяся между пальцами, на-
зываются *сочевцеобразными*. *officula fessamoidea*.

§ 32. Кости ножныя суть слѣдующія:

Кость бедровая. *os femoris*.

Кость берцовая, берцо или голень. *os tibiae*.

Кость берцовая меньшая, дудкою именуемая.
os fibulae.

Чашка, колѣнная кость. *patella*.

Плюсна, *tarsus*,

И запяшокъ у ноги. *metatarsus*.

§ 33. Плюсна имѣетъ семь косточекъ, ко-
торыя нижеслѣдующимъ именуются образомъ:

Баба, таранная, или основная плюсовая кость.
astragalus.

Пяпа. *calcaneum*.

Ладѣйная, лодкѣ по естъ подобная у за-
пасья кость. *scaphoides*.

Клинообразная кость, первая, вторая и третія.
os cuneiforme, primum, secundum & tertium.

Запяшокъ состоитъ изъ пяши косточекъ. *)

*) Забѣ примѣчать должно, что кромѣ вышеупомяну-
тыхъ костей, находящихся въ человѣческомъ тѣлѣ,
Евреи или Жиды находятъ еще особливую кость,
которую они называютъ *лузъ* (*luz*), и про которую
ГОВО-

говорятъ, что она никогда не излѣиваетъ и не согниваетъ, даже до втораго пришествія, изъ которой по суешному мечшанію оныхъ имѣетъ опять возродиться и ожить человѣкъ. Что за химера есть оная Жидовская кость, всякъ здраво мыслящій удобно видѣть можетъ.

ГЛАВА III.

О Мѣологии или наукѣ о мышцахъ.

§ 34. Всякая мышца имѣетъ у себя голову или свое происхожденіе, чрево или средину, хвостъ или окончаніе, движимою точкою называемое, и сухую жилу, кою разширеніе называется сухожильною лѣвою. (aponevrosis.)

§ 35. Всѣ мышцы состоятъ изъ волоконъ или мясастыхъ жилокъ, боевыхъ и крововозвратныхъ жилъ, посочныхъ или водяныхъ сосудовъ и нервовъ, или чувственныхъ жилъ.

§ 36. Черепа головнаго мышцы сущь :

Двѣ лобныя и

Двѣ затылочныя мышцы. duo frontales & occiputales muscoli.

§ 37. Ушныя внѣшнія мышцы сущь :

Верхняя подъемающая ухо мышца. elevator auris.

Передняя и задняя ушныя мышцы. anterior & posterior muscoli.

§ 38. Внутреннія ушныя мышцы сущь :

Внѣшняя молотка въ слуховой кости мышца, косая Евстафіева мышца и

Спряженная мышца. stapedis musculus.

§ 39.

§ 39. Внѣшнія глазныя и глазныхъ вѣкъ мышцы имѣются слѣдующія:

Сморщивающія брови мышцы. *corrugator supercilii* m.

Мышцы глазныхъ вѣкъ. *musculi palpebrarum*.

Круговая большая и меньшая, или сжимающая глазныя вѣка мышца. *orbicularis sive corrugator palpebrarum*.

Подъемная верхняго глазнаго вѣка мышца. *elevator palpebrae superioris*.

Популяющая или низводящая нижнее глазное вѣко мышца. *depressor palpebrae inferioris*.

§ 40. Мышцы глазнаго шара суть:

Гордящаяся, или поднимающая глазъ мышца. *superbus sive attollens musculus*.

Смирная, или глазъ популяющая мышца. *humilis musculus*.

Глазоопводительная или негодующая мышца. *indignabundus musculus*.

Глазоприводящая или винежадная, пиянственная мышца. *adducens, sive bibitorius musculus*.

Сии четыре мышцы называются *прямыми* глазнаго шара *мышцами*.

Къ онымъ причисляются еще двѣ косвенныя или косодвижущія глазной шаръ мышцы, какъ-то:

Глазоврапная, косоврапная глазнаго шара верхняя, иначе *блжвою* называемая, мышца. *obliquus superior & inferior sive trochlearis*.

И косоврапная нижняя мышца. *obliquus inferior*.

§ 41. Носовыя мышцы суть:

Пирамидальная или треугольная мышца. *pyramidalis musculus.*

Косая низходящая мышца. *descendens.*

Косовосходящая или миршобразная мышца. *myrtiformis musculus.*

Сжимательная Ковперова, или пощупляющая носовые бока, хрящи, или крыла, мышца. *confstrictor Covperi five depressor alarum nasi.*

§ 42. Губныя мышцы суть:

Сжимательная устная мышца. *sphincter oris.*

Валпорная, трубачная, ланишная мышца. *buccinator.*

Большая скуловая мышца. *zigmaticus major.*

Клыковая, песья, псѣихъ или глазныхъ зубовъ мышца. *caninus musculus.*

Разрѣзывательная, дробительная или переднихъ зубовъ мышца, большая и средняя. *musculus incisivus magnus & medius.*

Треугольная губная мышца. *triangularis musculus.*

Квадратная или чепыреугольная мышца. *quadratus musculus.*

Нижняя губная мышца. *inferior.*

§ 43. На шеѣ находятся двѣ мышцы, изъ коихъ первая называется проспиранною или широкою мышцею, *latissimus musculus five platysmamioides.*

А другая на бокъ склоняющею шею мышцею. *scalenus.*

§ 44. Мышцы, которыя нижнюю челюсть приводятъ въ движеніе, суть слѣдующія:

Жевательныя, поспѣшествующія по естѣ жеванію, мышцы. *masfeteres.*

Висошныя, скивошныя мышцы. *crotaphitæ.*

Крыло-

Крылообразнаго опростка внутренняя и внѣшняя мышцы. *pterygoides internus & externus musculus*.

Двубрюшныя или двучеревныя мышцы. *biventres*.

§ 45. Мышцы язычной, роговой или вилеобразной кости суть:

Коренныхъ зубовъ и язычной кости, язычную по естѣ кость поднимающія и на бокъ склоняющія мышцы. *mylohyoidei*.

Бородо-рого-язычныя мышцы. *geniohyoidei*.

Шилообразнаго опростка и язычной кости, или шилоязычныя, на обѣ стороны склоняющія языкъ мышцы. *stylohyoidei*.

Вороньему носу подобнаго опростка и язычной кости, или языкъ побочно внизъ влекущія мышцы. *coracohyoidei*.

§ 46. Язычныя мышцы суть слѣдующія:

Бородоязычная мышца. *genioglossus*.

Основная язычная, коренно-язычная, внизъ языкъ подавляющая мышца. *basioglossus masculus*.

Рогоязычная мышца. *ceratoglossus*.

Хрящеязычная мышца. *chondroglossus*.

Шилообразнаго опростка и языка, или шилоязычная, языкъ по естѣ на бокъ вращающая мышца. *styloglossus*.

§ 47. Движущія, или приводящія въ движеніе голову мышцы суть сіи:

Мико Столбовецкой Грудн.

Грудины и сосцеобразныхъ отпросшковъ, или груднососцеобразныхъ, голову по естъ склоняющія, мышцы. *sternomastoidei musculi*.

Прямая большая и меньшая мышца. *musculus rectus maior & minor*.

Прямая боковая мышца. *lateralis*.

Селезеночная (сосцеобразного отпроска) мышца. *splenicus*.

Объемлющая большая и меньшая мышца. *complexor maior & minor*.

Большая и меньшая заднія головныя мышцы, и вышшая и низшая мышцы. *posterior maior & minor, inferior que superior que*.

§ 48. Горпанные или дыхательнаго горла мышцы суть слѣдующія:

Грудины и щитообразнаго хряща, или груднощитообразныхъ, щитообразной по естъ хрящъ внизъ влекущія мышцы. *sternothyroidei*.

Щитообразнаго и колеччатаго хряща, или щитоколеччатыхъ хрящей опверспіе, словомъ: горпанъ сжимающія, мышцы. *thyroarythenoidei*.

Язычной роговой кости и щитообразнаго хряща, или глотку сжимающія мышцы. *hyothyroidei*.

Колеччатаго и щитообразнаго хряща, или колеччатощитообразныхъ хрящей мышцы, копоря разширяютъ глотку. *cricothyroidei*.

Колеччатаго и черпалообразнаго хряща, или колеччаточерпалообразныхъ хрящей мышцы, разширяющія глотку, опводя оную по назадъ, по напередъ. *cricoarythenoidei*.

Ко-

Косая и поперечная черпалообразныя, черпалообразнаго по есть хряща мышицы, копорыя отворяющѣ глотку. *arythenoidei, obliquus & transversalis.*

Щитообразнаго хряща и надгортановаго хрящичка, или щитонадгортанохрящевыя мышицы. *thyroepiglotthei.*

Черпалообразнаго хряща и надгортановаго хрящичка, или черпалонадгортанохрящевыя мышицы. *ariegiglotthei.*

Язычной кости и надгортановаго хрящичка, или язычнадгортанохрящевыя мышицы. *hyoepiglotthei.*

§ 49. Мышцы отверстія пищепріемнаго горла суть слѣдующія:

Головожѣвныя, головы по есть и пищепріемнаго горла мышицы. *cephalopharyngei.*

Крылообразной кости и пищепріемнаго канала, или крылопищепріемныя, низшую по есть челюсть въ верхѣ и косо на бокѣ движущія, мышицы. *pterygopharyngei.*

Шилообразнаго отростка и пищепріемнаго горла, или шилогорловыя, разширяющія по есть пищепріемное горло, мышицы. *stylopharyngei.*

Околоязычныя горловыя мышицы. *peristaphylopharyngei.*

Мышцы языка и пищепріемнаго горла, или языкогорловыя мышицы. *glossopharyngei.*

Язычной кости и пищепріемнаго горла, или язычногорловыя мышицы. *hyopharyngei masculi.*

Подбородка и пищепріемнаго горла, или боро-
горловыя мышцы. *geniopharyngei*.

Коренныхъ зубовъ и пищепріемнаго горла, или
кореннозубогорловыя мышцы. *mylopharyngei*.

Щипообразнаго хряща и пищепріемнаго горла
мышцы. *thyropharyngei*.

Посредственно-жильно-безкровныя пищепріем-
наго горла мышцы. *fundesmorpharyngei*.

Колешчатого хряща и пищепріемнаго горла,
или колешчатохрящегорловыя, сжимающія по естѣ
отверстіе пищепріемнаго горла, мышцы. *cricophar-
yngei*.

§ 50. Язычныя или язычка находящагося въ
горлѣ, мышцы суть слѣдующія :

Языкоязычныя мышцы. *glossopharylini*.

Горлеязычныя мышцы. *pharyngopharylini*.

Щипообразнаго хряща и язычка въ горлѣ, или
хрящеязычныя мышцы. *thyropharylini*.

Евстахіевой трубы и язычка, или трубоязыч-
ныя мышцы. *salpinogopharyngei*.

Пріязычныя, средняя по естѣ и боковая, мы-
шцы. *epistaphylini medius & lateralis*.

§ 51. Позвоночныя, поясничныя и вихрецевыя
мышцы, суть нижеслѣдующія :

Весьма длинная хребтовая или спинная мышца.
longissimus dorsi.

Крестцопоясничная мышца. *sacro-lumbaris muscu-
lus*.

Полуспинная, полухребетная мышца. *semispi-
natus*.

По-

Поперешно-спинныя мышцы. *transversospinati*.

Четвероугольная поясничная мышца. *quadratus*.

Ловеческая, или большая внутренняя поясничная мышца. *psoas*.

Между-спинныя и поперешныя поясничныя мышцы. *interspinales & transversales lumborum*.

Мышцы вихредевы суть:

Сѣдалищновихредевая, и крестцевихредевая мышцы. *ischiococcigeus & sacrococcigeus musculus*.

§ 52. Грудныя мышцы суть сии:

Междуреберныя мышцы. *intercostales*.

Зазубренная задняя, вышая и низшая, и междуреберныя мышцы. *serratus posticus superior & inferior intercostales que musculi*.

§ 53. Брюшныя или чревныя мышцы суть:

Косонизходящая и восходящая прямыя мышцы. *oblique decedens & ascendens musculi*.

Поперечная и пирамидальная мышцы. *transversalis & pyramidalis*.

§ 54. Мышцы лопатковыя суть слѣдующія:

Несовершенно четвероугольная, споловидная, или колпакообразная мышца. *trapezius, cucullaris*.

Ромбоидальная, четыреспоронняя мышца. *rhomboideus*.

Зазубренныя переднія большая и меньшая мышцы. *serratus anterior major & minor*.

§ 55. Плечевыя мышцы суть:

Плечевая рукоподъемная мышца. *deltoides*.

Надспинная, надъ опроспкомъ лопаткинымъ лежащая мышца. *supraspinatus*.

Подобнаго вороньему носу опроска и плеча мышцы. *coracobrachiales*.

Подлопатковая мышца. *subscapularis*.

Круглая большая и меньшая мышца. *teres major & minor*.

Весьма широкая на спинѣ лежащая мышца. *latissimus dorsi*.

Грудная большая мышца. *pectoralis major*.

§ 56. Мышца осповой кости называется подбоспекоспною, проходящею по еспѣ подбоспвою костью, мышцею. (*subclavius*)

§ 57. Локопныя и лучевыя мышцы суть слѣдующія:

Двучревная мышца. *biventer musculus*.

Плечевая, раменная, большая внѣшняя и внутренняя, мышцы. *brachieus externus & internus*.

Рукопротягательная, долгая и короткая, мышцы. *extensor manus longus & brevis*.

Навзничь или хребтомъ оборачивающая руку мышца, круглая по еспѣ и четверугольная. *pronator rotundus & quadratus*.

§ 58. Мышцы ручной кисти называются:

Лучная и локопная, внѣшняя и внутренняя, мышцы. *radialis & cubitalis externus & internus*.

Ручной кисти, или ладонная длинная и короткая мышцы. *palmaris longus & brevis*.

§ 59. Мышцы пальцевъ суть слѣдующія:

Высоколежащая, прободенная мышца. *perforatus musculus*.

Глубокоскрыющаяся, глубоколежащая мышца. *profundus*.

Междукоспные мышцы. *interossei*.

Пал це-

Палецпротягивательная, четыре по есть пальца протягивающая мышца. *extensor quatuor digitorum musculus.*

§ 60. Мышцы указательного перста суть: Собственно большой перстъ протягивающая мышца. *extensor indicis proprius.*

Отводящая большой перстъ мышца. *abductor.*

§ 61. Самого меньшого перста или мизинца мышцы суть:

Протягивающая собственная или ушная мышца. *avicularis musculus.*

Отводительная, отводящая по есть самой меньшей перстъ или палецъ, мышца. *hypotenar.*

§ 62. Мышцы большого перста суть ниже-сѣдующія.

Сгибающая, сгибательная большого перста, мышца. *flexor pollicis.*

Протягивающія большой палецъ, длинная и короткая, мышцы. *extensor longus & brevis.*

Отводительная большого перста мышца. *tenar, anthithenar.*

§ 63. Мышцы дѣтородного уда суть:

Двѣ подъемныя или возспановительныя мышцы. *erectores duo.*

Двѣ ускорительныя, или поспѣшительныя мышцы. *duo acceleratores.*

Двѣ преугольныя и поперечныя мышцы. *duo triangulares & transversales.*

§ 64. Мышцы клипоя, поточки или языка въ верхней части женскихъ дѣтородныхъ частей, находится только двѣ,

Воздвизательными именуемыя. *erectores duo.*

§ 65. Мышица рукава или влагалища маточнаго называется сжимапельною маточнаго влагалища мышцею. (*constrictor vaginae uteri*.)

§ 66. Мышицы бедровой кости суть нижеслѣдующія:

Ловечесная, поясничная большая мышца. *psoas magnus*.

Иліаческія, подвздошныя, большая по есть и меньшая, мышцы. *iliacus major & minor*.

Гребенная, гребенной кости мышца. *pectineus*.

Мякопныя, ягодичныя, сѣдалищныя, большая по есть, средняя и меньшая, мышцы. *glutæi musculi, major nempe medius & minor*.

Сіи мышцы будучи соединенны вмѣсто, составляютъ ягодницы. *nates*

Трехглавная, происпвенная, проечастная мышца. *triceps, trigeminus*.

Двойспвенная, двучастная, вышшая и низшая, мышцы. *geminus superior & inferior*.

Чепвероугольная бедровая мышца. *quadratus femoris*.

Закупорывапельныя, внутренняя и наружная мышцы. *obturator internus & externus*.

§ 67. Бердовой кости мышцы суть:

Голенная бердовая прямая мышца. *musculus rectus cruris*.

Великія, обширныя, наружная и внутренняя, мышцы. *vastus externus & internus*.

Голенная, голени по есть принадлежащая, мышца. *cruralis*.

Закройческая, швейная мышца. *Sartorius.*

Тонкая мышца. *gracilis.*

Полупоперечная, полуплѣвная мышца. *femimembranosus.*

Полусухожильная мышца. *femiotendinosus.*

Подколѣнная мышца. *popliteus.*

§ 68 Плюсовые и запяпковые мыщцы сущь:

Берцовая мышца. *tibieus.*

Дудошная, согѣлошная мышца, средняя и малая. *peroneus medius & minor.*

Равныя, двойными называемыя, мышцы. *gemelli.*

Сандальная, подошвенная мышца или мышка. *soleus.*

Тонкая берцовая мышца. *tibieus gracilis.*

Берцовая задняя мышца. *tibieus posticus*

Дудошная задняя мышца. *peroneus posticus.*

§ 69. Мыщцы ножныхъ пальцевъ сущь ниже слѣдующія:

Протягивательныя долгія и короткія ножныхъ пальцевъ мышцы. *extensor longus & brevis pedis digitorum.*

Сгибательныя длинныя и короткія ножныхъ пальцевъ мышцы. *flexores.*

Чепыре червообразныя мышцы. *lumbricales.*

Междукоспныя мышцы. *interossei musculi.*

§ 70. Мыщцы большого и самаго меньшаго на ногахъ перста сущь сии:

Собственная большого пальца протягивательная мышца. *extensor pollicis proprius.*

Сги-

Сгибательная большого пальца мышца. flexor.
Приводительная и отводительная большого
пальца мышца. tenar & anthytenar.

Поперечная или четверугольная мышца.
transversalis five quadratus.

Отводительная мизинцевая мышца. abductor
digiti minimi.

ГЛАВА IV.

О Спланхнологіи или наукъ о внутренно- стяхъ.

§ 71. Къ спланхнологіи или наукъ о внутрен-
ностяхъ принадлежатъ:

1. Мозгъ и можжечекъ со спановою мозговою
жилою. cerebrum ac cerebellum cum medulla spinali.

2. Ухо. avris.

3. Глазъ. oculus.

4. Уста, ротъ, языкъ съ воздухоноснымъ ка-
наломъ. os cum lingua & aspera arteria.

5. Легкое и сердце, съ бодреберною грудною
плѣвою и грудобрюшную преградою. pulmo ac cor
cum pleura & diaphragmate.

6. Пищеприемное горло съ желудкомъ и кишками.
oesophagus cum ventriculo ac intestinis.

7. Печенка съ желчнымъ пузырькомъ и под-
желудочною мясистою желѣзою. hepar cum vesica
fellea ac pancreate.

8. Селезенка *). splen.

9. Почки съ мочепочниками. renes cum urete-
ribus.

10. Мочевой пузырь со спиволомъ или мочеиспускашельнымъ пропокомъ. *vesica cum urethra.*

11. Дѣпородныя часпи мужескія и женскія.

- 2) О селезенкѣ примѣчать должно, что она въ челоѣкѣ больше назадъ, то есть ближе къ спинѣ находится, нежели въ четвероногихъ животныхъ, которыя повѣсдымъ ходятъ брюхомъ, при которомъ положеніи тѣла селезенка по собственнѣйшей своей тяжести падается впередъ. Древніе вѣрили, что селезенка отдѣляетъ черную желчь, откуда происходитъ задумчивость, а нѣкоторые думали, что она отдѣляетъ нѣкоторой кислой сокъ, которой чрезъ корешкія сосу-ды вливается въ желудокъ и возбуждаетъ голодъ или побужденіе на ѣду. Другіе почитали селезенку за безплодную внутренность, служащую только къ уравновѣсиванію тѣла, и слѣдственно селезенку по мнѣнію ихъ можно изпрѣбывать изъ тѣла безъ всякаго поврежденія въ тѣлѣ. Однако опыты совсѣмъ претивному научаютъ, то есть, что животные, лишившіеся селезенки, скоро поражены были нѣкоторою особливую, на примѣръ смѣхомъ, болѣзнію, и отъ того погибли.

§ 72. Мозгъ раздѣляется на двѣ часпи или доли, какъ то правую и лѣвую; часпи же мозговыя суть слѣдующія:

1. Коровое или сосудистое и можжечное, бѣлое и твердое, жизненной то есть сокъ отдѣляющее, существо. *corticalis & medullaris substantia.*

2. Мозолистое или затвердѣлое тѣло въ мозгу. *corpus callosum.*

3. Переднія мозговыя полости или пустыри. *ventriculi anteriores cerebri.*

4. Ликососпавное, хорообразное сплешеніе жилъ или сосудовъ. *plexus choroideus.*

5. Прозрачная свѣплая перегородка, или прозрачной проспѣнокъ въ мозгу. *septum pellucidum*.

6. Выпуклая или сводообразная часпъ въ мозгу. *fornix*.

7. Коническая, снизу заостренная, кубаровидная, шишкѣ подобная, желѣза. *glandula pinealis five corarium*.

8. Мозговое, нижележащихъ мозговыхъ часпей заднѣе соединеніе или смыканіе. *comissura cerebri posterior*.

9. Полосастыя, граненныя серповидныя шѣла. *corpora striata*.

10. Чешыре шѣла, называемыя черпогами или бугорками зрипельныхъ чувспвипельныхъ жилъ. Сии шѣла еще называются голенями или проптяженіями продолговапаго мозгу. *scura medullæ oblongatæ*.

11. Бугорки въ мозгу ягодицами и ядрышками называемыя. *nates cerebri & testes*.

12. Трешій пустырѣ, или полостъ въ мозгу, котораго отперстіе называется воронкою, воронкѣ то естъ подобнымъ пропокомъ. *infundibulum*.

13. Проптяженные мозговые опроспки. *pedunculi cerebri*.

§ 73 Между большимъ и малымъ мозгомъ иначе можжечкомъ называемымъ находяпся:

1. Продолговапой мозгъ. *medulla oblongata*.

2. Четверпый пустырѣ или полостъ. *quartus ventriculus*.

3. Моспикъ Вароліевъ или перемышка, соединяющая большой мозгъ съ малымъ. *pons Uarolii*.

4. Глубокая, перообразная бразда, въ четвертой мозговой полоси находящаяся. *calamus scriptorius*.

§ 74. Спановая мозговая жила не что есть иное, какъ продолженіе продолговатаго мозгу. Внѣшнее существо спановой жилы или хребетнаго мозгу называется бѣлымъ можжечнымъ, а внутреннее сѣрымъ корковымъ или сосудистымъ существомъ.

§ 75. Къ уху принадлежатъ:

1. Козелокъ, завипокъ, задній край, задній и передній завивокъ уха. *helix & anthelix*.

2. Передушной завипокъ, возвышенной бугорокъ передъ слуховымъ проходомъ и маленькое передъ онымъ возвышеніе, или задній ушной козелокъ. *tragus & antitragus*.

3. Внѣшняя раковина или улипка. *concha externa*.

4. Слуховой внѣшній проходъ. *meatus auditorius externus*.

5. Маленькая доля уха, или ушко. *lobulus*.

6. Барабанъ или шимпанъ въ слуховой кости и его впадина. *tympanum eiusque cavitas*.

7. Евстахіева труба. *tuba Eustachiana*.

8. Овальная и круглая дѣра, окномъ обыкновенно называемая. *fenestra ovalis & rotunda*.

9. Лавиринѣ. *labyrinthus*.

10. Преддверіе или паперпъ лавиринеова. *vestibulum*.

11. Слуховой внутренній проходъ. *meatus auditorius internus*.

12. Водный каналъ, водопокъ фаллопиевъ. *aquæ ductus Fallopii*.

§ 76. Глазъ состоитъ:

1. Изъ глазнаго шара или яблока. *bulbus oculi.*
2. Изъ рѣсницъ и бровей. *ex ciliis & superciliis.*
3. Изъ вѣкъ. *e palpebris.*
4. Изъ глазнаго большаго и меньшаго угла или купка. *ex cantho majori & minori.*
5. Изъ слезопочивой почки и слезесобира-
тельной сумочки или пузыря. *e puncto & sacco
lachrymali.*

И наконецъ изъ слезнаго мяса или шельца ,
въ большомъ глазномъ углу находящагося.
caruncula.

§ 77. Внутренняя части составляющія глазъ
суть нижеслѣдующія:

1. Разноцвѣтной кружечекъ, райокъ въ глазу,
или райковая въ глазу плѣвочка. *iris.*
2. Водяная, спекляная и хрустальная влаги
въ глазу; изъ коихъ послѣдняя называется еще
и хрустоловидною чечевицею. *humor aqueus vitreus &
chrySTALLINUS five lens chrySTALLINA.*
3. Бѣлокъ, прирослая, бѣлошная, глазная
плѣва. *albuginea, adnata tunica.*
4. Роговая плѣва или оболочка. *cornea.*
5. Хоровидная или ликосоставная оболочка.
choroidea.
6. Ягодишная, ягодная оболочка. *uvea.*
7. сѣточка, или сѣпи подобная плѣва. *retina.*
Зрительной нервъ, или зрительная чувстви-
тельная жила. *nervus opticus.*

§ 78.

§ 78. Къ роту или успамъ относятся:

1. Губы и оныхъ спайки или смыканія.
2. Ложинка. *filtrum*.
3. Подборокъ. *mentum*.
4. Поднебенье, небо во рту. *palatum*.
5. Десны. *gingivæ*.
6. Язычекъ въ горлѣ. *uvula*.
7. Миндаловидныя железы въ зѣвахъ. *tonsillæ*.
8. Рзыкъ, коего передняя часть, верхомъ или кончикомъ, а послѣдняя корнемъ или основаніемъ называется.

9. Зѣвы съ глоткою и хрящемъ, называемымъ надглотковымъ. *cum glottide & epiglottide*.

§ 79. Въ ротѣ находящіяся еще:

1. Слюнныя протоки, выходящія изъ околоушныхъ. *e parotidibus*.
2. Челюстныхъ и подъязычныхъ желѣзъ. *glandulæ sublinguales*.

§ 80. Воздухоносный каналъ или дыхательное горло раздѣляется на 3 части какъ-то:

На гортань или успье дыхательнаго горла. *in laryngem*.

Воздухопроходный или воздушный каналъ. *in tracheam*.

И хрящевыя колѣшечныя воздуходвижнаго канала вътѣви. *bronchia*.

§ 81. Хрящи, составляющіе дыхательное горло (*aspera arteria*) суть слѣдующіе:

Хрящъ щипообразный. *cartilago thyroides*.

Хрящъ колѣсообразный или колѣшечный. *cricoides*.

Часть I.

В

И

И два хряща черпаловидные. *arytenoidei*.

§ 82. Легкое состоитъ изъ духодвижныхъ пузырьковъ и раздѣляется на двѣ доли. (*lobi*).

§ 83. Сердце составляется изъ мышцъ; къ оному принадлежатъ:

1. Околосердечіе или околосердечная оболочка. *pericardium*.

2. Правое и лѣвое ушки. *auriculæ*.

3. Заслоночки при оспроконечія имѣющія, митрообразныя, митръ по естѣ или архіерейской шапкѣ подобныя и полулунныя. *tricuspedales, mytrales & semilunares*.

4. правой и лѣвой пуспырь или полость. *ventriculus dexter & sinister*.

5. Преграда или средостѣніе въ сердцѣ. *septum cordis*.

§ 84. Къ груди относительно до ея внутренности принадлежатъ еще, подреберная, грудная плѣва (*plevra*), средостѣніе въ груди (*mediastinum*), и грудобрюшная перепонка (*diaphragma*).

§ 85. Пищепріемнаго горла или пищевого канала верхняя часть и его опверстіе называется затнорникомъ или жерломъ (*pharynx*), а нижняя часть лѣвымъ устьемъ желудка. (*cardia*)

§ 86. Желудокъ, коего опверстіе, соединяющееся съ двенадцатидюймовою кишкою, называется правымъ устьемъ желудка *) (*pylorus*), состоитъ изъ чешырей оболочекъ; боевыхъ и крововозвратныхъ жилъ, пасочныхъ и водяныхъ сосудовъ, и наконецъ нервовъ или чувствительныхъ жилъ и желѣзъ; каковыя желѣзы опдѣляютъ

ютъ и изливаютъ въ желудокъ такъ называемую *желудочную жидкость* **) (*liquor gastricus*).

*) Сѣ устье имѣетъ кольцообразную заслоночку, посредствомъ которой оное запирается послѣ напущенія желудка и препятствуетъ исхожденію изъ оного несваренной пищи въ пищевапрѣмную или двенадцатипидуюмную кишку.

**) Жидкость сѣя отъ древнихъ за квасною желудочною названная собирается въ желудкѣ, частію отъ глотаемой слины, частію отъ жидкости, которую отдѣляютъ желѣзы пищевапрѣмного горла и самаго желудка, частію отъ принятой и еще не соевѣтъ сваренной пищи. Сѣя жидкость въ живыхъ животныхъ бываетъ прозрачная и свѣтлая, а въ умершихъ такъ какъ и людяхъ по большей частіи мутная. Сѣя жидкость, поелику имѣетъ мыльное свойство, премного способствуетъ къ пищеваренію. Откуда явствуетъ, что не одно движеніе желудка, какъ говорилъ Питкарнѣй, *oriscul. med. pag. m. 67.* но и сѣя жидкость къ пищераздробленію и варенію способствуетъ, будучи удобна къ разведенію и смѣшенію разныхъ ясивенныхъ частей.

§ 87. Кишки раздѣляются на тонкія и толстыя. Къ тонкимъ относятся:

1. Двенадцатипидуюмная кишка. *dodecadaetylum five duodenum.*

2. Тощая, пустая, порожняя кишка. *jejunum.*

3. Подвздошная кишка. *ileum.*

На концѣ которой находится заслоночка *Бавгиновою* *) называемая. *valvula Bavhini.*

Къ толстымъ кишкамъ причисляются:

4. Слѣпая кишка. *caecum intestinum.*

5. Ободочная кишка. *colon.*

6. И прямая или заднепроходная кишка. *rectum.*

Копорой самая низшая внѣшняя часть называется *афедрономъ* или *проходомъ*. anus.

*) Сія заслоночка препятствуетъ восхожденію кушаньеѣ въ тонкія кишки, когда оныя пройдутъ въ толстыя, также препятствуетъ проицанію выпровѣ въ оныя же кишки и поставленныхъ промывательныхъ.

§ 88. Изъ тонкихъ кишекъ происходятъ млечные сосуды, копорые оканчиваются въ пріятелище или пузырькѣ пипательнаго соку (reservoirium five cisterna chyli), изъ коего пріятелища пипательнаго соку происходитъ такъ называемый грудной пипательнаго соку *протокъ* (ductus thoracicus), копорый оканчивается въ лѣвую подключевую крововозвратную жилу (in venam subclaviam).

§ 89. Печенка (hepar) раздѣляется на двѣ доли, на правую по естѣ и левую. Посреди сихъ двухъ долей находится еще и прешія малая доля, называемая *Спигеліевою долею* (lobulus Spigelii).

§ 90. Къ печени принадлежатъ:

Пазуха крововозвратной воротной жилы, (sinus venae portae), копорыя пень находится въ выпуклой печеночной чашпи. Плѣва или оболочка, копорая происходитъ отъ почѣпочной или повѣсомной связки (ligamentum suspensorium), и окружающъ пазуху воротной жилы, копорая иначе еще называется *Глиссоновою сумочкою* или *оболочкою* *) (capsula Glissonii).

Почѣпочная и круглая связка (ligamentum suspensorium & rotundum), копорая, круглая по естѣ
связка

связка составляла въ зародышѣ крововозвратную пупошную жилу.

Печеночной прошокѣ и желчные сосуды (*ductus hepaticus & vasa biliaria*).

*) Оболочка сія происходитъ отъ брюшины (а *peritonio*), и окружаетъ желчный прошокъ и боевую печеночную и крововозвратную воронную жилы.

§ 91. Желчные сосуды раздѣляющся на дно, шею и пѣло или средину. Изъ шеи происходишѣ пузырежелчный, желчного то естъ пузыря, прошокъ (*ductus cysticus*), который проникаетъ въ печеночной прошокъ. Сихъ двухъ прошочковъ взаимное совокупленіе составляетъ общій желчный протокъ (*ductum cholidochum*), чрезъ который проходитъ или изливается желчь въ двенадцатидюймовую кишку.

§ 92. Изъ пригожемясной или языкообразной поджелудочной желѣзы, выходишѣ прошокъ пакъ называемый протокъ пригожемясной желѣзы (*ductus pancreaticus*), чрезъ которой сокъ или жидкость желѣзы сея изливается въ двенадцатидюймовую кишку.

§ 93. Селезенка (*spen*) никакого не имѣетъ испражнипельнаго прохода.

§ 94. Къ почкамъ относяся:

Почечныя сумочки или прибавочныя почки. (*renes succenturiati*).

Мочепочники. *ureteres*.

Тазъ, или лохань, *pelvis*.

§ 95. Сальникъ, окружающій кишки, состоишъ изъ боевыхъ кровеносныхъ и крововозвратныхъ жилъ и пасочныхъ сосудовъ.

§ 96. Мочевой пузырь содержишъ въ себѣ мочу. широкая и вышняя онаго частъ называется *дномъ*, а низшая *шеею*. Каналъ, чрезъ копорой высекаетъ моча, называется *стеоломъ* или *мочеиспускательнымъ протокомъ*. (urethra).

§ 97. Къ дѣшпорднымъ мужскимъ частямъ принадлежатъ:

Шуляпа, апра, ядрышки (testiculi), копорыя находятся въ мошонкѣ. (serotum).

Шовъ, рубецъ, или линѣя, раздѣляющая мошонку на двѣ равныя части. (raphe).

Яишныя прибавочки. (epididymides).

Сѣменные пузырьки (sacculæ feminales), кои находятся между прямою кишкою и шеею мочевого пузыря.

Предстательная желѣза, ниже сѣменныхъ пузырьковъ лежащая, между шеею по есть мочевого пузыря и спволомъ, (glandula prostatica).

Мужескій дѣшпордный удъ состоишъ изъ двухъ губчатыхъ или ноздреватыхъ плѣлъ.

Плѣшка дѣшпероднаго уда и ея конечная плоть. (glans, balanus & præputium).

Передняя часть уда называется головкою, а задняя корнемъ.

Пешушья голова или сѣменособирапельное мяско въ спволѣ. (caput gallinaginis sive verumontanum).

§ 98. Къ женскимъ дѣшпороднымъ часпямъ
относятся:

Дѣшпородный женскій удѣ, и его большой
край со смычками.

Лобокѣ, наддѣшпородная часпѣ. (*mons veneris*).

Дѣшпородоудныя женскія сережки, или меньшіе
краи дѣшпороднаго женскаго уда. (*puphæ*).

Клишпорѣ, пошочка женскаго дѣшпороднаго
уда, язычекѣ въ верхней часпи женскаго дѣш-
породнаго уда. (*clytoris*).

Дѣвспво, дѣвспвенная плѣва, дѣвспво пока-
зывающая перепонка. (*hymen*).

Мочеиспускашельный спволѣ. (*urethra*).

Влагалище, или рукавѣ у матки. (*vagina*
uteri).

§ 99. Матка еспѣ мясиспая часпѣ, лежащая
между мочевымъ пузыремъ и прямою кишкою,
многія имѣющая морщины. Къ оной принадле-
жатѣ:

Широкія и круглыя связки. *ligamenta lata & ro-*
tunda.

Фаллопиевы прубы. *tudæ Fallopiæ*.

Яишники, содержащіе зародышевыя яица. *ovaria*
eum ovis.

Перепончатые, непопырымѣ крыльямъ подоб-
ные край. *alæ vespertilionum*.

ГЛАВА V.

О синдесмологїи или наукѣ о связкахъ.

§ 100. Главнѣйшія человѣческаго шѣла связки сущь сии :

1. Междуключевая, оба ключика, обѣ основныя кости соединяющая связка. *inteclavicular ligamentum.*

2. Ромбойдалная, чепвероугольная связка. *ligamentum rhomboideum.*

3. Передняя и задняя, также и общая лопатковая связка. *scapulare ligamentum.*

4. Общая сумочная костей ручной кости связка. *scapulare offium carpi.*

5. Поперечная, внѣшняя и наружная ручной кости, связка. *transversale carpi ligamentum.*

6. Поперечныя ладонныя связки на конечностяхъ костей ручнаго запястья. *lingamenta palmaria transversa.*

7. Влагалищныя костныхъ рядовъ, ручныхъ перстовъ связки. *ligamenta vaginalia phalangum.*

8. Поперечныя сухихъ жилъ, протягивающихъ персты, связки. *ligamenta tendinum extensorum digitorum transversa.*

9. Круговая или сумочная связка, копорая весь вертлугъ окружаетъ. *ligamentum ciliare five scapulare.*

10. Междучленовная круглая головы бедровой кости связка. *rotundum capitis femoris.*

11. Боковая внутренняя, внѣшняя и сумочная связка. *ligamentum laterale internum, externum & scapulare.*

12. Складчатая Везалиева связка. *mucosum Vesalii*.

13. Крестообразная связка. *ligamentum cruciatum*.

14. Большая коленная чашки или кости связка. *ligamentum patellæ magnum*.

15. Передняя, средняя, задняя и треугольная меньшей берцовой кости связка. Всѣ сии связки составляютъ связки бедровой кости, голени, меньшей голенной или берцовой кости или дудки и коленной кости или чашки.

§ 101. Связки ножного запястка и плюсны суть ;

16. Перпендикулярная или прямо повышенная связка. *perpendicularare ligamentum*.

17. Косая, широкая, боковая и сумочная связка. *obliquum, latum, laterale ac lapfulare ligamentum*.

18. Вышняя и низшая связка. *superius & inferius*.

19. Косая связка на подошвѣ ноги. *ligamentum obliquum in planta pedis*.

20. Связка сумочная, хребетная, въ длину идущая ; косая, прямая, плоская и поперечная связка ; также и боковыя связки. Всѣ сии связки, будучи вмѣстѣ взятыя, составляютъ плюсновые связки.

§ 102. Связки на ногахъ, служащія вмѣстѣ сухихъ жилъ, есть нижеслѣдующія :

21. Влагалищная берцовой кости связка. *ligamentum tibiæ vaginale*.

22. Поперечная лепяпковая и влагалищная связка. *ligamentum transversum laciniatum & vaginale*.

23. Поперечныя связки пропягивающихъ ножныхъ сухихъ жилъ.

§ 103. Связки, находящіяся между запылошною костью и шейными позвонками сунъ:

24. Связка сумочная. *capulare ligamentum*.

25. Связъ зубчатая, имѣющая по еспъ зазубрины. *dentiforme*.

26. Зашесшная, въ зашейкѣ находящейся ямки связка. *ligamentum nuchæ five cervicale*.

§ 104. Связки, соединяющія и укрѣпляющія низшую челюсть съ вышнею костью сунъ:

27. Сумочная связка. *capulare ligamentum*.

28. Боковая нижней челюсти связка. *laterale ligamentum*.

§ 105. Связки хребетной кости сунъ:

29. Поперечная хребетная связка. *ligamentum transversale spinæ*.

30. Переднія и заднія позвоношныхъ шѣлъ связки.

31. Междупозвоношныя и междупоперечныя связки. *intervertebralia & intertransversalia ligamenta*.

32. Желповашыя между спинныя связки. *subflava interspinosa*.

33. Сумочныя связки косыхъ позвоношныхъ оспроспковъ.

§ 106. Грудныя и реберныя связки сунъ:

34. Ребрепозвоношныя связки. *ligamenta costarum vertebralia*.

35. Поперешныя связки.

36. Внутреннія и наружныя шеереберныя связки. *Ligamenta coli & costarum.*

37. Реберныхъ хрящей связки. *lig. Cartilaginum costarum.*

38. Связки оспроконечія грудной кости. *lig. apicis sterni.*

§ 107. Связки безыменныхъ костей супъ: сѣмъ

39. Задняя, длинная и короткая связки подвздошной кости. *ligamentum psoiticum, longum & breve ossis ilei.*

40. Боковая задняя связка. *laterale psoiticum.*

41. Крестцовой и сѣдалищной кости связки, наружныя большія, и внутреннія меньшія. *sacroischiadicum externum maius & internum minus.*

42. Связка копчиковой кости. *ligamentum ossis coccygis.*

43. поперечная верхняя и нижняя лонная или тазовая связки. *ligamentum transversale superius & inferius pelvis.*

44. Закупывающая овальную дыру связка. *obturans ligamentum foraminis ovalis.*

45. Паховая, подчревная, или сухожильная Фаллопиева связка. *ligamentum inguinale sive tendinosum Fallopii.*

46. Четыре маточныя связки, двѣ крѣпкихъ и двѣ широкихъ *). *quatuor lig. uteri, duo rotunda & duo lata.*

*) Поелику матка посредствомъ сихъ связокъ, весьма крѣпко утверждается и прикрѣпляется къ безымяннымъ костямъ, для того Керкрингъ, Музипанъ и фонъ Горнъ, выпаденіе матки совсѣмъ невозможнымъ почитаютъ, но утверждаютъ, что при выпаденіи такъ называемой матки, не самая матка

машка, но только ея рукавъ выпадаетъ, представляющій видъ машинки. Ибо найдено было, что машинка и по смерти находилась въ натуральномъ своемъ положеніи и мѣстѣ, которая прежде казалось было выпала и висѣла вонъ изъ дѣшгородныхъ частей. Напротивъ Руйшъ, Бартолинъ и другіе неоднократно видѣли выпаденіе машинки, почему о выпаденіи оной сомнѣваться не можно. Впрочемъ върояшнѣе кажется, что чаще выпадаетъ одинъ рукавъ машинки, а не самая машинка. Чпужъ касается до связокъ, то Шваммердамъ говоритъ, что круглыя машинныя связки весьма много имѣютъ маленькихъ бѣющихъ жилотъ.

ГЛАВА VI.

О Аденологіи или наукѣ о желѣзахъ.

§ 108. Всѣ желѣзы человѣческаго тѣла соспавлены суть: изъ кровеносныхъ и крововозвратныхъ жилъ; пасочныхъ и водяныхъ сосудовъ, и наконецъ изъ чувственныхъ жилъ. Онѣ раздѣляющіяся на простыя, круглыя, опоченныя или шаровидныя и многосложныя сгромаженными называемыя желѣзы, (in simplices, conglobatas & conglomeratas).

§ 109. Простую желѣзою называется та, которая опредѣляетъ влажность, жидкость или водяность изъ кроваваго соспавы, и послѣ чрезъ исключительный пропекъ въ свое мѣсто выливаетъ. Сей исключительный или испражнишельный (excretorius ductus) пропекъ ни въ какомъ не заключается мѣшечкѣ.

§ 110. Шаровидною (conglobata) желѣзою называется та, которая ни мѣшечка, ни испражнишельнаго не имѣетъ пропекъ.

§ 111. Многосложною же желѣзою имѣнуется та, кошорая многіе имѣющіе испражнипельные пропоки.

§ 112. Главнѣйшія и большее заслуживающія вниманіе желѣзы сущь головныя, шейныя, грудныя и брюшныя желѣзы дѣшородныхъ частей и членовъ, и наконецъ закожныя желѣзы.

§ 113. Къ головнымъ желѣзамъ опносятся:

1. Желѣзы пшвердой мозговой оболочки. *glandulae durae matris.*

2. Коническая, завоспренная, душевнымъ жилищемъ называемая, желѣза *). *glandula pinealis.*

3. Мокрошная, мокрошноопдѣлипельная, или мокрошпропускная желѣза, покрывающая или занимающая впадинку на основной головной кости, Турецкимъ стуломъ обыкновенно называемую. *glandula pituitaria, quae sellam Turcicam tegit.*

4. Сальныя, салеопдѣлипельныя желѣзы Меибоміевы, копорыя находяпся между бровями. *sebaceae Meibomii.*

5. Безыменная или слезная, слезоопдѣлипельная желѣза. *lacrimalis.*

6. Околоушныя желѣзы находящіяся между низшею челюстью и ухомъ. Опъ сихъ желѣзъ происходятъ слинные пропски, называемые стеноновыми, чрезъ копорые слина прошекаетъ въ ротъ. *parotides, ductus stenoniani.*

7. Челюстная желѣза, которая пропѣкъ называется слиннымъ пропѣкомъ варпоновымъ. ductus warthonianus.

8. Желѣзы около коренныхъ зубовъ находящіяся или зубокоренныя желѣзы. glandulæ molares.

*) Сія желѣза душевнымъ жилищемъ названа отъ Картезія, (in tract. de passione animæ) потому, что сія желѣза есть просная, когда всѣ прочія желѣзы суть сложныя. Однако сему его скоропоспѣшному заключенію премногія сопротивляются истинныя, какъ разумомъ, такъ и опытомъ подтвержденныя. Слѣдующія причины ясно доказываютъ справедливость: 1) Что всѣ то есть желѣзы, слѣдственно и сія желѣза, ту приносятъ пользу тѣлу, что опредѣляютъ нѣкоторую жидкость изъ крови. 2) Что чувствительныя жилы отъ чувствительныхъ органовъ не простираются даже до сея желѣзы, какъ говоритъ Куамъ, почему и впечатлѣніе, учиненное въ чувствительныхъ жилахъ, до оной желѣзы достигнуть не можетъ. 3) Что сія желѣза неоднократно найдена была затвердѣлою даже въ такихъ людяхъ, которые совсѣмъ здоровой и непомраченной имѣли разумъ.

§ 114. Успныя и язычныя железы суть нижеслѣдующія: какъ-то:

9. Миндаловидныя въ зѣвахъ находящіяся желѣзы *). amygdalæ, tonsillæ.

10. Язычныя и подъязычныя желѣзы. linguales & sublinguales glandulæ.

11. Слизеопдѣлительныя носовой мокротиной оболочки желѣзы. glandulæ mucosæ membranæ narium pituitariæ.

*) Забѣсь примѣчать должно, что оныя желѣзы, какъ и самъ говоритъ Фаллопій, имѣютъ на срединѣ своей

своей ямы; почему во время лѣченія опухоли оныхъ должно смотрѣть, чинобы помянутыхъ ямъ не почесать за худыя раны.

§ 115. Шейныя желѣзы суть:

12. Щипообразная, на щипообразномъ шее съ хрящъ сидящая желѣза. *glandula thyroidea*.

13. Яремная Вартоніева желѣза. *glandula jugularis Wartonii*.

14. Зашеешныя и запылочныя желѣзы. *glandulae cervicales & occipitales*.

15. Дыхательнаго горла, успья и самаго пищепріемнаго горла желѣзы. *glandulae, laryngeae, pharyngeae & oesophageae*.

§ 116. Какъ грудной кости, такъ и самой груди желѣзы суть нижеслѣдующія:

16. Воздухоноснаго канала желѣзы на концѣ воздухопроходнаго горла. *bronchiales glandulae*.

17. Зобная желѣза въ верхней части груди находящаяся *). *glandula thymus*.

18. Спинныя или позвоночныя желѣзы Безалиевы, на четвертомъ и пятомъ спинномъ или хребешномъ позвонкѣ находящіяся. *glandulae dorsales Wesalii*.

19. Типечныя желѣзы. *glandulae mamariae*.

*) Сія желѣза тѣмъ больше бываетъ, чѣмъ люди бываютъ моложе. Она отдѣляетъ пасоку, которую чрезъ особыя протоки изливаетъ въ легочныя пазухи для известныхъ причинъ.

§ 117. Брюшныя желѣзы суть:

20. Пригожемясная, или большая языкообразная поджелудочная желѣза, отъ низшей поджелудочной части до двенадцатиперстной кишки

кишки продолжающаяся (pancreas). протокъ сего желѣзы оканчивается въ выше помянутую двенадцатиперстную кишку.

21. Брыжеевныя желѣзы (mesentericæ glandulæ). Сии желѣзы находятся въ брыжеекѣ или плѣнѣ соединяющей кишки.

22. Кишечныя желѣзы, находящіяся между кишечными плѣнами, ворсаватою по естѣ и чувствительною.

23. Желѣзы желчнаго пузыря, находящіяся около шеи желчнаго пузыря и общаго желчнаго протока. (ductus cholidochus).

24. Поясничныя желѣзы, находящіяся около прѣстелища или пузыря пищавельнаго соку. (lumbares circa reservoirium chyli).

25. Крестцевыя и подвздошныя, находящіяся по естѣ около подвздошныхъ сосудовъ, желѣзы (sacrae & iliacæ).

§ 118. Желѣзы мужескихъ дѣшпордныхъ частей сущь:

26. Предспавельныя желѣзы, которыя находятся около шеи мочеваго пузыря, и имѣютъ много испражнительныхъ проходовъ. (glandulæ prostaticæ).

27. Слизеопдѣлительныя желѣзы Ковперовы, находящіяся въ мочеиспускательномъ протокѣ или спволѣ. (mucosæ glandulæ cooperi).

28. Слизеопдѣлительныя желѣзы Литровы, которыя находятся около мочеиспускательнаго спвола, и которыхъ испражнительный проходъ оканчивается въ спволѣ. (glandulæ mucosæ Litrii).

§ 119. Къ желѣзамъ дѣшородныхъ женскихъ часшей относящся:

29. Сальныя испарипельныя, душистыя желѣзы большихъ краевъ дѣшороднаго уда. (*glandulae sebaceae five odoriferae labiorum*).

30. Желѣзы сережешныя и попошечныя. (*glandulae nymphaeum & clitoridis*).

31. Склизеопдѣлипельныя спвольныя желѣзы. (*mucosae glandulae urethrae*).

32. Влагалищныя желѣзы. *glandulae vaginae*.

§ 120. Членовныя желѣзы сущь:

33. Подмышечныя, подкрыльцевыя, подручныя, подраменныя желѣзы. *subaxillares glandulae*.

34. Паховыя желѣзы. *inguinales*.

35. Склизеопдѣлипельныя желѣзы, находящіяся въ связяхъ соединяющихъ кости. *glandulae mucilaginosae in iuncturis ossium*.

36. Закожныя желѣзы. *cutaneae glandulae*.

ГЛАВА VII.

О нервологіи или наукѣ о чувствительныхъ жилахъ.

§ 121. Чувствительныя жилы либо непосредственно отъ большаго и продолговатаго мозгу, либо отъ спановой жилы произходятъ.

§ 122. Къ первому порядку чувствительныхъ жилъ, то есть къ тѣмъ нервамъ, кои отъ большаго, меньшаго и продолговатаго мозгу произходятъ, принадлежатъ:

1. Двѣ обоняпельныя чувствительныя жилы. *).

duo olfactorii nervi.

Часть I.

Г

2.

2. Двѣ зрительныя. *duo optici.*
3. Двѣ глазодвижныя. *duo oculorum motoriæ.*
4. Двѣ блоковыя, сострадательными, по естъ сосраданіе какое либо изображающими именуемая, чувствительныя жилы. *duo pathetici nervi.*

8. Двѣ происшвенныя или пречасшныя чувствительныя жилы, раздѣляющіяся на 3 вѣтви: изъ коихъ первая называется лобною чувствительною жилою (*frontalis*), другая слезною (*lacrymalis*), а третія носовою чувствительною жилою. (*nasalis*).

6. Нервъ или чувствительная жила верхней и нижней челюсти.

7. Клинообразной кости и неба во рту чувствительная жила. *sphenopalatinus nervus.*

8. Луночныя, зубныя, зубныхъ ямокъ чувствительныя жилы. *alveolares.*

9. Нижеглазоямная, по естъ ниже глазной впадины проходящая чувствительная жила. *infraorbitalis.*

10. Височная чувствительная жила. *temporalis.*

11. Круговая ушная чувствительная жила. *buccinatorius.*

12. Крылообразного отростка чувствительная жила. *pterygoideus.*

13. Язычная, или вкусъ производящая чувствительная жила. *lingualis sive gustatorius.*

Всѣ сии чувствительныя жилы происходятъ отъ вышесказанныхъ трехъ вѣтвей.

14. Чувствительныя глазоотводительныя или негодующія жилы. *nervi abductores s. indignabundi.*

15. Двѣ слышапельныя чувспвипельныя жилы. *duo acustici.*

Сѣ двумя оныхъ вѣтвями, изъ коихъ вышняя вѣтвь мягкою слышапельною чувспвипельною жилою называется.

16. Двѣ скипающіяся чувспвипельныя жилы. *vagi duo.*

Опѣ коперыхъ проходящѣ двѣ чувспвипельныя, вышняя по еспѣ и низшая воздушноснаго канала, жилы.

17. Двѣ нижезатылочныя чувспвипельныя жилы. *duo infraoccipitales nervi.*

18. Двѣ чувспвипельныя междуреберныя великія жилы, иначе еще *симпатическими* или *согласными* называемыя. *Sympathetici.*

*) Обонятельныя чувспвипельныя жилы внутри сущѣ полны, что изъ разсматриванія оныхъ по вскрытіи мертваго тѣла удобно видѣть можно. А какъ въ другихъ чувспвипельныхъ жилахъ, ниже помощію увеличивательныхъ стеклъ никакой полосп видѣть не можно: для того Шлевогдѣй и другіе сѣ нимъ за истинныя оныхъ не почитаютъ.

§ 123. Изъ спановой мозговой жилы происходящѣ:

19. Семъ зашеешныхъ или между позвоношныхъ шейныхъ чувспвипельныхъ жилъ, имѣющихъ происхожденіе свое опѣ шейныхъ позвонковъ. Сіи чувспвипельныя жилы, проспираясь вмѣстѣ, идутъ до грудобрюшной перепонки и подреберной плевѣ.

20. Двенадцать парѣ хребешныхъ или междупозвоношныхъ хребешныхъ чувспвипельныхъ

жилъ, отъ которыхъ происходятъ плечныя или
раменные чувствительныя жилы. (*nervi brachiales*).

21. Пясть паръ поясничныхъ чувствитель-
ныхъ жилъ, отъ которыхъ происходятъ колен-
ная или берцовая чувствительная жила. (*cru-
ralis*).

22. Пясть или шесть чувствительныхъ
крестцевыхъ жилъ, отъ которыхъ происходятъ
сѣдалищная, надвертлужная чувствительная
жила. (*nervus ischiadicus*).

ГЛАВА VIII.

О Ангіології или наукѣ о сосудахъ.

§ 124. Ангіологія преподаетъ знаніе или свѣ-
дѣніе о біющихся или кровеносныхъ и небію-
щихся или крововозвратныхъ жилахъ: къ си-
стемѣ біющихся или боевыхъ жилъ относятся:

1. Боевая начальственная или великая жила
(*aorta*), происходящая отъ лѣваго сердечнаго
пустыря. Сія боевая начальственная жила раз-
дѣляется на восходящую и нисходящую началь-
ственные жилы.

§ 125. Отъ великой восходящей боевой жилы
происходятъ три вѣтви: изъ коихъ первая
вѣтвь называется:

2. Безымянною боевою жилою. *arteria innomi-
nata*.

Другая боевою сонною жилою. *carotis*.

А третія подключевою лѣвою боевою жилою.
subclavia sinistra.

Отъ безымянной боевой жилы происходятъ:

3. Подключевая правая большая жила. *arteria subclavia dextra.*

§ 126. Боевыхъ сонныхъ жилъ имѣется только двѣ: правая происходитъ отъ безымянной бѣющейся жилы, а лѣвая отъ дуги бѣющейся начальспивенной жилы (*ex arcu aortae*), и въ восхожденіи своемъ около дыхательнаго горла разделяется на двѣ жилы, на внѣшнюю по еспѣ и внутреннюю. Сихъ боевыхъ жилъ въпви сущь:

4. Подъязычная бѣющаяся жила. *sublingualis.*

5. Челюстная бѣющаяся жила низшая и внѣшняя. *arteria maxillaris inferior & externa.*

6. Челюстная внутренняя. *interna.*

7. Бѣющаяся зрительнаго нерва жила. *optica.*

8. Бѣющаяся глазной ямы жила, чрезъ клинообразную кость проходящая. *orbitalis arteria.*

Сии бѣющіяся жилы происходятъ отъ боевой сонной внутренней жилы.

§ 127. Отъ бѣющейся сонной внѣшней жилы происходятъ:

9. Бѣющаяся запылошная жила. *arteria occipitalis.*

10. Бѣющаяся ушная внѣшняя жила. *auricularis externa.*

11. Бѣющаяся височная жила. *temporalis.*

§ 128. 12. Бѣющаяся подключевая жила происходитъ отъ безымянной бѣющейся жилы (§ 125), а лѣвая отъ дуги большой бѣющейся жмлы. Оныхъ въпви сущь:

13. Біющаяся питтешная внутренняя жила. *mammaria interna.*

14. Біющаяся средогрудостѣнная жила. *mediastina arteria,*

15. Біющаяся зобная, зобной по естъ желѣзы жила. *thymica.*

16. Біющаяся околосердечная, околосердечной по естъ оболочки, жила, *pericardina.*

17. Біющаяся дыхательнаго канала жила. *trachealis.*

18. Біющаяся зашейныя, передняя по естъ и задняя, жилы. *cervicales.*

19. Біющаяся позвоночная жила. *vertebralis.*

20. Біющаяся твердой мозговой оболочки жила. *arteria duræ matris.*

21. Біющаяся междуреберная вышняя жила. *intercostalis superior.*

§ 129. Когда боевая подключевая жила выше перваго ребра изъ груди шеенаклонительныя проходитъ мышцы, то тогда называется:

22. Біющеюя подмышешною жилою *axillaris,* коея вѣзви сущь:

23. Біющаяся грудная вышняя и низшая или питтешная наружная жила. *thoracica superior & inferior five mammaria externa.*

24. Біющаяся лопатошная вѣшняя и внутренняя жила. *scapularis.*

25. Біющаяся раменная жила. *homeralis arteria.*

§ 130. Естли боевая подмышешная жила (§ 129) проходитъ подъ грудною большею мышцею, то перяетъ имя свое и называется:

26. Біющюся раменною жилою *brachialis*, опѣ которой происходятъ:

27. Біющяся локошная жила. *cubitalis*.

28. Біющяся лучной кости или лучная жила. *radica*.

29. Біющіяся между костными внѣшнія и внутреннія жилы. *arteriae interosseae*.

§ 131. Опѣ боевой большой низходящей жилы происходятъ:

30. Біющяся воздуходвижного канала жила. *bronchialis*

31. Біющяся пищепріемного канала жила. *oesophagea*.

32. Біющіяся преградобрюшныя жилы. *diaphragmaticae*.

33. Біющіяся междуреберныя низшія жилы. *arteriae intercostales inferiores*.

34. Біющяся брюшная жила, *arteria coeliaca*, опѣ которой происходятъ:

35. Біющяся вѣнечная или венцеобразная желудочная жила. *coronaria stomachica*.

36. Біющяся печеночная жила. *hepatica*.

37. Біющяся селезеночная жила. *splenetica*.

§ 132. Опѣ сей селезеночной боевой жилы (§ 131) опять происходятъ:

38. Біющяся поджелудочной желѣзы жила. *pancreatica*.

39. Біющяся чревная меньшая жила. *gastrica minor*.

40. Біющіяся короткія желудочныя жилы. *brevis in ventriculo*.

41. Біющаяся сальнииная, вѣ сальникѣ по
есѣ находящаяся, жила. *epiploica in omento.*

42. Біюціяся брижейная вышняя и низшая
жилы. *mesentericae.*

43. Біюціяся почечныя жилы. *renales.*

44. Біюціяся сѣмненныя жилы, *fergaticae*, ко-
порыя вѣ мущинахѣ вѣ япрахѣ, а вѣ женщи-
нахѣ вѣ яишникахѣ и фаллопиевыхѣ трубахѣ пе-
ряюпся.

45. Біюціяся пояснишныя жилы. *lumbares.*

46. Біюціяся крестцевыя жилы. *sacrae.*

§ 133. Когда низгодящая большая боевая жи-
ла (*aorta*) достигнетѣ до пяпаго пояснишнаго
позвонка; то испускаетѣ изѣ себя двѣ вѣшви,
копорыя называются:

47. Подвздошными біющимися жилами (*iliacae*);
а сіи подвздошныя боевыя жилы раздѣляются
опять па двѣ вѣшви вѣ восхожденіи своемѣ
какѣ-то:

48. На подвздошную внѣшнюю и внутреннюю,
или подчереvныя біюціяся жилы. *hypogastricae.*

Опѣ внутреннихѣ происходятѣ:

49. Закупорывательная біющаяся жила. *obtu-
ratoria.*

50. Біющаяся малая подвздошная жила. *iliaca
parva arteria.*

51. Ягоднишная, сѣдалищная біющаяся жила.
glutea.

52. Надверплужная біющаяся жила. *ischiastica.*

53. Срамотная общая біющаяся жила. *rudenda
communis.*

Ко-

Которая двѣ вѣтви имѣетъ, изъ коихъ передняя проходитъ пещеры или пѣла дѣшороднаго уда, а задняя подъемную дѣшороднаго члена мышцу. (*erectorem penis tranſit*).

§ 134. Изъ вѣтвей подвздошной боевой жилы происходятъ :

54. Надчеревная бѣющая жила. *epigaſtrica*.

55. Срамошная закожная бѣющая жила. *cutanea pudenda arteria*.

§ 135. Когда подвздошная вѣтвей боевая жила выходитъ изъ чрева; то тогда называется :

56. Голенною или берцовой бѣющею жилою. *arteria cruralis*.

А когда сія жила дойдетъ до колѣнъ, то тогда именуется :

57. Подколенную бѣющею жилою, (*poplitea*) которая подколенная жила раздѣляется опять на двѣ вѣтви, изъ коихъ одна

58. Берцовой заднею (*tibialis posterior*), а другая

59. Сопелашною или дудашною (*peronea*) называется, которая дудашною то есть кисти боевая жила опять раздѣляется на двѣ вѣтви, а имено: на

60. Подошвенную, вѣтвей то есть и внутреннюю, бѣющую жилы. *plantares interna & externa*.

§ 136. Легкошная боевая жилы суть :

61. Легкошная бѣющая жила (*arteria pulmonalis*), происходящая отъ праваго пусыря въ сердце, и имѣетъ внутри при полулунныя заслонки, (*valvulae ſemilunares*). Когда сія жила выходитъ

изъ околосердечной оболочки; по раздѣляется на двѣ вѣтви: а имянно:

62. На легочную правую и лѣвую бѣгущіяся жилы. правая входитъ въ правую легочную мочку или долю, а лѣвая входитъ въ лѣвую.

§ 137. Находясь еще нѣкопорыя кровеносныя жилы, а имянно:

63. Вѣтвистыя сердечныя бѣгущіяся жилы. *coronariae cordis.*

§ 188. Къ Системѣ крововозвратныхъ жилъ относятся:

1. Большая крововозвратная полая жила. *vena cava.*

2. Воротная крововозвратная жила. *vena portae.*

3. Легочная крововозвратная жила. *pulmonalis.*

4. Полая или дуплистая крововозвратная жила раздѣляется на верхнюю и нижнюю; верхняя полая крововозвратная жила восходитъ чрезъ околосердечную перепонку даже до перваго позвонка или ребра. Гдѣ опять раздѣляется на двѣ большія вѣтви, которыя называются *подключевыми* (*subclaviae*) крововозвратными жилами.

§ 139. Отъ полая крововозвратныя жилы происходятъ:

5. Средогрудостѣнная правая крововозвратная жила. *mediastina vena.*

6. Правая крововозвратная жила околосердечной перепонки. *pericardina dextra.*

7. Прегрудогрудобрюшная верхняя крововозвратная жила. *diaphragmatica superior.*

8. Крововозвратная зобной или грудной железы жила. *thymica vena.*

9. Тщешная внутренняя правая крововозвратная жила. *mammaria interna vena.*

10. Дыхательного горла правая крововозвратная жила. *vena trachealis dextra.*

11. Безпарная или одинакая крововозвратная жила. *vena azygos.*

Сия жила испускаетъ изъ себя междуреберныя низшія правую и лѣвую жилы.

§ 140. Подключевыя крововозвратныя жилы (§ 138) раздѣляются на подключевыя правую и лѣвую жилы, отъ которыхъ происходятъ:

13. Грудосредостѣнная лѣвая крововозвратная жила. *mediastina sinistra.*

14. Крововозвратная сердце окружающей перепонки жила. *pericardina.*

15. Преградогрудобрюшная крововозвратная жила. *diaphragmatica.*

16. Грудножелѣзная или зобная крововозвратная жила. *thymica.*

17. Внутренняя тщешная крововозвратная жила. *mammaria interna.*

18. Крововозвратная дыхательного горла жила. *trachealis.*

19. Крововозвратныя духодвижныхъ каналахъ жилы. *bronchiales venae.*

20. Междуреберныя вышія крововозвратныя жилы. *intercostales superiores.*

§ 141. Сии двѣ подключевыя крововозвратныя жилы имѣютъ четыре слѣдующія вѣтви, отъ которыхъ происходятъ:

21. Яремныя или переднешейныя вѣтвныя и внутренняя крововозвратныя жилы. *jugulares externa & interna.*

22. Позвоночная крововозвратная жила. *vertebralis.*

23. Подмышечная жила. *subclavia.*

§ 142. Отъ подмышечной жилы (§ 141) происходятъ опять:

24. Грудныя вышняя и низшая крововозвратныя жилы. *toracicae superior & inferior.*

25. Головная большая жила, получающая происхожденіе свое около головы плечевой кости: отъ сея жилы происходитъ:

26. Лучевая вѣтвныя крововозвратная жила, проспирающаяся даже до большого пальца. *radialis vena.*

Въ такомъ случаѣ называется она:

27. Головную крововозвратную жилую большого пальца. *cephalica pollicis.*

Она есть самая большая вѣтвь лучной жилы. меньшая вѣтвь называется:

28. Среднюю локотную или меньшую головную. *mediana.*

29. Среднюю внутреннюю ручную крововозвратную жилую. *cephalica minor & mediana basilica.*

§ 143. Низшая полая крововозвратная жила, (§ 128) прежде нежели пройдетъ грудобрюшную перегородку, раздѣляется на двѣ вѣтви, которыя называются:

30. преградобрюшными, и

31. Печеночными крововозвратными жилами, вселяющимися въ печеньку. *diaphragmaticæ & hepaticæ.*

Отъ полой низшей крововозвратной жилы происходятъ :

32. Почечныя правая и лѣвая крововозвратныя жилы, вселяющіяся въ почки. *renales dextra & sinistra vena.*

33. Сѣменная первая крововозвратная жила. *sematica dextra.*

34. Поясничныя крововозвратныя жилы. *venæ lumbares.*

§ 144. Полая низшая или низходящая крововозвратная жила раздѣляется около послѣдняго поясничнаго позвонка на двѣ части, отъ котораго раздѣленія происходятъ :

35. Подвздошныя крововозвратныя жилы. *iliacæ venæ.*

36. Крестцевыя крововозвратныя жилы. *sacæ.*

37. Подчеревныя крововозвратныя жилы. *venæ hypogastricæ.*

Отъ сея жилы происходятъ :

38. Золотая, геморойная, или почечуйная, внѣшняя жила. *hæmorrhoidalis externa.*

39. Срамныя внутреннія крововозвратныя жилы. *rudendæ internæ.*

§ 145. 40. Селезеночная крововозвратная жила. *splenetica.*

Отъ которой происходятъ :

41. Золотая или геморойная внутренняя крововозвратная жила. *hæmorrhoidalis interna.*

§ 146. Естли подвздошная крововозвратная жила выдепъ изъ брюха ; по называется :

42. Голенную крововозвратную жилую. *cruialis*.

Отъ которой происходяпъ :

43. Берцоплюснотая большая крововозвратная жила , которая разспилается по всей ногѣ. *farticena magna*.

44. Сѣдалищная крововозвратная жила. *ischia-dica vena*.

45. Подколенная крововозвратная жила. *poplitea*.

46. Берцовыя передняя и задняя крововозвратныя жилы. *tibialis anterior & posterior*.

47. Ляшковая крововозвратная жила. *furalis*.

48. Сопелощная или дудощная крововозвратная жила , которая проходитъ чрезъ сопелощную ножную кость и вселяется въ ножную мышцу , сопелощную же называемую. *peronea*.

§ 147. Отъ воропной крововозвратной жилы происходяпъ двѣ великія вѣтви , которыя кровь изъ желудка, поджелудочной желѣзы, кишекъ и селезенки принимающъ и опносяпъ къ печенкѣ. первая вѣпвь называетъ :

49. Печеночю или вышшею ; также и меньшею воропную жилую , которой произхождение или начало называется лазухю воропной крововозвратной жилы (*sinus portæ*.) а другая :

50. Воропную чревную или низшею , также и меньшею крововозвратною жилую , (*portæ ventralis*), происходящую отъ вышеупомянутой лазухи.

§ 148. Отъ воропной печеночной вышшей крововозрапной жилы происходятъ при вѣпви, а имянно :

51. Пузырежелчныя двойныя или равныя крововзрапныя жилы , даже до дна пузыря желнаго распростирающіяся. *cisticæ gemellæ*.

52. Крововозрапная праваго желудочнаго устья жила , проходящая выше праваго устья желудка. *pylogica*.

53. Кишечная крововозрапная жила , то есть жила двенащипидьюмовой кишки , *duodenalis*,

54. И печеночная крововозрапная жила , копорая есть нечто иное , какъ одна отрасль пузырежелчной крововозрапной жилы.

§ 149. Отъ низшей крововозрапной воропной жилы происходятъ при нижеслѣдующія вѣпви :

55. Большая брижейная крововозрапная жила. *meseraica major*.

56. Селезеночная проходящая то есть селезенку крововозрапная жила. *splenetica vena*.

57. Кровопротипная или геморойная внутрениая крововозрапная жила. *hemorrhoidalis interna*.

Сія жила называется еще иначе крововозрапною меньшею брижейною жилою. *meseraica minor*.

§ 150. Отъ большой крововозрапной жилы (§ 149) происходятъ :

58. Крововозрапная ободошная , ободошной то есть кишки жила , къ средней части ободошной кишки идущая. *colica vena*.

59. Крововозвратная желудочноободочная, по-
есть желудка и ободочной кишки, жила. *gastro-
colica*.

60. Отъ которой происходитъ правая желу-
дочносальничная крововозвратная жила, кото-
рая большой кругъ желудка проходитъ. *gastroe-
piploica dextra*.

61. Сальничная крововозвратная правая жила,
идущая къ сальнику. *epiploica dextra*.

§ 151. Отъ селезеночной крововозвратной
жилы (§ 149) происходятъ:

62. Крововозвратныя короткія желудочныя
жилы. (* *venae breves*).

63. Вѣчная желудочная крововозвратная
жила, простирающаяся къ лѣвому желудочному
устію. *coronaria stomachica*.

64. Крововозвратная пригожемясной поджелу-
дочной желѣзы жила. *pancreatica*.

65. Лѣвая крововозвратная желудочная жила,
къ великому кругу желудка идущая. *gastrica si-
nistra*.

66. Крововозвратная лѣвая сальничная жила,
идущая къ сальнику. *epiploica sinistra*.

*) Здѣсь надобно замѣтить, что сіи жилы, будучи
разлѣденны какою либо острою матерією, находя-
щеюся въ желудкѣ, и раздушы кровію, которое
раздушіе происходитъ отъ засоренія селезенки,
причиняютъ кровавую рвоту, къ излѣченію кошо-
рой, смотря по обстоятельству, должно пускать
кровь, ставить промывательныя лѣкарства, и упо-
треблять заживлятельныя ошвары.

§ 152. Легкопныя крововозвратныя жилы
суть шѣ жилы, которыя кровь изъ легкопныхъ


сосудовъ получаютъ и отнoсятъ въ лѣвую по-
лoсѣ или лѣвой пуспырь сердца. Сіи жилы со-
спаваютъ чепыре вѣшви, въ мышковой сумѣ
или мѣшкѣ соединяющіяся. Оная сума называе-
ся сумою легкопныхъ крововозвратныхъ жилъ,
или *лѣвымъ Ловеріевымъ мѣшкомъ* или *лазухою*
(*Loverianus fassus*).

§ 153. Подъ языкомъ находящіяся крововоз-
вратныя жилы называются:

67. Жабными, или подъязычными крововоз-
вратными жилами. *gaping venæ*.

КОНЕЦЪ АНАТОМІИ.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

О

Физиологii или наукъ , показывающей
дѣйствiя и употребленiе какъ жидкихъ ,
такъ и твердыхъ частей жизнию одарен-
наго человѣческаго тѣла. изъясняющей всѣ
душевные управленiя и предлагающей за-
коны , по которымъ душа на тѣло, а
тѣло на душу взаимно и прили-
чно человѣческому тѣлу
дѣйствовать могутъ.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

О физиологiи или наукѣ о человѣческомъ естествѣ.

ГЛАВА I.

§ 154. Наука, преподающая знаніе о дѣйствіяхъ *) и употребленіи частей одареннаго живію человѣческаго шѣла, копорыя мы кратко показали въ первой части сей книги, называется Физиологіею, или наукою о человѣческомъ естествѣ. (physiologia).

- *) Великій Бургавъ шакowychъ отпращеній и дѣйствій человѣческихъ постановляетъ шесть классовъ. Первый классъ заключаетъ въ себѣ дѣйствія, жи з н е н н ы м и называемыя, безъ копорыхъ то есть жить, существовать и продолжаться не можетъ. Таковыя суть: дѣйствіе мышцъ, сославляющихъ сердце, дѣйствіе мозга, легкаго, крови и чувствительныхъ жилъ. Второй классъ заключаетъ дѣйствія, н а ш у р а л ь н ы м и называемыя, каковы суть дѣйствія внутренностей нашихъ, влагъ и сосудовъ содержащихъ оныя, движущихъ, перемѣняющихъ, сибшивающихъ, отдѣляющихъ, извергающихъ, и прочая. Сіи дѣйствія принимаюу нами пищу, перемѣняютъ въ вещество шѣлу нашему подобное. Третій классъ заключаетъ дѣйствія ж и в о ш н ы м и или д у ш е в н ы м и называемыя, посредствомъ копорыхъ душа понимаетъ

и разсуждать можеть. Таковая способность въ живот-
ныхъ называется побужденіемъ (instinctus).
Четвертый классъ заключаетъ дѣйствія мужескому
и женскому полу свойственныя. Сіи дѣйствія слу-
жатъ къ произведенію и продолженію человѣческаго
племени. Пятый классъ заключаетъ приващныя
или особыя дѣйствія, копорыя особое нѣчто про-
изводятъ на пр. мозгъ, жизненные соки и проч.
Шестой классъ заключаетъ общія дѣйствія. Како-
вы суть дѣйствія сердца и пр. Къ жизненнымъ дѣй-
ствіямъ относительно до твердыхъ частей относят-
ся особливо сжимаемость, чувствитель-
ность, раздражительность, особая
жизнь и образовательная сила. Смотр.
Плюменбаха Физіолог. стр. 32. 33. 34. и 35.

§ 155. Человѣческое тѣло состоитъ изъ
твердыхъ и жидкихъ частей (§ 6). Къ твер-
дымъ частямъ относятся по большей части
волопи (fibrae), о копорыхъ, такъ какъ о са-
мыхъ тончайшихъ мясистыхъ или другаго рода
жилкахъ, разсуждать должно.

§ 156. Естли вышесказанныя оныя волопи
въ количествѣ умножаются и одно только со-
ставляють большее волокно, тогда называ-
ются оныя по мяснымъ или мясистымъ жила-
мъ (fibrae carnae), по сухожильнымъ волопиямъ
(tendinae), по нервнымъ или чувствительнымъ
нишамъ. Впрочемъ всякая волопь одарена естъ
упругою силою.

§ 157. Всякая волопь, или всякое волокно
имѣетъ опредѣленную нѣкоторую степень, какъ
мягкости своей, такъ и упругости, ко-
порой степень медики называютъ равнове-
сіемъ, крѣлостію или тономъ, (tonus). Почему

волопи нѣсколько постоянно и всегда спремѣн-
я къ сжиманію своему или сокращенію, но и
сопротивляющіяся всякой силѣ растягивающей
онѣя.

§ 158. Всякая мышца (musculus), когда она
дѣйствуетъ, бываетъ короче и въ то же вре-
мя становится полще, слѣдственно и болѣе
краснѣетъ. Но чѣмъ меньше дѣйствуетъ она, тѣмъ
болѣе блѣднѣетъ, или тѣмъ больше пре-
ряетъ своей румяности или краски.

§ 154. Маловременное или мгновенное оное
сердца состояніе, когда то есть мышцы со-
ставляющія сердце сжимаются, отъ чего сер-
дце снѣняется, называется сжиманіемъ или
сжатіемъ сердца (sistole), а когда въ слѣдую-
щую минуту вышепомянутыя мышцы разши-
ряются, и сердце раздается, то сіе явленіе на-
зывается разширеніемъ или разжатіемъ сердца
(diastole).

§ 160. Кости суть опоры и утвержденія
живаго человѣческаго тѣла.

ГЛАВА II.

О рожденіи

или

Принадлежностяхъ и потребностяхъ
человѣческихъ къ произрожденію.

§ 161. Способность къ произрожденію въ мущи-
нахъ въ нашихъ холодныхъ климатахъ и мѣстпопо-
ложеніяхъ рѣдко прежде двенадцати лѣтъ, а

въ женщинахъ прежде четырнадцатаго года находилъ. Опытъ подтверждаетъ, что способность она въ мужскомъ полѣ до 60, а иногда и до 70 лѣтъ пребываетъ, а въ женскомъ полѣ до 40 лѣтъ продолжается.

§ 162. Къ сей могущности или къ сей способности необходимо взыскиваются (§ 161) сущест্বованіе мужскаго сѣмяни и сила извергающаго оное. Но урочное или временное печеніе крови у женщинъ изъ дѣтородныхъ частей къ сей способности или къ зарожденію не всегда бываетъ совершенно необходимымъ.

§ 162. Теченіе мѣсячныхъ кровей въ первой разѣ появляющейся скорѣе случается дороднымъ или многосочнымъ дѣвицамъ, домасѣдную или сидячую провоздающимъ жизнь; роскошно и прохладно живущимъ и покоющимся въ праздности. Напротивъ того гораздо позже появляется мѣсячныхъ кровей теченіе у тѣхъ дѣвицъ, копоры живутъ умеренно, употребляютъ пищу грубую и упражняются въ какихъ либо работахъ, пребывающихъ особливаго тѣлодвиженія.

§ 164. Сіе мѣсячное кровотеченіе иногда имѣетъ мѣсто, или лучше сказать случается первыхъ мѣсяцовъ беременности.

§ 165. Спрямленіе или приращеніе крови къ дѣтороднымъ женскимъ частямъ есть большее, нежели къ другимъ частямъ ихъ тѣла. А сіе потому, что кровь по причинѣ своей тяжести въ большемъ количествѣ низтекаетъ къ дѣтороднымъ

роднымъ частямъ, и что крововозвратныя маточныя жилы никакихъ не имѣютъ заслоночекъ, могущихъ сопротивляться низпеченію крови; наконецъ можетъ еще быть причиною сего явленія и великое множество кровеносныхъ сосудовъ, входящихъ въ дѣтородныя части, изъ сѣмянныхъ, подчревныхъ и гомеройныхъ или кроволитныхъ вѣтвей.

§ 166. Мужское человѣческое сѣмя, относительно до дѣйствія произрожденія, есть матерія густая, бѣловатая и не много прозрачная, приутопленная или выработанная въ ядрахъ, имѣющая особенной запахъ, которая на опкрытомъ воздухѣ скоро жидѣетъ.

§ 167. Къ мужской могущности также бываетъ потребно надлежащее количество и качество *) сѣмени; надлежащее устройство и величина дѣтородныхъ частей; воспаніе и опверденіе дѣтороднаго члена, которое продолжается до тѣхъ поръ, пока извержется сѣмя.

*) Ибо какъ недостатокъ сѣмени въ сѣмянныхъ мужскихъ пузырькахъ дѣлаетъ человѣка неспособнымъ къ брачному ложу, такъ и худое качество оного равною же подвергаетъ человѣка участи. Недостаточное сѣмя не можетъ произвести въ человѣкѣ спраснаго огня, а худыхъ качествъ сѣмя, каковы суть жидкость и разплывчивость оного, не можетъ оплодородить матерняго яичка, яко неимѣющее той образовательныя силы, которая возбуждаетъ жизнь въ новомъ, имѣющимъ родиться, плодѣ.

§ 168. Причины дальнего любострастнаго побужденія суть юношескія и мужескія лѣта;

здоровье и немокропное сложеніе шѣла; чело-
вѣкъ ни совѣмъ празденъ, ни изнеможенъ тру-
дами, но опѣ всѣхъ заботъ и глубокихъ раз-
мышленій свободенъ; свѣденіе правоты и не-
винности; живое и сильное воображеніе и нако-
нецъ любимой предметъ, возбуждающій любовной
пламень въ спремляющейсѣ къ оному особѣ.

§ 169. Сіи самыя причины (§ 168) бывающѣ
любострастнаго желанія и въ женскомъ полѣ.
Къ чему также прибавить должно разгоряченіе
и накопленіе сѣмяни въ предспачельныхъ же-
лѣзахъ; щекопаніе языка, находящагося въ
верхней часпи дѣшороднаго уда, и нимфѣ или
дѣшородноудныхъ сережекъ.

ГЛАВА III.

О совокуленіи и зачатіи.

§ 170. Соестояніе шѣла въ женщинѣ, воспо-
слѣдовавшее опѣ изверженія мужскаго плодо-
роднаго сѣмяни во влагалище ея машки, такъ,
что она опѣ того по прошествіи нѣсколькихъ
дней бываетъ беременною, или понесетъ плодъ
въ прубѣ своей, называеиъся *плодоноснымъ со-
вокуленіемъ*. (fecundus congressus).

§ 171. Зачатіе или понесеніе плода въ упрор-
бѣ (conceptio) естъ возспановленіе жизни *) или
возженіе жизненности въ новомъ разумѣ ода-
ренномъ живошномъ въ женскомъ шѣлѣ, мужскимъ
сѣмянемъ произведенное.

*) Сіи

*) Сїи слова : возе ш а н о в л е н і е ж и з н и , нечто иное означаютъ, какъ оживленіе зародыша или соединеніе души съ тѣломъ, о пребываніи которыхъ, времени и образѣ соединенія различныя находящіяся мнѣнія. Одни говорятъ, на пр. Гиппократъ и Герофилъ, что душа пребываетъ въ мозговыхъ полосахъ. Другіе, на пр. Демокритъ, во всемъ тѣлѣ пребываніе оныя полагаютъ; прочіе, на пр. Спрабонъ между бровями; Спойки въ сердцѣ; Гелмонтъ въ правомъ устьѣ желудка; Ланцизій въ прозрачномъ мозговомъ проспѣнкѣ жилище души пославляетъ. Лучше сказать, что мы не знаемъ, гдѣ точно душа обитаетъ въ тѣлѣ, естли не можемъ вѣрить Галену, сказывающему, что душа во всякой часницѣ тѣла нашего существуетъ, не м а ш е р і я л ь н о , н о г о с п о д с т в е н н о и п о в е л и ш е л ь н о . Чтожъ до времени соединенія души съ тѣломъ, то такъ же разныя имѣются мнѣнія. Гиппократъ говоритъ, что душа послѣ зачатія въ мужинахъ 30, а въ женщинахъ, въ женскомъ по естѣ полѣ, 40 или 42 дня соединяется съ тѣломъ. На противъ Меркуріалъ, предаваясь судебнымъ климатерическимъ и называемымъ числамъ, говоритъ, что душа соединяется съ тѣломъ 7 дня послѣ зачатія, поелику человекъ въ 7 дней со всѣмъ въ тѣлѣ своемъ совершается. Но лучше сказать, что душа съ тѣломъ соединяется не понятнымъ намъ образомъ въ то самое время, когда образовательною силою мужескаго семени о плодородяется спѣлое и зрѣлое яичко въ матрнемъ яичникѣ. Держащіяся мнѣнія сего называющіяся Тр а д у ц і я н а м и , коимъ противны сущъ К р е я ц і я н е , думающіе, якобы душа вновь сопволяется, и И н ф у з і я н е , утверждающіе вліяніе душъ при зачатіи.

§ 172. Первое совокупленіе въ дѣвствѣ всегда должно быть обогренное кровію и соединенное съ болію по причинѣ разрыва перепонки, находящейся во влагалищномъ устьи, которую перепонку называющъ обыкновенно дѣвственною (hymen).

Надобно знать, что никакой мужеской членъ не можетъ проникнуть влагалища у матки, чтобы онъ того не могло воспослѣдовать разорваніе дѣйствио показующей перепонки.

§ 173. Почему кровавое совокупленіе есть несомненный и единственныи знакъ любезнѣйшаго и всякой драгоценности превосходнѣйшаго дѣйства или цѣломудрія. Однако нерѣдко случается, что перепонка онаи разрывается онъ часто повтораемаго распыренія ногъ.

§ 177. Нѣтъ никакой крайней необходимости для плодоноснаго совокупленія, чтобы мужеской членъ находился во влагалищѣ въ то время, когда извергается сѣмя, только бы изверженіе оное сѣмени было въ самое опверстіе маточнаго рукава.

§ 175. Первое мѣсто зачатія есть женской яичникъ *), изъ котораго потомъ зародышъ входитъ въ Фаллопиеву трубу, а опшуда переселяется въ матку или матернюю утробу.

*) Сіе мнѣніе сочинителя есть весьма справедливое; напрошивъ Набоша, бывшаго нѣкогда Лейпцигскаго Профессора и послѣдовавшихъ ему Фридриха Гоффмана и Французскаго Хирурга де ла Моша многому подвержено сомнѣнію, что якобы то есть находились еще и другіе яичники въ самой маткѣ, гдѣ яичка оплодороджающаи мужескимъ сѣмиемъ, когда шаковыя яички, говоритъ Руишъ, нечто суть иное, какъ одни водою наполненные пузырьки. Пространіе о семъ см. рѣчь Набоша.

§ 176. Начертаніе будущаго органическаго, иначе сказать, оруднаго плѣла сокрывается и на-

ходился прежде еще совокупленія въ женскомъ яичкѣ. *)

в) Слѣдовательно мнѣніе тѣхъ великому подверженно сомнѣнію, которые утверждаютъ, что въ произведеніи чашей въ зародышѣ нѣкопорою наблюдаемая порядкѣ, что якобы то есть первѣе производился печенька, потомъ сердце, стпановая кость и наконецъ голова; ибо физики, усматривая посредствомъ увеличительныхъ стеколъ цѣлое начертаніе растѣнія въ сѣмени самага же растѣнія, говорятъ, что и человѣкъ прежде еще зачатія или оживленія въ матери, совершенно образованъ находится въ яичкѣ. См. Бренделія разсужденіе о зародышѣ прежде зачатія, находящемся въ яичкѣ.

§ 177. Сѣмя, будучи изверженно въ мапочной рукавъ, либо проникаетъ въ мапку и потомъ въ Фаллопьевы трубы, либо не проникаетъ; впрочемъ извѣстно, что въ яичникѣ оное проникнувъ не можетъ, какъ по причинѣ своей вязкости, такъ и по причинѣ плоскости или густоты яичковой оболочки.

§ 178. Почему одинъ шокмо сѣмянной самопонкайшій духъ *) проникаетъ въ яичники способный къ учиненію зачатія; копорой духъ возбуждаетъ внушреннее движеніе во влагѣ спѣлаго яичка. Опъ копорого движенія производился жизненность въ новомъ механическомъ или самодвижномъ шѣлѣ.

*) Изъ сего удобно видѣть можно, что сочинитель опъ вергаетъ мнѣніе Левенгока, который, будучи крайне приверженъ къ оптическимъ не рѣдко обманывающимъ глаза наблюдѣніямъ, утверждалъ, что зародышъ въ мапкѣ производитъ одинъ изъ тѣхъ червей, которые съ сѣмянемъ мужескимъ извергаются въ мапку.

ГЛАВА IV.

О литаніи зародыша въ утробѣ.

§ 179. Яичко, находящееся въ мацерней утробѣ, такъ совокупляется съ оною, что изъ утробныхъ сосудовъ необходимое для кормленія зародыша приходиѣтъ въ утробу питаніе, и припомъ такимъ образомъ, что боевыя зародоша жилы соединяются съ мацерными крововозвратными жилами, а мацернія боевыя жилы соединяются съ кровововратными зародышевыми жилами. Откуда ясно, что кругопеченіе крови производится изъ мацери въ зародышъ, а изъ зародыша въ маць.

§ 180. Мапка отъ поспешеннаго, мало по есть помалу умножающагося, яичкова приращенія расширяется и спѣны оныя вкупѣ спановятся толще.

§ 181. Какъ самая мапка или утроба, такъ и ея отверстіе относительно до мѣстоположенія оныхъ во время беременности переменяются: ибо отверстіе необремененной плодомъ мапки такъ спойшѣ пропшѣ влагалища, что оное пальцами осязашъ можно. Напропшѣ беременныхъ женщинъ отверстіе утробы поднимается къ подвздошнымъ костямъ. Почему во время возвращенія зародыша отверстіе мапки пальцами осязаемо быѣ не можетъ.

§ 182. Часпи, окружающія зародышъ въ мапкѣ, сушь либо швердыя, либо жидкія. Твердыя

дья части супъ: послѣдъ или дѣтское мѣсто (placenta), оболочки и пуповина или пупочная шепива (finiculus umbilicalis). оболочекъ находи́тся двѣ, изъ коихъ верхняя или внѣшняя называе́тся соро́чкою или водною зародишевою сосу́довъ исполненной оболочкою (chorion), а нижняя, непосредственно по есѣ окружающая зароди́шъ, называе́тся то́нкою водною вну́треннею оболочкою или лѣною. (amnion).

§ 183. Пуповина, или пупочная шепива есѣ каналъ опѣ пупка зародишева кѣ срединѣ дѣтскаго мѣста проведенный и кѣ оной прикрѣпленный, чрезъ полосѣ копорого проходитъ одна крововозвратная жила и двѣ боевыя жилы, опѣ подздошныхъ зародишевыхъ жилъ произходящія, копорыя мимо боковъ мочеваго пузыря въ передней чревной части иду́шъ до пупа и наконецъ въ послѣдъ на безсмѣшныя вѣпки взаимнообразными успьями соединенныя раздѣляю́ся

§ 184. Крововозвратная пупочная жила въ зародишевомъ послѣдѣ па́кимъ же образомъ раздѣляе́ся, какъ и боевыя жилы. А когда она пройде́тъ пупокъ, то на концѣ широкой поѣпочной связки въ печенку, а наипаче въ пазуху крововозвратной ворошной зародишевой жилы вселяе́тся, и шамъ шеряе́тся изъ глазъ. Попомъ изъ сея ворошной жилы пазухи происходи́тъ новой каналъ, называемой кровеозератнымъ жилнымъ каналомъ (canalis venosus).

§ 185.

§ 185. Чѣмъ касаясь до самаго зародыша, то извѣстно, чѣмъ голова онаго шѣмъ больше имѣетъ величину, чѣмъ возрастъ онаго есть меньше, и кости головного черепа не непосредственно соединяются между собою, но посредствомъ перепонокъ. Легкія въ зародышѣ не всю трудную пустоту наполняютъ. Такъ же и въ сердечныхъ пупыряхъ неровное находится въ мѣспилище и совѣмъ иное, нежели въ взрослыхъ, а ушная преграда, то есть средостѣніе между сердечныхъ ушекъ, есть прободенное или имѣетъ у себя диру, которая дира обыкновенно отъ анапомиковъ *овальную* (*ovale*) называется, и которой посредствомъ обѣихъ ушекъ пустоты сущь соединены между собою. Дира она естъ окружена и укрѣплена плѣною.

§ 186. Ни въ какой крововозвратной жилѣ не бываетъ медлиннѣйшаго кровопеченія, какъ въ пазухѣ крововозвратной воротной жилы, по причинѣ котораго весьма пихаго и медленнаго печенія крови въ печенкѣ, кровь, приходящая изъ зародышева мѣста, гораздо большія выдерживаетъ пораженія отъ разширенія печеночной біющей жилы, нежели въ другой какой либо крововозвратной жилѣ.

§ 187. Кровь какъ въ самомъ зародышѣ, такъ и его мѣстѣ не можетъ стучаться. Слѣдовательно кровь стучается въ маперныхъ легкихъ, что случается, когда разжиженная и распущенная кровь чрезъ біющіяся пупочныя жилы пере-

переходитъ въ крововозвратныя матернія жилы, и, сгустившись, изъ біющихся матернихъ жилъ переходитъ въ крововозвратныя пупочныя зародышевы жилы.

§ 188. Кругопеченіе крови въ зародышѣ слѣдующимъ производится образомъ: кровь, приходящая изъ матери въ дѣтское мѣсто, проходитъ чрезъ крововозвратную пупочную жилу въ пазуху крововозвратной воротной жилы, и потомъ въ крововозвратный жильный каналъ, изъ пазухи же воротной жилы входитъ въ ея вѣтви, а изъ вѣтокъ чрезъ печеночныя крововозвратныя жилы въ низходящую полую крововозвратную жилу, изъ которой какъ вышшей или восходящей, такъ и низшей или низходящей входитъ въ правое ушко сердца, а изъ ушка въ правый сердечный пустырѣ. Впрочемъ нѣкоторая часть крови чрезъ овальную дыру входитъ и въ лѣвое ушко сердца.

§ 189. Вся кровь въ зародышѣ изъ правой полости сердца входитъ въ боевую легочную жилу, а чрезъ боевой жильный каналъ (*canalis arteriosus*) переходитъ въ боевую начальственную жилу, и такимъ образомъ сжатіемъ обѣихъ полостей сердечныхъ принуждается иппи частію во всѣ плѣсныя части зародышевы, частію изъ обѣихъ боевыхъ подвздошныхъ жилъ въ двѣ пупочныя, а опшуда къ мѣсту дѣтскимъ называемому.

§ 190. Калъ въ самомъ дѣлѣ производится въ зародышѣ извѣстенъ подъ именемъ первой лорони

роши (тесоніум), копорой однакожъ никогда не испражняется, пока зародышъ заключается въ своихъ мѣстахъ.

§ 191. Употребленіе и польза жидкостей или влагъ находящихся въ плѣнѣ, непосредственно окружающей младенца, состоятъ въ томъ, чтобы сохранить какъ хорошее образованіе, такъ и самой зародышъ до пришествія его въ зрѣлость или совершенство.

§ 192. Нѣжная и студенистая жидкость, находящаяся въ ропѣ у зародыша, пищепріемномъ горлѣ и желудкѣ, совсѣмъ различна есть отъ жидкости или влаги, въ зародышевой сорочкѣ находящейся.

§ 193. Матерняя кровь въ зародышѣ перемѣняется въ то самое, чѣмъ питается зародышъ.

ГЛАВА V.

О Родахъ.

§ 194. Положеніе зародыша въ маткѣ во время ношенія онаго есть слѣдующее; вся хребетная кость въ зародышѣ бываетъ наружу выдавшаяся, а голова напередъ наклоненна, бедра онаго такъ присоединены бывающъ къ брюшку и колѣна такъ наклоненны, что пяпы смѣжны бывающъ ягодницамъ. Напрощивъ руки у зародышевъ наподобіе ногъ въ натуральномъ сдержаніи положеніи и направленіи.

§ 195. По прошествіи же шести мѣсяцовъ положеніе зародыша въ утробѣ есть слѣдующее

щее: голова занимаетъ вышнее мѣсто, лице обращено на передъ и нѣсколько наклоненно къ горизонту такъ, что кажется якобы младенецъ сидитъ въ маткѣ.

§ 196. Пятаго мѣсяца зародышъ начинаеиъ двигать голову и свои члены; что обыкновенно случается въ нѣкоторыхъ беременных женщинахъ седмой недѣли, а въ нѣкоторыхъ дванадцатой послѣ зачатія. И чѣмъ больше возрастаетъ въ утробѣ младенецъ, тѣмъ больше имѣетъ движенія.

§ 197. Зародышъ или младенецъ находится въ утробѣ иногда до 38, или 39, а иногда и 40 недѣль послѣ зачатія своего.

§ 198. Во время исхожденія младенца изъ утробы на свѣтъ плѣны онаго, находящіяся еще во влагалищѣ, либо сами по себѣ разрываются, либо надлежитъ разрывать оныя самой повивальной бабкѣ, откуда вытекаеиъ вода, зародышевой рубашки чрезъ дѣтородныя части родильницы, и младенецъ всю тяжестью своею дѣйствуетъ на матку *), а матка по причинѣ сопропивленія своего въ верхней части своей больше и больше спягивается и сжимается и такимъ образомъ поспѣшествуетъ исхожденію младенца на свѣтъ.

*) Въ сіе время родильница весьма сильныя ощущаетъ боли, которыя обыкновенно называются *Переидами*, копорые переимы суть двоякіе: истинныя то есть и ложныя.

§ 199. Потребности къ натуральнымъ родамъ суть слѣдующія: Надобно, чтобы зародышъ или лучше сказать младенецъ въ концѣ девятаго мѣсяца былъ живъ, и не чрезвычайно великъ, чтобы прежде вышла голова, а лице обращенно было напередъ матерней утробы. Скоропоспѣжное же младенца изверженіе совершается въ 15 или 30 минутъ.

§ 200. Еслили младенецъ родится восьмого мѣсяца, то таковыя роды называющіяся скоропоспѣшными или преждевременными родами (*præcox partus*); а еслили зародышъ прежде седьми мѣсяцовъ извергается вонъ, то таковое изверженіе онаго называется *выкидышемъ*. (*abortus*).

§ 201. Послѣ рожденія или происхожденія младенца въ свѣтъ скоро послѣдуетъ и самое мѣсто онаго вкупѣ съ его плѣнами, каковое мѣсто извергаемое вкупѣ съ его плѣнами какъ во время родовъ, такъ и послѣ оныхъ, называется *дѣтскимъ послѣдомъ*. (*secundinæ*)

§ 202. Кровапеченіе, происходящее послѣ родовъ изъ маточнаго влагаища, называется *кровочищеніемъ послѣ родовъ*. (*Pluxus lochiorum*).

§ 203. У родильницы часто бываетъ на претій по большей части день послѣ родовъ свойственная имъ лихорадка, произходящая отъ превращающагося кругопеченія крови, сосцы надуваются, твердѣютъ и содержатъ въ себѣ молоко.

§ 204. Послѣ рожденія младенца въ свѣтъ вдругъ перевязывается пупочная шенива разпояніемъ

яніемъ на чешыре пальца отъ пупка, и чрево онаго повивается повязками, отъ чего пуповина самопроизвольно отдѣляется отъ пупа.

ГЛАВА VI.

О Круготеченіи крови. (de circulatione sanguinis).

§ 205. Спѣятельное оное или поступное движеніе кроваваго состава (*motus progressivus*), копорымъ кровь изъ сердечной полости чрезъ сосуды къ прочимъ частямъ тѣла спремится и чрезъ другія опять къ оной притекаетъ, называется *круготеченіемъ крови* (*circulatio sanguinis*), копорое круготеченіе происходитъ слѣдующимъ образомъ:

Кровь *) изъ лѣвой сердечной полости или пустыря прерывочно выпекаетъ **) въ боевыя жилы всего тѣла, исключая однѣ легкопныя. Изъ большой боевой жилы въ ея вѣтви, а изъ оныхъ въ самыя конечности бѣущихся жилъ; откуда послѣ переходитъ непрерывнымъ теченіемъ въ корни или вѣтви полыхъ жилъ. Изъ корней полыхъ жилъ во пни оной, а изъ пней безпрерывочно спремится ко правому ушку сердца. Изъ праваго ушка перетекаетъ съ прерывками въ правой пустырь сердца; изъ праваго пустыря сердца выпекаетъ въ одну только легкопную боевую жилу, а откуда въ крововозвратную легкопную жилу. Потомъ изъ крововозвратной

легкопной жилы прогоняется къ лѣвому ушку сердца, а изъ онаго въ лѣвой пуспырь сердца, Откуда она прежде произпекла.

*) Сочинитель, по причинѣ напѣренія своего, не упомянулъ здѣсь о составныхъ частяхъ крови, почему должно знать слѣдующее. Кровь, будучи выпущенна изъ челоѣка, показываетъ, что она состоитъ изъ четырехъ наипаче частей 1.) изъ водяности (serum), которая, когда выпущенная кровь находится еще теплою въ сосудѣ, подымается въ видѣ пару вверхъ, и которая, будучи собрана поставленнымъ надъ сосудомъ колпакомъ, соспелаетъ капли, подобныя каплямъ обыкновенной ключевой воды, исключая то, что издаетъ нѣкоторый всякой запахъ, который по справедливости называющъ животною. Ся водяность имѣетъ изъ желта-красноватой цвѣтъ, которая тѣмъ болѣе умножается, чѣмъ долѣе кровь стоитъ въ сосудѣ и простываетъ. Посрединѣ ся водяности составляетъ слишокъ, обыкновенно сгущеніемъ крови называемой, которой слишокъ можно рѣзать ножомъ, и которой называется то острою, то печенкою крови, и проч. Сей кровавой слишокъ, если его часто перимывать въ водѣ, раздѣляется на двѣ части на кровавую краску (serum), и пасоку (lympha), которая пасока ислику имѣетъ больше сродства съ кровью, нежели водяность, для того называется основаніемъ крови. Откуда видно, что кровь первоначально состоитъ изъ четырехъ частей водяности то есть, сыворошки, кровавой краски, и пасоки. Кровавая водяность имѣетъ спуденистое свойство, доставляющее крови надлежащую вязкость, почему она можетъ при 150 степеняхъ по Фаренгейтову термомѣру затвердѣвать на подобіе яица, а Москашъ говоришь, что она и онъ примѣшенія къ ней извести въ таковое же можетъ приходиль состояніе, хотя и не такъ скоро. Кровавая краска, которая едва бываетъ прежде четырехъ недѣль послѣ зача-

зачатія въ зародышѣ, состоятъ изъ шариковъ первѣе Лавенгокомъ примѣчанныхъ, которые шарики изъ шесни ли другихъ состоятъ шариковъ, или колечковъ по дела Торру, или изъ пузырьковъ черными ядрышками наполненныхъ по Гевзону, еще точно на то новѣйшіе сочинители, на пр. Плюмбахъ, положились не могутъ. Чшо жъ касался до величины оныхъ, то Физіологи въ томъ не согласны. Галей говаритъ, что оны имѣютъ поперечникъ равной $\frac{1}{3240}$ унца, а Сенакъ $\frac{1}{3300}$. Красной цвѣтъ крови, который, еслии поставишь кровь на атмосферической воздухъ, или дефлогистированной, лишенной то есть излишняго горючаго вещества, гораздо бываетъ цвѣтнѣе, нежели въ постоянномъ и горючемъ воздухъ, Галлей полагаетъ въ желѣзной извести или шафранъ, хотя впрочемъ и весьма мало оного находится въ крови шакъ, что Менгинъ содержаніе оного ко всему составу крови посповляетъ какъ 1. къ 100, а Редъ какъ 1. къ 427 или къ 1. къ 503. Однако должно знать, что желѣза въ крови прежде пережженія оной никакимъ образомъ открыть невозможно, хотябы кровь просто высушить и спереть въ самой мѣлкой порошокъ, и, положивъ оной либо въ воду, либо въ ршуть, послѣ искашь слѣдовъ желѣза посредствомъ магнита. Пасока много имѣетъ сходства съ водяностию, исключая то, что она на холодномъ воздухъ стущается, а отъ примѣшенія къ оной извести не твердѣетъ, но жидѣетъ. Наконецъ должно знать, что кромѣ помянутыхъ частей находится еще и воздухъ въ крови, котораго количество въ разсужденіи всего кровнаго состава, какъ говорятъ сочинители, составляетъ $\frac{1}{33}$ часть крови. Чшо жъ принадлежитъ до количества крови въ человѣкѣ, то Галлей посповляетъ оное около 30 или 36 фунтовъ.

**) Сколь великая была бы скорость печенія крови, опредѣлишь сего никакъ не можно, когда тысяча находится обстоятельствъ, по которымъ переѣняешь

скорость печенія крови. впрочемъ вообще поешавля-
ютъ, что кровь, вытекающая изъ сердца въ началь-
спвенную боевую жилу, за всякимъ пораженіемъ
пульса пробѣгаетъ въ боевой жилѣ почти осмиунде-
разстояніе, что почитай 50 фузовъ составляетъ въ
одну минуту. Чтожъ касается до времени, когда най-
дено и какимъ образомъ круготеченіе крови, то дол-
жно знать, что теченіе сіе и самимъ древнимъ не без-
извѣстно было. Се и не рѣтъ кровь называлъ жизнен-
нымъ духомъ, который изъ боевыхъ жилъ сообщается
чрезъ соустья крововозвратнымъ жиламъ, въ коихъ
называется уже естественнымъ духомъ, какая темнота словъ продолжалась до шѣхъ поръ,
пока пресластный Гарвей въ сочиненіи своемъ въ 1628
году изданномъ, точно и ясно, не доказалъ теченія крови,
употребляя на то разныя орудія, каковы на примѣръ
суть увеличительныя стекла. Для показанія движе-
нія крови въ жабахъ способно есть орудіе Дебер-
кунѣво, которое вообще называютъ машиною
для жабъ; для изслѣдованія же насидѣлыхъ кури-
ныхъ яицъ способно есть увеличительное Ліоція-
ново стекло.

§ 206. Всѣ кровавыя конечности боевыхъ жилъ,
будучи взяты вмѣстѣ, гораздо пространнѣе бы-
ваютъ пня великой или начальспвенной боевой
жилы. Слѣдовательно кровь медленнѣе течетъ
въ конечностяхъ сосудовъ, нежели въ пнѣ или
большихъ вѣтвяхъ боевыхъ жилъ.

§ 207. Откуда явствуетъ, что скорость те-
ченія крови въ боевыхъ жилахъ непрерывно
уменьшается; напротивъ въ крововозвратныхъ
жилахъ тѣмъ больше умножается, чѣмъ ближе
припекается къ сердцу. И такъ утвердительно
сказать можно, что скорость печенія крови
какъ въ боевыхъ, такъ и крововозвратныхъ жи-
лахъ около сердца есть весьма великая.

§ 208.

§ 208. Великосць пульса (*magnitudo pulsus*) есть разстояніе времени, въ которомъ бьющаяся жила въ разжатіи своемъ разширяется, а въ сжиманіи сстягивается. Великосць оная напуральнаго пульса въ самыхъ даже здоровыхъ людяхъ разнообразно перемѣняется, какъ въ разсужденіи то есть возраста, такъ и въ разсужденіи движенія, покоя, пищи и душевныхъ спрассей.

§ 209. Почему изъ естественнаго великаго пульса заключить можно, что сила какъ самаго сердца, такъ и бьющихся жилъ есть естественная, надлежащая и великая, и никакого въ сердцѣ не находится препяпспвія; что бьющаяся жила ни весьма супъ сжаты, ни весьма ослаблы; и что кровь ни весьма есть густая, ни весьма разжиженная.

§ 210. Скоросць пульса (*celeritas pulsus*) есть время, въ которое какъ разширеніе, такъ и сжиманіе бьющейся жилы вкупѣ совершаются. Почему, чѣмъ короче есть время одного біенія сердца, тѣмъ скорѣе пульсъ есть, а чѣмъ есть долѣе время, тѣмъ медлѣннѣйшій есть пульсъ.

§ 211. Пульсъ или біеніе сердца и боевыхъ жилъ называется рѣдкимъ (*rarus*), когда разстояніе времени между началами двоихъ біеній сердца и жилъ гораздо бываетъ долѣе, то есть когда въ каждую порознь секунду бывающъ каждыя порознь біенія жилъ.

§ 212. Отсюда видно, что пульсъ бываетъ скорѣ и частѣ, частѣ и рѣдокѣ; также медленѣ и рѣдокѣ, а иногда медленѣ и частѣ.

§ 213. Скорость натуральнаго пульса во взрослыхъ бываетъ примѣтна тогда, когда въ одну минуту больше 80, а меньше 90 производится бѣній пульса. Однако въ младенцахъ скорость пульса гораздо больше бываетъ, нежели во взрослыхъ. Ибо въ пятилѣтней дѣвочкѣ въ одну минуту 115, а въ трилѣтнемъ возрастѣ въ то же самое время 110; въ восьмилѣтнемъ же мальчикѣ по большей части 102 бѣній пульса шипаеся.

§ 214. Твердаго пульса (*durus*) никогда не бываетъ въ здоровомъ состояніи; по тому что всякая бѣющаяся жила въ здоровомъ и натуральномъ состояніи есть гибка и удобопреклонительна. Твердой же и жесткой пульсъ въ естественномъ состояніи знаменуетъ сжатіе и судорожное сведеніе плѣнѣ, составляющихъ бѣющуюся жилы, или жесткость либо скоро воспослѣдовать имѣющее воспаленіе.

§ 215. Когда гибкость бѣющейся жилы при ощупываніи пульса есть меньше, нежели должно было бытъ въ естественномъ состояніи, то тогда пульсъ называется мягкимъ (*mollis*), который также названъ можно слабымъ или ослаблымъ пульсомъ. (*languidus*).

§ 216. Следственно полнота пульса показываетъ довольноую силу сердца и боевыхъ жилѣ,

и надлежащее количество крови. Полной пульсъ бываетъ знакомъ изобилія крови и доказательствомъ довольной силы и крѣпости сердца и боевыхъ жилъ. Напропивъ пустой и порожней пульсъ показываетъ недостатокъ въ крови и уменьшеніе равностоятельнаго или равномернаго движенія сердца и боевыхъ жилъ.

§ 217. Пропорція или содержаніе біеній пульса бываетъ хорошее, когда великость, жесткость и скорость въ сжиманіи и расширеніи одного біенія пульса не только бываютъ равны, но и натуральны, или весьма близко къ натуральнымъ подходятъ.

§ 218. Часто біющій или учащапельный пульсъ (*frequens*) есть пульсъ состоящій изъ частаго и слабаго біенія жилъ.

ГЛАВА VII.

О дыханіи.

§ 219. Вбираніе внѣшняго воздуха чрезъ ноздри и ротъ въ легкое, называется *вдыханіемъ* (*inspiratio*), испусканіе же онаго пѣми же самими пупями называется *издыханіемъ* (*expiratio*); оба же дѣйствія сіи, будучи взяты вмѣстѣ, называются однимъ словомъ *дыханіемъ* (*respiratio*).

§ 220. Воздухъ во время впушенія онаго въ ноздри, проникаетъ частію въ отверстіе пище-пріемнаго горла, частію въ гортань, частію въ полости или пазухи костей головного черепа

и челюстей, и дыхательное горло; отсюда въ воздуходвижные каналы, а изъ оныхъ въ клапчатки или пузырьки легочныхъ долей.

§ 221. Причина вхожденія воздуха въ легкія состоитъ въ уменьшеніи сопротивленія или препятствія въ груди; а выходенія онаго изъ легкихъ въ сжаніи воздуха, находящагося въ легкихъ.

§ 222. Почему причину уменьшеннаго попеременно сопротивленія и обратнаго сжиманія легкихъ (§ 221) должно искать внѣ легкихъ, то есть въ грудныхъ спѣнахъ.

§ 223. Грудныя спѣны (§ 220) составляютъ: грудинная кость, которая напередъ и назадъ нѣсколько подается. Позади двенадцать грудныхъ позвонковъ, а по бокамъ двенадцать грудныхъ реберъ съ промежуточными ихъ мышцами.

§ 224. Ребра даны такія свойства, чптобы онѣ около позвонковъ такъ какъ бы около оси горизонтально положенной качаться или вращаться могли, и чптобы задняя реберъ часть находилась выше передней; наконецъ, чптобы были наклоненны, а наипаче, чптобы около спины и своихъ переднихъ конечностей имѣли хрящи.

§ 225. Ребра различаются между собою какъ въ разсужденіи соединенія, такъ и въ разсужденіи величины. Въ разсужденіи соединенія семь вышшихъ

шихъ реберъ непосредственно соединенныхъ съ грудною костью, называющіяся истинными ребрами, когда пять низшихъ называющіяся ложными. Одинадцатаго и двенадцатаго ребра хрящи ни между собою, ни съ хрящами вышшихъ костей не соединяются. И сіи послѣднія ребра не такъ какъ вышшья ребра возлѣ позвонковъ около оси, но около круглой головки качаются и движутся.

§ 226. Чтожъ касается до величины, то всякое вышнее ребро есть меньше всякаго низшаго; а изъ пяти ложныхъ реберъ всякая вышняя есть больше своей низшей. Длины хрящей распути въспѣ съ рабрами.

§ 227. Грудобрюшная преграда есть весьма нужная для совершеннаго дыханія. Она подается въ верхъ чрезъ сжатіе чревнымъ мышцаиъ, отъ чего грудная впадина бываетъ меньше. Низгожденіе грудобрюшной преграды производитъ самая же грудобрюшная преграда.

§ 228. Ребра поднимаются въ верхъ междуреберными внѣшними мышцаиами; а хрящи оныхъ междухрящевыми мышцаиами. Почему въ то время, когда ребра вкупѣ съ хрящами поднимаются, междуреберныя и груднореберныя мышцаиы сжимаются, то есть дѣйствовать, не могутъ.

§ 229. А когда тѣ же волокны междуреберныхъ внѣшнихъ, и между хрящевыхъ мышцаиъ (§ 226) сжимаются, то ребра поднимаются,
мѣд-

слѣдственно и грудинная кость напередъ и нѣ-
сколько въ верхъ подается. Напропивъ между-
реберныя внутреннія и грудино-реберныя мышцы
посредствомъ сжатія своего ребра подавляютъ
внизъ и грудинную кость къ спинѣ и не много
внизъ низводятъ.

§ 230. Откуда явствуетъ, что дѣйствіе
междухрящевыхъ мышцъ есть проптивное дѣй-
ствію междуреберныхъ внутреннихъ мышцъ.

§ 231. Когда воздухъ чрезъ ноздри и зѣвы,
и послѣ чрезъ запорникъ и дыхательное горло,
а изъ дыхательнаго горла, чрезъ многіе духо-
движные каналы, которые чемъ далѣе прости-
раются, тѣмъ всегда уже бывающъ, проник-
неть въ легочныя пузырьки; по оной всѣмъ
путемъ симъ чрезъ тѣсныя каналы и слѣд-
ственно въ весьма тонкихъ сполкахъ прохо-
дитъ. И какъ хрящи ноздрей и боки зѣвовъ
весьма многими кровеносными сосудами суть на-
полнены, и все дыхательное горло есть смѣ-
жное съ мышцами, теплою кровію наполненны-
ми, и сосуды называемые духодвижными кана-
лами занимающъ средину между бѣгущими и
крововозвратными легочными жилами; по слѣ-
дуетъ необходимо, что втянутой воздухъ
отъ сихъ теплыхъ стѣнъ или боковъ скорѣе и
тѣмъ большую степень теплоты получаетъ,
чемъ бывающъ уже тѣ каналы, чрезъ которые
онъ проходитъ, и чемъ самой воздухъ холод-
нѣе бываетъ.

§ 232. Воздуха не бываетъ никакого смѣшенія съ кровью въ легкомъ, хотя и много изъ ученыхъ находяпся шаковыхъ, кои смѣшеніе воздуха съ кровью въ легкихъ доказашъ и подшвердипъ стараются и спарались *). Ибо тяжестъ воздуха и его упругостъ всегда супъ равны, и въ крови всегда находипся значное количество воздуха, который воздухъ внѣшняго гораздо естъ упружее. Слѣдственно внушренній воздухъ по крайнѣй мѣрѣ столько сопрошвленія имѣетъ, сколько внѣшній дѣйствія. Откуда явспвуемъ, что ненаходипся никакой шакой причины, по которой бы внѣшній воздухъ могъ превозмогатъ внушренній и проникаетъ **) въ кровавой соспавъ (таппа), почему воздухъ въ легкихъ прохладаетъ только кровь, а не смѣшпвается съ оною.

*) Таковы были Силъвѣй, Швамердамъ, Дове рѣ и Трустонъ, кои смѣшеніе воздуха съ кровью подшверждали слѣдующими причинами: 1) поелику, говорили они, воздухъ, будучи вдохнутъ въ легкое и нѣкопорымъ побужденіемъ далѣе прогнанъ, проникаетъ въ легкотныя жилы и наконецъ въ сердце; 2) поелику цѣлѣная жидкостъ, будучи впущена въ легкотную бѣющуюся жилу, что дѣлалъ Трустонъ, выпскала чрезъ легкотную крововозвратную жилу и дыхашельное горло, слѣдственно не можетъ бытъ, чтооы воздухъ не смѣшпвался съ кровью. Однако Рѣоланъ, Гигморъ, Негманъ и прочіе советѣ сѣ опшвергаютъ, такъ какъ и самъ Сочинителъ книжки сѣ, сказывая, что воздухъ развѣ по разорваніи легкотныхъ пузырькоы можетъ входитъ въ крововозвратную легкотную жилу, и что опытъ, который дѣлалъ Трустонъ, можетъ бытъ производимъ былъ надъ испорченными, а не цѣлыми и не поврежденными легкими. ***

е) Какъ сказано справедливо, что воздухъ таковъ, каковъ есть атмосферической, не можетъ проникать въ легкое, такъ и по справедливости спрашивается, какія бы претерпѣвалъ перемѣны воздухъ, будучи вдохнутъ въ легкое, когда не можетъ спастись, чтобы онъ безъ всякой издыхаемъ былъ перемѣны. На сѣ отвѣчать должно, что причины перемѣнъ воздуха въ легкихъ должно искать не въ потерѣ какой либо упругости воздуха, но въ разрушеніи стихій онаго. Ибо извѣстно изъ опытовъ, что воздухъ изъ безчисленныхъ состояній смѣшеній, изъ электрической и магнитной матеріи и проч. и хотя бы онъ очищенъ былъ отъ всѣхъ примѣсовъ, однако еще состоялъ бы не изъ однороднаго воздушнаго вещества, но изъ многихъ, коихъ наипаче при вида поставляется а именно, дефлогистированное, или лишенное огненного начала, флогистическое, или горючее вещество, и огнепостоянное или сосущественное воздуху начало; коихъ началъ или веществъ въ атмосферическомъ воздухѣ различное находится количество. Вообще же постановляютъ, что дефлогистированный воздухъ атмосферическаго составляетъ $\frac{1}{4}$ часть, флогистической $\frac{11}{16}$, а огнепостоянной $\frac{1}{16}$. Почему воздухъ, будучи втянутъ въ легкое, какое втягиваніе составляетъ почти 30 кубическихъ дюймовъ, такія претерпѣваетъ перемѣны, что $\frac{1}{4}$ часть дефлогистированнаго воздуха разрушается и большею частію смѣшивается съ флогистическимъ и огнепостояннымъ воздухомъ, которые воздухи однимъ только, какъ говорилъ Кирванъ, различаются степенемъ, такъ что издохнувшій воздухъ, будучи надлежащимъ образомъ принятъ сосудомъ, погашаетъ пламя, и горящія уголья, поставленные въ ономъ, превышаетъ тяжестью своею атмосферической воздухъ, дѣлаетъ известныя осадки и проч. откуда заключить можно, что флогистическій и огнепостоянный воздухи неспособны съ въ дыханію, и что воздуха, вдохнушаго въ легкое бывающъ такія перемѣны, что огненные частицы онаго, учившіеся

жившіе свободными, проникающіе въ кровь бѣгущихъ жилъ, и тѣмъ доставляющіе сосущему кровному воздуху издежащую упругость, напреди въ основаніе поспояннаго воздуха съ флогистомъ и кровью приносясь къ правой полоси сердца чрезъ крововозвратныя жилы, и какъ непотребныя вещества извергаются изъ легкаго вонъ. А что паковые воздухи, огнепостоянны то есть и флогистической неспособны суть къ дыханію, то сѣе удобно видѣть можно изъ опытовъ г. П л ю м е н б а х а, который, чтобы узнать, сколь долго животныя извѣстное количество нѣкотораго вида воздуха могутъ въ себя вбierać, пока оный сдѣлается для нихъ смертоноснымъ, вывралъ для сей причины 3 собакъ равной величины и крѣпости; изъ коихъ первой привязавъ къ дышательному горлу посредствомъ трубочки пузырекъ, содержащій въ себѣ около 20 почти кубическихъ дюймовъ дефлогистированнаго воздуха, которая собака по прошествіи 14 минутъ издохла. Другой такойже привязавъ пузырекъ, наполненной атмосферическимъ воздухомъ, которая въ 6 минутъ издохла, а третія, которой равнойже величины привязанъ былъ пузырекъ, наполненной флогистическимъ воздухомъ, въ 4 минуты погибла :

ГЛАВА VIII.

О отдѣленіи.

§ 235. Всякія влаги одареннаго душою тѣла различествующія отъ крови, и другою внутренностію наружными качествами съ ихъ внутренностію несходною производимыя и въ особенностяхи находящіяся, называющіяся *отдѣленными влагами* или *жидкостями*. Сюда относятся потъ, слезы, склизъ, находящаяся въ ноздряхъ и зѣвахъ. Сѣра въ ушахъ (seguen), моча, жизненные духи,

или

или соки, иначе оживопворительную влажно-
 стию или спончайною жидкостью находящеюся
 въ чувствительныхъ жилахъ называемые (*fluidum
 nerveum*), слина, растворительной сокъ, находя-
 щійся въ желудкѣ и поджелудочной языкообраз-
 ной желѣзѣ (*glandula gastrica & pancreatica*), пасока,
 питательная влага или водяность въ крови
 (*lymph*) желчь, сѣмя.

§ 234. И такъ отдѣленіе въ снабжденномъ ду-
 шено плѣтъ есть выработываніе нѣкоторыхъ жид-
 кихъ однородныхъ частей, изъ другой разно-
 родной жидкости, (*ex fluido heterogeneo*).

§ 235. Великое количество кровеносныхъ со-
 судовъ, входящихъ въ отдѣлительныя внутрен-
 ности, всегда бываетъ большее, нежели каковое
 необходимымъ бываетъ для питанія оной вну-
 тренности. Почему отдѣлительныя сосуды боль-
 шаго пребудутъ количества крови, поному что
 оныя не только сами питаются кровію, но и
 другія еще отдѣляютъ жидкости. И такъ не-
 обходимо должно, чтобы плѣтъ большее коли-
 чество крови входило въ какую либо внутрен-
 ность, чемъ больше частей отъ оной отдѣле-
 но быть должно.

§ 236. Когда сосуды отдѣлительныхъ вну-
 тренностей по крайней мѣрѣ на однихъ конеч-
 ностяхъ бываютъ весьма плѣсны, а во всякомъ
 судѣ чемъ большая бываетъ плѣснота или
 узость, плѣтъ больше частей жидкости при-
 касается къ бокамъ или стѣнамъ сосуда, и при-
 косно-

косновеніе оное естъ единственное состояніе, въ которомъ тѣла взаимно однѣ съ другими соединяются; то должно, чѣобы самое большее дѣйствіе жидкостей на спѣны сосуда опѣ прикосновенія производилось въ самыхъ узкихъ или тончайшихъ сосудахъ.

§ 237. Хотя жидкости впрочемъ совершенно подобныя, проходящія чрезъ таковыя различнаго состоянія мѣлчайшія сосуды и ко всѣмъ частямъ сосуда, до которыхъ оныя допрогиваются, пристающѣ и соединяющѣ съ оными, однако то не всегда бываетъ въ одинаковой степени; больше то естъ соединяющѣ съ тѣми сосудами, коихъ спѣны и бока изъ плотнѣйшихъ или въ особенноти тяжелѣйшихъ частей сущѣ соспавленны, а въ меньшей съ тѣми, коихъ спѣны состоятъ изъ твердыхъ частей не такъ плотныхъ и грубыхъ, или изъ такихъ частей, которыя въ особенноти сущѣ легче.

§ 238. Всякое опдѣленіе совершается тремя дѣйствіями, то естъ *пріуготовленіемъ* жидкостей или влагъ къ опдѣленію, *перехожденіемъ* частицъ пріуготовленныхъ изъ жидкости или влаги, съ которою оныя соединены были, въ опдѣлительныя сосуды, и наконецъ *движеніемъ* опдѣленной жидкости.

§ 239. Пріуготовленіе влагъ къ опдѣленію (§ 236.) состоитъ частію въ раздѣленіи большихъ частей изъ инородныхъ состоящихъ на

меньшія разнородныя же между собою ; частію вѣ соединеніи нѣсколькихъ меньшихъ разнородныхъ частей вѣ одну большую часть , совсѣмъ отличное имѣющую качество.

§ 240. Движеніе отдѣленныхъ жидкостей (§ 236.) совершаютъ какъ самое соединеніе отдѣленной жидкости съ боками сосуда, вѣ которомъ находится отдѣленная жидкость, такъ и тяжестъ отдѣленныхъ жидкостей ; Далѣе прикосновеніе жидкости на концѣ отдѣленного сосуда съ другимъ вѣ особеннѣи тяжелѣйшимъ или равнымъ тѣломъ, наконецъ упругостъ сосудовъ, отдѣленную жидкость несущихъ.

§ 241. Всѣ нервы или всѣ чувствительныя жилы содержатъ вѣ себѣ оживотворительную тончайшую жидкость. А что таковая жидкость вѣ самомъ дѣлѣ находится вѣ чувствительныхъ жилахъ, то сіе подтверждаютъ слѣдующіе опыты : если перевязать чувствительную жилу вѣ живомъ, то перестаетъ чувствовать бытъ вѣ той части, которая далѣ отстоитъ отъ мозга, нежели перевязка. Также лишается движенія своего по тѣмъ членъ, котораго двигательныя мышцы имѣютъ происхожденіе свое вѣ отдаленнѣйшей отъ мозга почкѣ, нежели находится перевязка. Что доказываетъ, что вѣ одушевленномъ тѣлѣ не можетъ бытъ ни чувствованіе, ни движеніе безъ нерва или чувствительной, чувствіе же есть производящей, жилы.

§ 242. Жизненные духи, или произведенію душевныхъ и жизненныхъ дѣйствій служащіе соки, опдѣляются въ большемъ мозгѣ, меньшемъ мозгѣ и спановой мозговой жилѣ, и смѣшиваются въ опдѣлительныхъ сосудахъ съ другими жидкостями. Отсюда ясно, что польза, отъ мозга происходящая, состоитъ въ вырабываніи и опдѣленіи жизненныхъ соковъ или духовъ.

§ 243. Твердой мозговой оболочки польза состоитъ въ окруженіи и охраненіи мозга отъ спужи, такъ же и поддерживаніи мозга, что бы оной тяжестію своею не могъ давить ниже лежащаго меньшаго и продолговатаго мозга. Она такъ же должна давать дорогу жильной крови послѣ опдѣленія соковъ возвращающейся изъ мозга.

§ 244. Поелику какъ самой мозгъ, такъ и спановая мозговая жила яко опдѣлительныя жизненныхъ соковъ внутренности суть весьма нѣжныя и весьма мягкія твердыя части человеческого тѣла, и слѣдственно весьма малою силою разрушены быть могутъ; для того надлежало имъ заключеннымъ быть въ костяхъ, что совершается посредствомъ головного черепа, спиннымъ позвонковъ и крестцовой кости.

§ 245. Часть снабжденнаго душею тѣла весьма малая, или мало помалу умаляющаяся, круглая, самоподобная и никогда красною въ натуральномъ состояніи не бывающая, окруженная

особливою плѣвною подѣ кожей находящеюся, называется *простою шаровидною желѣзою* (glandula simplex f. conglobata), большая шаковаго же состоянія часть, раздѣляющаяся на меньшія желѣзы, называется *многосложною или сгроможенною желѣзою*. (conglomerata).

§ 246. Всѣ желѣзы имѣютъ испражнительные протоки.

§ 246. Осправленіе простыхъ желѣзъ есть простое, то есть: онѣ должны отдѣлять отъ крови безцвѣтную жидкость, слѣдственно пасочную и водяную; копорая жидкость перемѣняется въ другую меньше вязкую и густоватую, а изъ оной жидкости отдѣлять однородныя части.

§ 248. Желѣзы отдѣляютъ жидкость либо испаряемую, либо склизистую, слюнную, либо душистую или крѣпкую, либо сѣрную и салную.

§ 249. Слина отдѣляется и извергается изъ сложныхъ желѣзъ, то есть: изъ околоушныхъ (ex parotitibus), подѣязычныхъ и миндаловидныхъ околоязычковыхъ желѣзъ (ex tonsillis), копорая въ здоровомъ человѣкѣ нечто есть иное, какъ какъ жидкость прозрачная, безвкусная и нѣсколько водяная, имѣющая свойство мыльное, копорая жидкость въ горячей водѣ не сгущается, такъ какъ кровяная влажность или пасока, и копорой соль имѣетъ свойство нашатырной соли.

§ 250. Въ желѣзахъ желудочныхъ опдѣляется пакъ называемый *желудочный* разспворъ (*menstrum*), или желудочной разспворятельской сокъ, которой иные называютъ еще *оларою* или *заквасою* (*fermentum*).

§ 251. Пригожемясная желѣза жидкость свою и свой распускающей сокъ, который она выработываетъ, изливаетъ въ двенадцатиперстную кишку.

§ 252. На сводоподобной или выпуклой поверхности печенки находится нѣкоторой грушевидной пузырекъ, который называется *желчнымъ пузыремъ* (*cistis fellea*), и которой всею почти вышшею поверхностью своею соединяется съ печенкою. Густая она жидкость, острая, ѣдкая, горькая и печеночной желчи гораздо желѣе, называется *пузырежелчною желчью* *) (*bilis cystica*). Сія пузырежелчная желчь есть жидкость солено-сѣрная, иначе *животнымъ масломъ* называемая, которая изъ животнаго сала и щелочной лепучей соли составляетъ.

*) Желчь столь нужна есть для пищеваренія, что нѣтъ никакого животнаго, которое бы не имѣло желчи, и хотя въ нѣкоторыхъ животныхъ и не находится желчного пузыря, однако находится печенка, изъ которой жидкость, составляющая желчь, чрезъ печеночные протоки изливается въ кишки. Желчь имѣющъ и самыя даже нѣкомыя.

§ 253. Въ шей желчного пузыря (§ 250) находится каналъ, называемый *пузырежелчнымъ протокомъ* (*ductus cysticus*), которой соединяется съ печеночнымъ желчнымъ протокомъ и составляетъ новый каналъ, называемый *желче-*

проводнымъ общимъ истокомъ или желчнымъ проходомъ (choledochus ductus), проникающимъ въ двенадцатиперстную кишку.

§ 254. Желчныя мѣлкія трубочки (coti bilarii), еспли соединяясь въ одинъ довольно пространной сосудъ, который въ томъ мѣстѣ, въ которомъ крововозвратная воротная жила входитъ въ печенку, изъ печенки выходитъ, по полу-чающъ имя печеночнаго желчнаго протока (ductus hepaticus), а содержащая въ ономъ жидкость печеночною желчью (bilis hepatica), которая нечто есть иное, какъ жидкость густая, желтая, имѣющая вкусъ горьковатой, однако неѣдкой.

§ 255. Въ почкахъ отдѣляется жидкость, которая называется мочою. Сія жидкость или сія моча содержишь въ себѣ густыя, земляныя, сѣрныя и соляныя, а наипаче нащатырныя части.

§ 256. Моча изъ почечнаго таза переходитъ чрезъ мочепочники напурауьною тонкою склизью подмазанныя въ мочевой пузырь *), а изъ мочевого пузыря чрезъ мочеиспускательной спволъ обведенной нѣкоторою склизью выпекаетъ вонъ.

*) Слѣдственно погрѣшаютъ тѣ, кои говорятъ, что моча изъ желудка и кишекъ особыми какими-то путями протекаетъ въ мочевой пузырь, утверждаясь на томъ, что послѣ употребленія чаю и проч. моча скоро и въ великомъ количествѣ вытекаетъ; когда сіе не отъ иного чего происходитъ, какъ отъ побужденія позади текущей въ большемъ количествѣ крови. Чтожъ касается до испаренія, въ мочевомъ пузырьѣ производимаго, такому надобнаго, каковое чрезъ кожу произ-

производится изъ шѣла вонѣ, то сего никто не отвергаетъ.

§ 257. Отдѣленіе мужскаго сѣмяни производится въ япрахѣ, въ которыхъ біюціяся сѣмянные жилы приносятъ кровь, гдѣ оная посредствомъ долгихъ и извивистыхъ сосудовъ составляющихъ япра перемѣняется въ душистую жидкость. Когда сѣмя чрезъ сѣмянные пузырьки переходитъ въ мочеиспускательной спиволь, а послѣ извергается вонѣ, то все шѣло человеческое съ произведеніемъ особливыхъ пріятности въ судорожное проводитъ движеніе. Но когда не извергается и не испражняется вонѣ, а оспаетъ въ сѣмянныхъ пузырькахъ, то опять входитъ въ кровавой составъ, кругообращается съ онымъ, и пипаетъ и укрѣпляетъ шѣло.

ГЛАВА IX.

О нечувствительной испаринѣ и лотѣ.

§ 258. Нечувствительное испареніе въ здоровѣмъ человѣкѣ никогда совсѣмъ не останавливается. Жидкость же оная, которая испаривается, называется паромъ, (vapor). Сего пару бываетъ различная пропорція и содержаніе къ испражненіямъ чувствамъ подлежащимъ; какъ-то ясно открывается изъ опытовъ Санкшоріевыхъ и Кеиловыхъ; на пр. Санкшорій слѣдующія дѣлалъ замѣчанія: естли пища и пипіе въ одинъ день употребляемыя имѣютъ вѣсу восемь фунтовъ, то нечувствительное испареніе обыкновенно производится

дился до пяти фунтовъ. Всякая тѣлесная болѣзнь и всякой трудъ останавливаетъ тѣлесное испареніе. Она такъ же останавливается поносомъ и рвою. Не всякой часъ тѣло одинакимъ испаривается образомъ; ибо послѣ кушанья нечувствительной испарины въ теченіе пяти часовъ почти фунтъ испаривается, отъ пяти до двенадцати часовъ около трехъ фунтовъ; отъ двенадцати же до шестнадцати часовъ едва полфунта выходитъ оной нечувствительно испаряемой матеріи. Въ теченіе одной ночи шестнадцать унцовъ мочи, а иногда больше или меньше; четыре унца всякихъ низомъ бывающихъ испражнений, сорокъ и болѣе унцовъ нечувствительной испарины весьма часто производится. У многихъ въ одинъ день столько чрезъ нечувствительное испареніе выходитъ изъ тѣла матеріи, сколько испражняется низомъ въ 15 дней. Наружной холодъ останавливаетъ испарину въ слабомъ и лихомъ чловѣкѣ, а въ крѣпкомъ и здоровомъ умножаетъ оную. Хотя на холодномъ здоровомъ воздухѣ останавливается испареніе и спѣсняющія испаривательныеходы; однако укрѣпляются волосы и тяжесть задерживаемаго испаренія, какъ никакого не причиняетъ поврежденія, такъ и нечувствительна бываетъ. У слабыхъ по большей части зимой, а у здоровыхъ лѣтомъ остановленное испареніе обращается въ мочу. Крѣпкія тѣла лѣтомъ днемъ, а зимою ночью больше испариваютъ матеріи.

теріи. Когда наполненной пищею желудокъ во время сна первое учинишъ свареніе, то въ оную ночь испареніе по большей части восходитъ до 40 унцовъ, а естли желудокъ нехорошо сваритъ, то почти шолько до 18 унцовъ. Многопитательныя яствы, изключая одно баранье мясо, отъ ужина до обѣда, обыкновенно испаривающъ около 18 унцовъ. Баранье мясо скоро и удобно сваривается, и производитъ пары; ибо оное въ одну ночь испариваетъ матеріи одну прешъ Фурша, болше то есть, нежели другія твердыя и не скоросваривающіяся кушанья. Отъ употребленія свинины, грибовъ или сморчковъ тѣло по большей части меньше обыкновеннаго выпускаетъ непримѣнно выходящей матеріи. Сладкой и спокойной сонъ споль много способствуетъ испаренію, что часто въ печеніи седми часовъ 50 унцовъ свареной испаряемой нечувствительной матеріи въ здоровыхъ людяхъ выпаривается. Спящій спокойно человекъ въ семь часовъ вдвое болше и припомъ безъ поврежденія своего здовья имѣетъ нечувствительной испарины, нежели бодрствующій. Безпокойной сонъ прешю часть обыкновенной испарины останавливаетъ. Испареніе гораздо болше останавливается въ спящихъ холоднымъ южнымъ вѣтромъ, нежели въ бодрствующихъ великою стужей. Тѣло, лежащее спокойно въ постѣлѣ, гораздо болше имѣетъ испаренія, нежели часто поворачивающееся. Естли тѣло послѣ ужина

на будетъ лежать спокойно въ постелѣ 10 часовъ, то будетъ имѣть весьма хорошую испарину. А естли полежитъ долѣе, то испарина вдругъ уменьшится спанетъ. Излишней душевной покой гораздо больше останавливаетъ испаренія, нежели тѣлесной покой. Излишнее воздержаніе отъ совокупленія, такъ какъ и излишнее употребленіе онаго останавливаютъ испарину; но излишнее употребленіе больше еще останавливаетъ оную. Въ печаль и страхъ мало бываетъ испарины, отъ чего иногда великая причиняется тѣготъ. Ничто столько свободнымъ не дѣлаетъ испаренія, какъ радость и веселіе духа.

§ 259. Кейловы опыты суть слѣдующія: испражняемой низомъ въ одинъ день матеріи вообще бываетъ пять унцовъ. Мочи въ однѣ сутки два фунта и почти шесть унцовъ испражняется. Всѣ ежедневнаго испаренія почти шесть унцовъ составляютъ. Всѣ ежедневнаго же испаренія по большей части до 30 восходятъ унцовъ. Лѣтнее испареніе гораздо больше превышаетъ зимнее. Во время холода и покоя въ одинъ часъ едва полунца выходитъ испаряемой матеріи. Человѣкъ изнеможенный непомѣрнымъ упражненіемъ въ трудахъ, гораздо меньше имѣетъ испарины. Треніе по кожѣ ни основываетъ, ни умножаетъ испаренія. Проносныя лекарства не дѣлаютъ помѣхи исхожденію испарины.

Естественныя испражненія не тяжести тѣлесной, но надлежащему пици употребленію суть со-

соразмѣрны. Естѣли мѣра пищи будетъ больше или меньше надлежащаго; тогда яденія не соотвѣтствуютъ испражненіямъ. Усприды меньше всѣхъ, вещей употребляемыхъ въ пищу, производятъ испаренія. Онѣ препятствуютъ выдыханію испарины и другихъ яспивъ.

§ 260. Изъ сихъ приведенныхъ вышепомянутыхъ сочинителей опытовъ заключаешь должно: что количество испариванія умножается, и уменьшается, смотря по различію наполненія сосудовъ, по различію качества яспивъ и пивьевъ и крѣпости шѣлъ, смотря также по различію печенія крови умножаемаго шѣлеснымъ или душевнымъ движеніемъ, наконецъ и по различію кожи.

§ 261. Потъ проходитъ чрезъ сосуды, отъ крови и пасоки разширенные, и зависитъ отъ сильнаго движенія сердца и боевыхъ жилъ, также отъ воздуха и сильнѣйшаго спремленія крови. Потъ въ здоровыхъ и къ поту расположенныхъ шѣлахъ даже и во время сна проливается *).

*) Потъ нечто есть иное, какъ кровавая безполезная водянность, содержащая въ себѣ разныя нечистыя, соляныя, земляныя и сѣрныя частицы. Соляность пота показываетъ вкусъ, а сѣру сѣрный запахъ, который у нѣкоторыхъ людей столь бываетъ пропитивенъ, что и терпѣть онаго не можно. Присудствіе сѣрныхъ частицъ въ потѣ доказываютъ еще и пуспыя огни на рубашкахъ нѣкоторыхъ людей показывающіеся, которые не ошинуды происходятъ, какъ отъ тленія сѣрныхъ частицъ.

ГЛАВА X.

О жеваніи, глотаніи, вареніи, пищеприменіи въ питательной сокъ и кровосоставленіи, или перемененіи питательнаго сока въ кровь.

§ 262. Раздробленіе и распираніе пшвердой пищи посредствомъ взаимнаго движенія и приведенія низшей челюсти къ вышшей, и смѣшеніе раздробленной со слиною, называется жеваніемъ (masticatio).

§ 263. Къ раздробленію пшвердой пищи потребны супъ зубы и разныя движенія низшей челюсти *), языка, и мышцъ какъ-то: мышцъ зубоязычныхъ, круговыхъ ршовыхъ или ланипныхъ и наконецъ скуловыхъ мышцъ; ибо помощію сихъ попеременно дѣйствующихъ мышцъ выжимается изъ слинныхъ желѣзъ слина, и проводится въ ротъ. Пища распертая жеваніемъ посредствомъ вышесказанныхъ мышцъ проводится къ зѣвамъ, и пищепріемному горлу; желѣзы оною же пищею, будучи подавляемыя, жидкость свою вливаютъ въ полость пищепріемнаго горла: всѣ же сіи выше описанныя дѣйствія называются однимъ словомъ глотаніемъ. (deglutitio)

*) Ибо вышшая челюсть всегда пребываетъ неподвижною. Нѣкоторые думали, что и вышшая челюсть движется у крокодиловъ. Нославный Веслингъ, который самъ пласпалъ сихъ животныхъ въ Египтѣ, нашелъ совсѣмъ тому противное. Впрочемъ у попугаевъ, вороновъ, и другихъ хищныхъ птицъ обѣ движутся челюсти.

§ 264.

§ 264. Всякое перемѣненіе, какъ жеванныхъ яствъ, такъ и употребленныхъ пишьевъ, производимое въ человѣческомъ желудкѣ, называется *вареніемъ* или *лищилпремененіемъ* въ *лигательной сожъ* (*digestio five chilificatio*).

§ 265. Сіи перемененія шѣмъ скорѣе совершаются, чемъ болѣеи степени бываетъ жедудочной теплоты. Откуда заключать должно, что надлежащая теплота есть первая дѣйствующая пищепремененія причина; хотя въ прочемъ безъ водяной жидкости вышесказанныя перемѣны произведены бытъ ни какъ не могутъ.

§ 266. Весьма великую силу надлежащимъ образомъ разводитъ пищу имѣющъ жидкости отъ шѣла нашего опдѣленныя, каковы суть: слина и жидкость пищепріемнаго горла и желудка; а сіе попому, что оныя имѣютъ мыльное свойство.

§ 267. Дѣйствіе чревныхъ мышцъ, посредствомъ котораго одна часть послѣ другой-то вверхъ, то внизъ подымается, спягивается и разширяется, называется *равностоятельнымъ* или *червообразнымъ движеніемъ кишекъ*. (*motus peristalticus*). Сего движенія дѣйствія суть: умноженіе всѣхъ дѣйствій воздуха, солей и чревныхъ жидкостей; далѣе внутреннее движеніе содержи-мыхъ матерій, помощію котораго не только различные жидкости скорѣе между собою смѣшиваются, но и самыя пережованныя яшвы. Наконецъ большее опдѣленіе желудочной распука-
пелльной

пельной жидкости и скорѣйшее жидкихъ и раз-
пущенныхъ частей вырабатываніе и опдѣленіе
отъ не раздробленныхъ еще и не распущенныхъ.

§ 268. Время варенія пищи въ разные дни раз-
ное бываетъ въ одномъ и томъ же человѣкѣ.
Обыкновенное же твердыхъ яствъ вареніе продол-
жается при часа, а иногда и болѣе.

§ 269. Сваренная въ желудкѣ пища, имѣющая
видъ кашицы, бѣловатаго или сѣраго цвѣту,
именуется второвареніемъ (chymus).

§ 270. Перемѣненіе второваренія или пищи и
пищя, обращенныхъ въ бѣлую, на молоко похо-
жую или сѣроватую матерію (§ 267) въ двенад-
цапидюймовой кишкѣ посредствомъ жидкостей
пригожемясной желѣзы и желчи въ жидкость,
имѣющую вкусъ, цвѣтъ и состояніе молока, на-
зывается сокосоставленіемъ или выработывані-
емъ питательнаго сока, обращающагося въ кровь
(chylificatio).

§ 271. Пищательной сокъ изъ двенадцати-
дюймовой кишки переходитъ въ тонкую или и
другую тонкую кишку; гдѣ оный болѣе еще
растворяется посредствомъ припекающей жид-
кости изъ желѣзъ, находящихся въ великомъ зги-
бѣ сея кишки.

§ 272. Многіе сосуды, которые находятся
между кишечными оболочками, раздѣлены буду-
чи на многія вѣтви, бывающъ наполнены пищева-
тельнымъ сокомъ, и которыя между брижейны-
ми плѣнами къ ближайшимъ стремятся желѣ-
замъ

замѣ, называющіяся *млеконосными сосудами перваго рода* (*vasa lactea primi generis*). Сосуды же, въ меньшемъ количествѣ находящіяся, однако пространнѣйшіе млечныхъ сосудовъ перваго рода, которые происходятъ отъ премногихъ желѣзъ, не далеко отъ кишекъ отстоящихъ, называющіяся *млеконосными сосудами втораго рода* (*vasa lactea secundi generis*). Наконецъ еще въ меньшемъ числѣ находящіяся сосуды, отъ кишекъ гораздо отдаленнѣйшіе, происходящіе изъ брызжейныхъ желѣзъ, называющіяся *млеконосными сосудами третьяго рода* (*vasa lactea tertii generis*). Сіи сосуды соединяются всѣ въ одинъ сосудъ, находящійся между спинными позвонками и большею или начальственною боевою жилою, который называется *пузырькомъ* или *сумочкою* лимфатическаго сока *Пеквеціанскою* именуемою (*capsula Peveretiana chyli*).

§ 273. Самая же Пеквеціанская сумочка находится между послѣднимъ груднымъ и первымъ поясничнымъ позвонкомъ, такъ же между правымъ прибавкомъ грудобрюшной преграды и начальственною боевою жилою (*aorta*), которой вышшая конечность, проникая подъ лѣвую подреберную въ грудную впадину, спланившись уже и тѣснѣе и получаетъ имя *груднаго протока лимфатическаго соку* (*ductus thoracicus*), который имѣетъ весьма много заслоночекъ,

§ 274. Кровотвореніе или кровосоставленіе (*sanguificatio*), то есть когда лимфатическій сокъ
смѣ-

смѣшивается съ кровью, и вмѣстѣ съ оною чрезъ все спруится пѣло, соспоитѣ, въ раздѣленіи составныхъ пищательнаго сока часпей, изъ соединенія сѣрныхъ, соляныхъ и земляныхъ въ шарикѣ. Однако ни раздѣленіе, ни соединеніе не производится въ одномъ мѣстѣ пѣла, или въ одной какой нибудь внутренности онаго, но во всемъ пѣлѣ и во всѣхъ разныхъ часпяхъ разнообразно.

§ 275. О испражненіи непопребныхъ матерій низомъ, слѣдующее примѣчать должно: и во первыхъ, что таковыя матеріи имѣютъ происхожденіе свое отъ часпей недовольно раздробленныхъ и другихъ желчныхъ, которыя супъ вязче. Всѣ сіи часпицы прежде испражненія своего жъ одному отпояются каналу, гдѣ онѣ собираются и останавливаются. Каналъ оный еспѣ по большей части *слѣлая кишка*, (*cæcum intestinum*), гдѣ оныя, пребывая нѣкоторое время и согнивая, превращаются въ густую, мягкую и разнообразную матерію.

§ 276. Почему непопребныя низомъ испражняемыя матеріи, наполняющія слѣпую кишку прогоняются сжиманіемъ кишекъ въ правую ободочную кишки впадину или полость, во впорую смыкающимися заслоночками, изъ впорой въ претію, а изъ претій въ четвершую, пока наконецъ дойдутъ до перваго ободочной кишки згиба, проходящаго въ лѣвомъ боку пуловища. Но прежде нежели войдутъ въ правую или заднепроходную кишку, вышесказанныя матеріи опять нѣ-

нѣсколько восходящѣ, пока опѣ сжатія ободшной кишки и своей тяжести низвергнутся въ заднепроходную кишку и наконецъ выйдутъ вонѣ проходомъ.

§ 277. Изъ сихъ натуральныхъ дѣйствій, по естѣ: жеванія, пищеваренія, соко и крово соспавленія происходишѣ питаніе человѣческаго шѣла.

§ 278. Питаніе или приращеніе и утвржденіе шѣла производится, присоединеніемъ весьма малыхъ нечувствительныхъ частицъ, по большей части однородныхъ. Во время зачатія начальныя человѣческія основанія заключающіяся въ маленькомъ шарикѣ едва пшениное зернышко величиною своею превышающемъ. Дѣвушки въ разсужденіи длины растутъ побольшей части до 18 лѣтъ, а мальчики даже до 18 и 21 года. Утвржденіе же шѣла или оспановленіе рощенія и умноженія онаго продолжается до 50 а иногда и до 60 лѣтъ.

ГЛАВА II.

О внѣшнихъ чувствахъ.

§ 279. Способность души понимать перемѣны въ чувственныхъ органахъ учиненныя, и изъ оныхъ познавать внѣшніе предметы, производящіе оныя перемѣны, однимъ словомъ называется *внѣшнее чувство* (*sensus externus*); самое же понятіе сея перемѣны называется *чувствованіемъ*. (*sensatio*)

§ 280. Общій способъ или образъ чувствованія есть слѣдующій: когда внѣшній предмѣтъ дѣйствуетъ на какую либо часть тѣла нашего, то оное дѣйствіе есть такое: нервъ или чувствительная жила въ томъ мѣстѣ подавляется или пожимается, подаются спѣсны чувствительной пожарной жилы, и подавляютъ содержимую въ оныхъ жидкость, еслии полоса трубочки чувствительной жилы надлежащимъ количествомъ жизненныхъ соковъ наполнена будетъ. Жизненные оные соки или духи, будучи такимъ образомъ пожары, спремятся къ мозгу *), однако такъ, что всякая пожарная чувствительная жила, произведши движеніе жизненныхъ соковъ, особливую почку въ мозгъ поражаетъ, какъ-то можно заключить изъ того, что человекъ всякую часть тѣла своего, а что больше всякую почку на кожѣ поражаемую различать можетъ, что учинить никакъ не возможно было бы, еслии бы жизненные духи, изъ разныхъ частей тѣла спремящіеся къ мозгу, на одну и ту же почку мозга дѣйствовали. Наконецъ душа дѣйствіе оное жизненныхъ духовъ въ послѣдней почкѣ чувствительной жилы въ мозгъ чувствуетъ и понимаетъ, а изъ того къ присутности дѣйствующаго тѣла и качествамъ съ дѣйствіемъ онаго соединеннымъ заключаетъ.

*) Изъ сего видно, что жизненные соки, такоеже имѣютъ круготеченіе, какъ и прочія влаги. Но одни ли они для произведенія движеній должны спремились чрезъ нервы

нервы, и при сильномъ движеніи и скоромъ печеніи своемъ сильно растягивашь оныя, или самыя нервы по причинѣ упругости своей всякія производяшъ движенія, еще довольно не изслѣдовано, а изслѣдовано только то, что въ нихъ находится нѣкошорая жидкость, которая ихъ орошаетъ и можетъ быть и питаетъ, что можно заключить изъ великаго количества влаги и великаго числа крононосныхъ сосудовъ, находящихся въ мозгѣ. Чтожъ касается до названія жизненныхъ соковъ или духовъ, то должно знать, что названіе сіе произошло отъ стоиковъ, кошыры жидкость, находящуюся въ нервахъ, то жизненными, то естественными, то дѣшородными духами, то Юпитеровымъ пламенемъ, то врожденною теплошю, то коренною влагою и Археемъ называли. А Долей раздѣлилъ жизненные соки еще на разные классы, опредѣливъ онымъ разнымъ вождямъ, изъ коихъ находящейся въ мозгѣ называется микрокошметоръ, владѣтель то еспъ воображенія и памяти; Косметоргесъ правитель гнѣва; Кардимелехъ правитель крови въ сердцѣ; Гастеранаксъ властелинъ пищеваженія въ желудкѣ, Рехамалка предводитель зарожденія плодовъ въ матерней утробѣ.

§ 281 Откуда слѣдуетъ, что душа даже и опдаленныя отъ плѣла нашего предмѣшы узнавать можетъ; пошому что оныя могутъ дѣйствовать на чувствительныя жилы плѣла нашего чрезъ посреднія плѣла. Далѣе, что спѣсны чувствснныхъ жилъ должны быть весьма тонки и слѣдственно весьма нѣжны, такъ, чтошбы, отъ дѣйствія даже самыхъ малыхъ плѣлъ будучи пожаты, могли подаваться внутрь. Наконецъ, что плѣмъ сильнѣйшее и большее должно быть чувствование, чемъ боль-

ше нервы или чувствородныя жилы наполнены *)
сущъ жизненными духами, и чемъ естъ больше
сила, пожимающая чувствительныя жилы,
также чемъ больше обнажены бывающѣ нервы и
чемъ больше оныхъ поражено и возбуждено бу-
дешъ.

*) Слѣдственно жизненные соки могутъ разсыпаться изъ
тѣла и опять возрождаться въ ономъ. Разсыпающіеся
жизненные соки не помирными трудами и воздерж-
ною, а наипаче любострастною жизнію, а возро-
ждающіеся утѣренными покоемъ, и воздержною и през-
вою жизнію

§ 282. Когда душа не въ самой чувствитель-
ной жилѣ, но въ мозгѣ посредствомъ движенія
жизненныхъ соковъ дѣйствія внѣшнихъ тѣлъ
чувствуетъ; по слѣдуетъ, что душа должна
познавать мѣсто ^{до} дѣйствующихъ тѣлъ въ са-
момъ мозгѣ, а не въ части тѣла нашего, пре-
терпѣвающей спремленіе внѣшняго тѣла, но и
того меньше внѣ насъ самихъ. Душа же изъ по-
нятаго дѣйствія по одному только заключенію
познавать должна дѣйствующее тѣло. Также
должна она показывать бышіе онаго внѣ себя
въ то время, когда разсуждаетъ о величинѣ онаго
большей величины своего тѣла.

ГЛАВА XII.

*О осязаніи или прикосновеніи, голодѣ
и жаждѣ.*

§ 283. Понятіе или ощущеніе тѣхъ тѣлес-
ныхъ дѣйствій, которыя производятся тѣлами

на какую либо шѣла нашего часпѣ въблизи дѣйствующихъ, и по которымъ судимъ мы о присутствіи шѣла, дѣйствующаго на ту часпѣ шѣла нашего, на которую оное дѣйствуетъ и производитъ впечатлѣніе, называется прикосновеніемъ или осязаніемъ (tactus); могущество же понимать дѣйствія вышесказаннымъ образомъ называется чувствомъ осязанія (sensu tactus).

§ 284. Хотя всѣ шѣла нашего часпи, какъ мягкія такъ и твердыя суть орудія осязанія, однако кожа предъ всѣми имѣетъ преимущество, будучи первый органъ осязанія, которой внѣшняя часпѣ называется ложицею *) (epidermis).

*) О кожицѣ, о сѣпчатомъ шѣлѣ и скважинахъ весьма хорошо пишетъ Авраамъ Кавъ, въ разсужденіи своемъ о такъ называемомъ Гипокраномѣ испареніи изъ всего шѣла производимомъ.

§ 285. Непріятное впечатлѣніе или ощущеніе въ желудкѣ, произшедшее отъ раздраженія и разширенія желѣзъ вязкою и кисловатою или соленою жидкостію производимаго называется голодомъ (fames).

§ 286. Голодъ происходитъ: когда принятіе пищи долѣе обыкновеннаго и уреченнаго времени оплагается. Отъ чего голодъ по нѣкоторомъ пребываніи своемъ опять самъ по себѣ унимается, хотя и ни мало пищи употреблено не будетъ, и сіе дважды или прижды случается. Большой голодъ обыкновенно бываетъ у тѣхъ людей, коихъ родъ жизни есть многотруденъ и работливъ, нежели у тѣхъ, кои домашнюю и си-

дичую проводятъ жизнь. Малой голодъ ощущается у пѣхъ людей, кои много употребляютъ пипья, находящіяся же въ желудкѣ кислопы великой возбуждаютъ голодъ и слѣдственно пожеланіе ѣсть, которое обыкновенно называется аллетитомъ.

§ 287. Опъ недостатка пищи и неяденія происходитъ: уменьшеніе количества влагъ и слѣдственно стѣсненіе сосудовъ, испребленіе тончайшихъ жидкостей, доставляющихъ густымъ и плошнымъ частямъ влажностъ и пипаніе, и слѣдственно умноженіе густѣйшихъ и грубейшихъ частей. Также задерживаніе солей, и слѣдственно умноженіе оспропы и ѣдкости въ жидкостяхъ и большее дѣйствіе на волокны, опъ чего не рѣдко прилучается бѣшенство, горячка и сему подобные припадки.

§ 288. То ощущеніе или впечатлѣніе, которое мы называемъ жаждою (sitis), чувствуемъ мы тогда, когда не употребляемъ необходимаго пипья, а употребляемъ одну пищу, такъ же и послѣ употребленія пищи, послѣ соленыхъ и щелочныхъ яствъ, и послѣ куренія трубки. Послѣ долгихъ разговоровъ, послѣ сильнаго движенія пѣла, послѣ многихъ испражнений пасоки или влаги изъ нашего пѣла. Жажда такъ же бываетъ, въ пароксисомахъ или приступахъ лихорадочныхъ и горячкахъ, пошому что въ лихорадкахъ щелочныя ѣдкия соли обнаруживаются и усиливаются

яется, отъ чего возбуждается жаръ, тонкія жидкости разсыпаящій и вонъ изъ пѣла изпребляющій.

ГЛАВА XIII.

О вкусѣ и обонянїи.

§ 289. Впечатлѣніе и понятіе дѣйствія солей, приспавающимъ къ языку, называется *вкусомъ* (sapor five gustus); могущество же понимать дѣйствіе солей на языкъ называется *чувствомъ вкуса*. (sensus gustus).

§ 290. Сіе ощущение солей на поверхности языка умножаетъ самая верхняя часпъ языка посредствомъ своихъ сосочныхъ возвышенїи, разводящая соли жидкость и прижиманіе языка къ небу.

§ 291 Соли дѣйствуютъ на поверхностную кожу языка, и кожа она безпосредственно дѣйствуетъ на волокны чувствительныхъ жилъ находящихся въ сосочкахъ.

§ 292 Большее ощущение вкуса находится на концѣ языка, нежели на основанїи онаго, либо средней его часпи; напротивъ того гораздо долѣе ощущение вкуса пребываетъ на основанїи и средней часпи языка, нежели на концѣ онаго. Слѣдовательно вся вышняя поверхность языка намъ представляетъ вкусъ.

§ 293 Вкуса находятся разные виды, какъ-то:

1. Кислый, каковъ имѣютъ уксуссы, соляной спиртъ или кислопа (*spiritus falis*), селипреная кислопа (*nitri spiritus*), купоросная кислопа (*vitrioli*) и сѣрная кислопа (*& sulphuris spiritus*), смородина (*bassæ ribium*), барбарисъ (*berberis*), лимоны (*roma citri*), кислица (*acetofa*), щавель (*acetofela*), и прочая.

2. Щелочной, каковъ производитъ лепучая нашатырная, изъ нашатырю по естъ получаема соль, и огнепоспоянная виннокаленная соль (*sal tartari fixum*).

3. Соленой, каковъ составляетъ общая соль, селипра, двусоставная слабительная соль (*arsanum duplicatum*), сущеспвенная винная или уксусовинная соль (*arsanum tartari*) и нашатырные соли.

4. Сладкой, каковъ имѣютъ: сахаръ, медъ, солодковой корень (*radix liqviritiæ*), свинцовой сахаръ или свинцовая вяжущая соль, (*sacharum five sal saturni*).

5. Горькой, каковъ находится въ желчи, полыни, золопопысячникъ, (*certavrii minoris herba*), чертополохъ или кудрявомъ волчецъ (*carduus benedictus*), прилиспвенникъ или дяплинъ (*trifolium*), и прочая.

6. Мочевой, каковъ имѣетъ: моча, воняетъ начинающая, лепучія или весьма проникательныя соли изъ оленья рога доставаемые (*salia volatilia cornu cervi*).

7. Пряной или ароматной, каковъ производитъ пряныя вещества.

8. Прошухлой или промзлой (rancidus), каковъ имѣютъ всѣ спарыя сала и испортившіяся выжарныя масла.

9. Вонючей, каковъ издаютъ гнилыя мяса.

10. Суровой или перпкой (avferus, каковъ находится въ чернильныхъ орѣшкахъ (gallæ), незрѣлыхъ яблокахъ и грушахъ.

§ 294. Ощущеніе или чувствованіе пончайшихъ частицъ изъ пѣлъ выдохновеніемъ выходящихъ и посредствомъ воздуха въ ноздри переносимыхъ называется запахомъ или обоняніемъ (olfactus): Могущество же или способность понимать и ощущать паковыя выдохновенія или запахи называется чувствомъ обонянія *) (sensus olfactus).

*) Обоняніе, такъ какъ и прочія чувства, производится посредствомъ чувствительныхъ жилъ, обонятельныхъ и называемыхъ, о коихъ дѣйствіи нѣкоторые сочинители сомнѣваются, обоняніе ли они производятъ, или, будучи полныя и разбѣяныя по мокротной въ ноздряхъ оболочкѣ, отдѣляютъ и вонъ извергаютъ изъ мозгу мокроту? почему и говорятъ, изъ числа коихъ первый есть Шлевогцѣй, что обонятельные нервы не суть нервы, но отдѣлятельныя орудія и сосцеобразныя мозговые опростки, почему обоняніе не сими нервами, но вѣтвями пятой пары, идущими къ носу, производится. Что несправедливо сказано. Чтожъ до того, якобы табачной дымъ, или нюхательные порошки, изъ числа коихъ есть табакъ, могли проходить чрезъ нервы или чрезъ дырчатую кость въ мозгъ, то еѣ быть никогда не можетъ. Ибо какъ обращенную къ носу поверхность упомянутой кости носовая мокротная оболочка, такъ и ту сторону, которая спѣитъ къ мозгу, выпинаетъ крѣпко твердая мозговая оболочка, ка-

кое выстиланіе оболочекъ совсѣмъ препятствуетъ прохожденію дыма и табаку въ голову.

§ 295. Запахъ или обоняніе возбуждается солями и различныя соли различныя и запахи производить могутъ. Таковыя соли производящія запахъ супъ весьма тонкія, а запахъ или обоняніе производится чрезъ приспаваніе солей находящихся въ воздухъ къ мокрой внутренней ноздри выстилающей оболочкѣ. благовонныя соли большую приобрѣтаютъ дѣйствительность, нежели сопротивленіе, соединившись съ жидкостью, ноздряную оболочку орошающею. Влажность же она, поелику какъ въ разсужденіи изобилія, такъ и въ разсужденіи вязкости своей перемѣняется, для того и дѣйствительность солей умножаетъ или уменьшаетъ можетъ.

§ 296. Есть нѣкопорыя запаховъ удивительныя и чрезвычайныя дѣйствія, каковыя примѣчаемъ мы въ человѣческихъ тѣлахъ отъ прикладыванія къ онымъ нѣкопорыхъ благовонныхъ веществъ. Мы видимъ, что запахомъ или обоняніемъ безоардического (противояднаго, или противогнильнаго) уксуса, имѣющіе наклонность къ обморокамъ, ободряются, спиртомъ нашатырной соли спраждующіе обмороками, и самые апоплексическіе или параличные люди возбуждаются. Напротивъ того отъ обонянія зажженной сѣры, сѣлипреной кислоты люди самые здоровые почипай лишаются жизни, или и дѣйствительно умираютъ.

ГЛАВА XIV.

О видѣніи или зрѣніи.

§ 297. Пониманіе или чувствованіе переменны въ глазахъ нашихъ произведенное, впечатлѣніемъ предмѣтовъ отъ тѣла машего отдаленныхъ, посредствомъ котораго фигуру съ положеніемъ предмѣтовъ сообразную и относительную ихъ величину мы различаемъ, называется чувствомъ зрѣнія или видѣнія (*sensus visus*).

§ 298. Три вещи потребны сущь для зрѣнія или видѣнія: 1. Отдаленные предмѣты, поколику оные могутъ дѣйствовать на посредній предмѣтъ. 2. Посредній предмѣтъ, поелику оной дѣйствіе, отдаленными предмѣтами произведенное, къ глазу нашему продолжашь и впечатлѣніе въ ономъ производить можетъ. 3. Глазъ, поелику переменяется оной отъ посредняго онаго предмѣта.

§ 299. Чтобы показать и ушвердить чувство зрѣнія, то должно слѣдующее примѣчать изъ физики.

1. Кромѣ здороваго глаза, и видимаго предмѣта, потребенъ еще есть къ зрѣнію и свѣтъ, которой нечто есть иное, какъ дѣйствіе огненныхъ частицъ въ продолженной чрезъ скважины другихъ тѣлъ линіи дѣйствующихъ на внутреннія части глаза, поколику оной отъ другихъ тѣлъ къ глазу направляется.

2. Тѣла, которыя направляютъ свѣтъ къ глазу, огненные оныя части либо изъ себя самихъ

михъ испускающъ, и тогда получающъ имя *свѣта* или *свѣтлыхъ тѣлъ*, либо опынуды получающъ, и тогда, есѣли онѣ направляющъ свѣтъ свой къ глазу, посредствомъ отраженія, называющъся *сѣяющими* или *свѣтоносными* тѣлами, а есѣли оныя, пропуская чрезъ свои скважины свѣтъ, споспѣшествующъ къ ощущенію или обозрѣнію онаго, то называющъся *прозрачными* тѣлами.

3. Направленіе свѣта, покаместъ находится оной въ однородномъ тѣлѣ, имѣетъ прямую и непремѣнную линію, хотя оной изъ однороднаго тѣла и проникнетъ въ другое тяжелѣйшее или плотнѣйшее и ему смѣжное тѣло, есѣли токмо направленіе въ однородномъ тѣлѣ на поверхность, чрезъ которую продолжается дѣйствіе, будетъ прямо падаѣть или оной будетъ перпендикулярное; переменяется же направленіе свѣта тогда, когда дѣйствіе однороднаго тѣла на инородное косо производится, то есѣ, когда свѣтъ отъ онаго тѣла во другое изливается косо.

4. Прямое свѣта перемененіе называется *преломленіемъ* (*refractio*), и рядъ огненныхъ частицъ въ продолженной линіи прямой ли, или преломленной или изогнутой такъ дѣйствующихъ, что онѣ въ состояніи бывающъ производятъ видѣніе, называющъся *лучемъ сѣнія* или *свѣта* (*radius luminis* five *lucis*); который лучъ преломляется прямо или перпендикулярно, сколь часто переходитъ изъ одного меньше плотнаго, въ другое больше

плот-

плотное прозрачное тѣло, напротивъ преломляется оной не перпендикулярно, (или не прямо), когда изъ больше плотнаго, въ меньше плотное тѣло переходитъ.

5. Степень преломленія тѣмъ больше бываетъ, чѣмъ больше суть прозрачныя тѣла, изъ коихъ одного въ особливости тяжелейшаго и плотнѣйшаго бываетъ переходеніе свѣта въ другое плотнѣйшее тѣло. Напротивъ тѣмъ меньша бываетъ степень преломленія, чѣмъ меньшую имѣютъ густоту и плотность тѣ тѣла, изъ коихъ одного бываетъ переходеніе въ другое, не такъ плотное тѣло.

6. Постоянное бываетъ содержаніе между синусомъ угла наклоненія и синусомъ угла преломленія, когда густотѣ или плоскостей тѣхъ тѣла, изъ коихъ одного тѣла бываетъ переходеніе въ другое, одинаковое имѣется содержаніе. Напротивъ превращное бываетъ содержаніе тѣхъ синусовъ, когда лучъ свѣта изъ больше плотнаго тѣла переходитъ въ меньше плотное, противнымъ совсѣмъ образомъ пому явленію, когда изъ одного меньше плотнаго, въ другое больше плотное тѣло переселяется.

7. Когда лучъ свѣта изъ воздуха проникнетъ въ воду, тогда синусъ угла наклоненія къ углу преломленія содержится такъ какъ 4 къ 3. Напротивъ когда изъ воды переходитъ въ воздухъ, тогда содержится какъ 3 къ 4, а когда лучъ свѣта переходитъ въ стекло, то синусъ угла

пре-

преломленія къ синусу наклоненія содержится такъ какъ 2 къ 3. Еспьлиже изъ стекла переселяется въ воздухъ, то какъ 3 къ 2.

8. Скорость свѣта всегда находится большая въ густѣйшихъ и плотнѣйшихъ тѣлахъ, нежели въ меньше густомъ и плотномъ тѣлѣ.

9. Всякая тѣлесная видимая почка безмѣрные лучи во всѣ стороны разсыпаетъ, почему лучи отъ одной и тойже почки происходящія супъ раздающіяся или расходящіяся линіи.

10. Всѣ лучи изъ одной почки выходящія и проходящія чрезъ сечевицеобразное съ обѣихъ сторонъ выпуклое стекло соединяются опять позади стекла посредствомъ двоякаго преломленія въ одну почку, которое разстояніе отъ сечевицеобразнаго хрустальнаго стекла или хрустальной сечевицы естъ больше разстоянія оной почки.

11. Сечевицеобразные хрустали или хрустальныя сечевицы (*lentes chrystallinae*) могутъ представлять малое и ясное изображеніе всѣхъ свѣтлыхъ или сіяющихъ предметовъ или тѣлъ, еспьли будутъ расположены такимъ образомъ, чптобы хрустальная сечевица находилась между изображеніемъ и предметомъ, чптобы изображеніе всегда имѣло превращенное положеніе относительно къ предмету, и чптобы больше было и далѣе отстояло отъ сечевицеобразнаго стекла, еспьли разстояніе предмета естъ меньше отъ хрустальной оной сечевицы; и напрошивъ, чптобы изображеніе

женіе меньшее было и далѣе отстояло отъ сечевицеобразнаго спекла, естли предмѣтъ отъ онаго споль удаленъ будетъ, что величина изображенія, хопя и соразмѣрна разстоянію тогоже предмѣта, однако въ превратномъ содержаніи перемѣняется.

12. Тѣла или предмѣты не имѣютъ никакого цвѣту, но всякой цвѣтъ, каковой мы приписываемъ какимъ либо тѣламъ есть впечатлѣніе извѣстнаго нѣкотораго рода лучей, коихъ врожденная имъ сила особливымъ и отъ чувствительныхъ жилъ различнымъ степенемъ есть ограничена.

§ 300. Истинное мѣсто соединенія лучей, отъ лучезарной почки произтекающихъ, есть сѣпи подобная или сѣпчатая оболочка въ глазѣ, (tunica retina). Ибо оболочка сія не что есть иное, а наипаче на поверхности своей, какъ зрительная чувствительная жила пропята и обращенная въ оболочку, и почки предмѣтовъ недале 1. или 3. футовъ отъ глаза опдаленныхъ, подробно и раздѣльно впечатлѣваются. Впечатлѣніе же оное производится посредствомъ лучей. Ибо когда лучи, отъ одной почки происходящіе, въ разные спремятся стороны, и слѣдственно тысячу бы разъ производили они впечатлѣніе въ глазѣ, естлибы не соединялись въ одну почку, и мы одну только почку предмѣтомъ понимаемъ; то слѣдуетъ, чтобы она почка, въ которой лучи отъ одной почки произшедшіе сое-

ди-

диняются, поражала съпчашую глазную оболочку.

§ 301. Первое преломленіе лучей производится въ роговой оболочкѣ, а потомъ на передней поверхности хрусталовидной глазной влаги. Почему хрусталовидная она влага къ начертанію образа какого либо предмѣта не совсѣмъ есть необходима *), но только споспѣшествуетъ къ большему зрѣнію совершенству.

*) То есть служить къ собранію лучей и слѣдственно къ произведенію сѣтша. Въ прочемъ должно знать, что сія хрустальная влага, учинившись нечистою и мутною, производитъ глазную болѣзнь, такъ называемую, подшекъ въ глазѣ, (catharacta), окрѣпнувшиже совсѣмъ и затвердѣвши, совершенную причиняетъ слѣпоту. Откуда заключить можно, что влага сія есть крайне необходима къ зрѣнію, наипаче относительно къ привычкѣ нашей. Влага сія имѣетъ видъ зажигательнаго прозрачнаго стекла, съ обѣихъ сторонъ выпуклаго, твердаго сложенія, окружается весьма тонкою паушиной подобною оболочкою и находится между стеклянною и водяною влагами, будучи соединена посредствомъ мышковыхъ волоконцовъ съ ягодною плѣвою.

§ 302. Къ подробному и совершенному впечатлѣнію и обозрѣнію предмѣтовъ принадлежитъ, чтобы дѣйствіе свѣта было соразмѣрно чувствительности съпчашой глазной оболочки; ибо сильной свѣтъ сполько же взбивчивое производитъ зрѣніе, какъ и слабое или шуское сіяніе.

§ 303. Еслили глазъ обратишь къ окну отъ солнца освѣщенному, то ягодная оболочка въ глазѣ, спягиваетъ зрачокъ, зѣницею (pupilla)

име-

именуемой, и слѣдственно не много свѣта для произведенія впечатлѣнія пропускаетъ къ сѣточке; напротивъ при слабомъ и тускломъ свѣтѣ расширяетъ зѣницу и такимъ образомъ всѣ почти лучи, чрезъ прозрачную роговую оболочку проходящіе, къ впечатлѣнію образа на сѣпчатой оболочкѣ пропускаетъ, и степень свѣта, сколько можно, дѣлаетъ соразмѣрнымъ чувствію сѣпчатой глазной оболочки.

§ 304. Образъ начертанъ на сѣпчатой оболочкѣ есть обращенной, а тотъ, которой мы видимъ есть прямой. Лучи же отраженные отъ изображенія, на сѣпчатой оболочкѣ описаннаго, чрезъ хрустальную горошинку въ глазѣ опять проходятъ должны, почему по силѣ и законовъ преломленія не могутъ соединяться лучи оные, какъ только на самой поверхности лучедастельнаго предмета

§ 305. Линія отъ свѣтлой или лучедастельной точки чрезъ средину зѣницы къ мѣсту, гдѣ весьма живо описуется изображеніе предмета, или такъже отъ средины сіяющаго предмета къ срединѣ изображенія раздѣльно проведенная, называется осью зрѣнія или видѣнія (*axis visionis*), слѣдовательно оси зрѣнія обоихъ глазъ, еслили мы совершенно видимъ, внѣ глаза въ свѣщающейся точкѣ соединяются.

§ 306. Дѣйствующая вещь всегда есть нѣчто иное, отъ ея дѣйствія, и опять пониманіе или ощущеніе есть нѣчто иное отъ дѣйствія:

такимъ образомъ иное нѣчто естъ и лучъ свѣта; а иное дѣйствіе сего луча на глазъ, и иное впечатлѣніе сего дѣйствія, которое, когда производится опъ одного класса лучей, по однороднымъ цвѣтомъ, а когда происходитъ опъ нѣсколькихъ классовъ, вкупѣ на одну точку глаза дѣйствующихъ, по разнороднымъ, когда же опъ всѣхъ классовъ лучей происходитъ, по свѣтомъ или ясностію называется. И такъ впечатлѣніе и пониманіе свѣта и лучей не только опъ силы и напуры лучей свѣта и цвѣтовъ зависитъ, но вкупѣ и опъ строенія нашего глаза, а наипаче сѣпчатой оболочки, зрительной чувственной жилы, и жизненныхъ соковъ.

§ 307. Глазъ движутъ и разнообразно обращаютъ чепыре правыя мышцы. Каждая порознь мышца, или двѣ вкупѣ могутъ обращать глазъ около различныхъ своихъ поперечниковъ, однако такъ, что ось глаза вверхъ правою вышшею мышцею, а внизъ низшею правою же мышцею, къ носу правою внутреннею, а къ внѣшнему углу или купку правою внѣшнею обращается.

§ 308. Вышшая косая мышца обращаетъ глазной шаръ около глазной оси къ носу, а низшая косая мышца обращаетъ глазъ около оси къ внѣшнему купку глаза. Еслиже обѣ косыя мышцы вмѣстѣ дѣйствуютъ, тожимаютъ глазъ къ носу и вкупѣ нѣсколько движутъ впередъ или выворачиваютъ вонъ изъ глазной ямы.

§ 309.

§ 309. Польза и употребленіе глазныхъ ко-
сыхъ мышцъ состоятъ въ опдаленіи хруста-
ловидной влаги, или хрустальной глазной сече-
вицы отъ сѣпчатой оболочки, которая къ обо-
зрѣнію близкихъ предмѣшовъ есть весьма необхо-
дима.

§ 310. Спекловидная гладкая влага есть жид-
кость содержаемая въ собспвенныхъ ея обо-
лочкахъ. Внѣшней спекловидной влаги оболочка
сохраняетъ всегда хрусталовидную горошинку
въ одномъ и томъ же положеніи и мѣстѣ.
Ибо помянутая оная горошинка соединяется
крѣпко съ спекловидною влагою, посредствомъ
рѣснишныхъ волоконецъ, впрочемъ оная горошин-
ка есть еще утверждена и укрѣплена посред-
ствомъ мишковой или рѣснишной связки (*liga-
mentum ciliare*).

§ 311. Въ глазѣ такъ, какъ и прочихъ ча-
стяхъ тѣла, находится кругообращеніе влагъ:
поселику многія кровеносныя сосуды, какъ бое-
выя то есть, такъ и крововозвратныя жилы и
при томъ довольно великія чрезъ твердую весь
глазъ покрывающую плѣву проникаютъ въ глазъ;
и поселику вся ликососпавная оболочка и ея
внутренняя плѣва содержатъ двоякой рядъ или
двоякое слоеніе (*stratum*) сосудовъ. Наконецъ еще
потому, что излучистыя сосуды, проходящіе
въ рѣснишныхъ мышвовыхъ волокнахъ, конечно-
спями своими соединяются въ водяной глазной
влагѣ.

§ 312. Если вся водяная глазная влага выпечется чрезъ язвину или рану роговой оболочки; то въ чепыре часа опять совсѣмъ возстановляется; изъ чего можно заключить, что сосуды ликососпавныя оболочки частію отдѣляютъ, и частію приуготовляютъ жидкости въ глазъ, а излучистыя конечности крововозвратныя жилъ вбираютъ или втягируютъ въ себя оныя влаги. Впрочемъ помянутыя оныя глаги могутъ также выходить или выпарываться чрезъ скважинки роговой оболочки.

§ 313. Матерыхъ глазныхъ оболочекъ (scleroticae tunicae) польза состоитъ въ томъ, чтобы подавать припекающимъ влагамъ. То сопротивление, котораго оныя опѣсчатой и ликососпавной, и наче зрачковою тонкою лѣвою (choroidea) называемой, получить не могли. Далѣе защищать и охранять глазъ, дабы оной не могъ быть поврежденъ опѣ какой либо внѣшней хопя впрочемъ и легкой силы. Наконецъ подавать для прикрѣпленія мышцамъ и бѣлочной оболочкѣ (tunica adnata) неподвижныя почки.

§ 314. Употребленіе глазныхъ вѣкъ есть сіе, чтобы приспущеніе или спремленіе лучей къ роговой оболочкѣ при сильнѣйшемъ сіяніи свѣта уменьшать, а при умаленіи свѣта опять дѣлать свободной лучей доступъ и паденіе на роговую оболочку. Далѣе чтобы при смыканіи своемъ были въ состояніи отдавать весь свѣтъ опѣ глазъ, какъ во снѣ, такъ и въ другое

тое потребное вреия. Наконецъ, чпобы могли охраняишь переднія глазныя части опъ чрезъ-чайно холоднаго или сухаго воздуха и низпаде-нія или спремленія насѣкомыхъ.

§ 315. Чрезъ опверспія слезныхъ пропोकнъ (puncta lacrymalia) проходяишь жидкость въ слез-ную сумочку, а изъ оной проникаетъ въ слез-ной пропокъ (ductus lacrymalis), изъ котораго на-конецъ изливается въ ноздри.

§ 316. Рѣсницниковъ упоиребленіе состоишъ въ препяпспвованіи низпаденія изъ лба попо-выхъ капель къ рѣсницамъ и глазамъ.

§ 317. Польза и необходимостъ многого жи-ру, находящагося между глазами и глазными ямами, состоишъ въ томъ, чпобы глазной шаръ всегда находился на своемъ мѣспѣ, и опъ окружающихъ ея часпей равномѣрно подовляемъ былъ. Далѣе, чпобы ограничили положеніе и направленіе мышцъ, и сохранишь склизкость и гибкость оныхъ. Наконецъ, чпобы находи-лась тѣплоша во всѣхъ смѣжныхъ частяхъ глаза.

§ 318. Подробное впечатлѣніе близкихъ пред-мѣповъ, копорые опспояишь опъ глазъ на два дюйма или фуша: взбивчивое же всѣхъ далѣе опспояищихъ предмѣповъ называется близору-костью (myopia).

§ 319. Взбивчивое или не ясное впечатлѣніе близкихъ, ясное же и довольное опдаленныхъ

предмѣшовъ называется зоркостью или дальновидностью (*græsbioria*). Сей припадокъ всегда почи свойственъ естъ преснарѣлымъ людямъ, когда напрошивъ вышеупомянутыи свойственъ естъ молодымъ людямъ. Оба же сии недостатки происходятъ отъ того, когда хрустальная влага въ глазѣ не насвоемъ находится мѣстѣ. Близорукость бываетъ, когда влаги сии ближе находятся къ роговой оболочкѣ, а зоркость, когда ближе бывають къ глазной сѣточкѣ, или сѣпи надобной оболочкѣ въ глазѣ.

ГЛАВА XV.

О слышаніи или слухѣ.

§ 320. Всякое впечатлѣніе произведенное въ ухѣ, изъ котораго мы обыкновенно заключаемъ къ дѣйствію какого либо отдаленнаго шѣла и судимъ о сущесгвованіи онаго и его качествахъ, называется *звономъ* (*sonus*). Могущество же въ челоуѣмъ понимать выше сказаннымъ образомъ шакковыя въ ушахъ произведенныя перемѣны называется *чувствомъ слуха* или *слышанія* (*sensus auditus*).

§ 321. Явленія звука сущь ниже слѣдующія:

1. Всякое шѣло, которое воздуха скоропостижное производитъ разширеніе соспояляетъ звукъ, хотябы разширеніе оное воздуха произведено было посредствомъ предыдущаго сжиманія воздуха и скоропостижнаго оспановленія сжатія онаго; или дрожаніемъ самыхъ малыхъ частицъ твердаго

даго упругаго тѣла опѣ другого тѣла пораженнаго ; либо пламенемѣ нечаянно на воздухѣ возгорѣвшимся.

2. Воздухѣ, который есть пакѣ какѣ посреднее тѣло, дѣйствіе дальнаго звѣнящаго тѣла приноситѣ къ нашимѣ ушамѣ. Дѣйствіе же воздуха, которымѣ производится звонѣ въ ухахѣ, есть скоропоспѣжное разширеніе тогоже самаго воздуха.

3. Разширеніе оное воздуха, произшедшее въ нѣсколькихѣ часпицахѣ воздуха, прямыми линіями, во всѣ стороны продолжается поступательнымѣ образомѣ. Однако пакѣ, что въ теченіе одной секунды, восмнѣнадцатую часть нѣмецкой мили звонѣ перебѣгаетѣ. Самая же прямая линія, по которой направленію споспѣшествуетѣ воздухѣ къ произведенію звона, называется: *звонкимѣ лучемѣ* или *лучемѣ звона*. (*radius sonorus*).

4. Дѣйствіе воздуха или звона уменьшается соразмѣрно умножающемуся мѣсту опѣ звѣнящаго тѣла опдаленію.

5. Звонѣ, поколику измѣряется другимѣ звонномѣ, называется *тономѣ* или *голосомѣ* (*tonus*).

6. Спруна или перепонка, будучи напѣянута въ извѣстномѣ степени и приведенна недрожащимѣ тѣломѣ къ дрожанію во всей обширности своей, производитѣ одинѣ только звонѣ.

7. Мягкія, или недовольно упругія тѣла хопя и весьма сильно поражены бывають, однако никакого не издають шона.

§ 322. Поелику слуховой проходъ имѣетъ коническую фигуру; для того воздухъ, будучи сжатъ въ ономъ, съ большею скоростію и съ большимъ стремленіемъ дѣйствуетъ или поражаетъ тимпанную перепонку въ ухѣ. И воздухъ, стремясь изъ улитки въ слуховой проходъ, опъ низшей части улитки восходитъ къ передней и вышней части слуховаго прохода, откуда прямо къ тимпанной перепонкѣ стремится. По сей по самой причинѣ оной слуховой проходъ въ такомъ мѣстѣ устроенъ и разнообразно огражденъ, чпобы холодъ и теплоша внѣшняго воздуха не могли повредить слуховаго нерва, какъ единственнаго орудія слуха или слышанія.

§ 323. Тимпанная перепонка двоякимъ образомъ споспѣшествуетъ къ произведенію звона: а имянно: *дрожаніемъ* и *трясеніемъ*.

Тимпанная впадина должна было бытъ великая. Она имѣетъ такъ же особой проходъ, который называется *Евстахіевою* трубою (*tuba Eustachiana*), чрезъ которую трубу воздухъ можетъ проходить въ зѣвы. А поелику конецъ Евстахіевой трубы, находящійся въ зѣвахъ, есть перепончатой или пленной, и бока оной одинъ другаго касающа: для того воздухъ, сдѣлавшись нѣкоторымъ образомъ напуральнаго больше упругимъ прясеніемъ тимпанной кожи *), сопротивленія онаго превозмогти не можетъ.

е) Ривинъ говоритъ, что сія тимпанная перепонка имѣетъ нѣкоторую кругловатую дырочку въ томъ мѣстѣ, гдѣ молоткова рукоятка соединяется съ голов-
комъ

кою, то есть у лѣваго боку молотковой рукоятки, чрезъ которую воздухъ можетъ проходить въ пимпанную впадину и тѣмъ способствовать къ лучшему слышанію. Нѣкоторые люди чрезъ сію самую дырочку пропускаютъ дымъ изъ рша въ уши, а изъ ушей вонъ. Во время насморка, то есть, когда больные сморкаютъ носъ, слышимъ бываетъ скрипячей звонъ въ ушахъ, который нечто есть иное, какъ воздухъ чрезъ засоренную оную дырочку изъ рша проникаетъ въ уши. Нѣкоторые о сей дырочкѣ сомнѣваются, а нѣкоторые, какъ Г. Шалцманнъ, собственнымъ опытомъ подтверждаютъ существованіе оной.

§ 325. Другая впадина или полоса въ ухѣ, поверхность которой слуховыи нервъ, пакъ какъ главное орудіе слуха окружаетъ, называется *Лавиринномъ* (Labyrinth).

§ 326. Евстахіева мышца, которая движеніе пимпанной плѣвы въ сокровенныхъ частяхъ производитъ, есть самая крѣпкая мышца изъ тѣхъ, которыя приводятъ въ движеніе слуховую на молоточекъ похожую кость.

§ 327. Стремениеобразная слуховая кость (stapes), съ толикою скоростію напередъ и назадъ подается, съ коликою средоточіе пимпанной кожицы во время прясенія движется, отъ чего происходитъ, что стремленіе звонкаго воздуха на пимпанную кожицу весьма близко достигаетъ тѣхъ полосей ушныхъ, которыя для ощущенія сего дѣйствія разширеною слуховою чувствительною жилою вездѣ суть выспланны. Помощію косточки наковальни подобной, стременивидной и на молотокъ похожей косточки, дѣйствіе сіе будучи усиленно,

переходитъ въ овальную диру, а изъ оной къ чувствительнымъ часпямъ.

§ 328. Когда спремленіе воздуха чрезъ Лавиринеово преддверіе и полукружія въ слуховой кости находящіяся проникнетъ въ полосъ улитки, то впечатлѣніе или ощущеніе должно быть шамъ весьма великое, гдѣ бываетъ весьма великое спремленіе, и раковина будетъ та часпъ Лавиринеа, гдѣ для произведенія звона весьма сильное бываетъ спремленіе жизненныхъ соковъ. Ибо въ завишой лощинѣ, обыкновенно улиткою опъ Анапомиковъ называемой, сизнова умножается спремленіе воздуха, для того, что воздухъ изъ пространнѣйшаго мѣста въ тѣснѣйшее протоняется. Далѣе костяныя въ завишой раковинѣ бляшки гораздо удобнѣе, нежели всѣ лавиринеовыхъ полосей спѣны содрогаться и смѣжныя чувственныя жилы къ дрожанію побуждаютъ могутъ. Поелику средняя часпъ преграды еспъ чувственножилъная перепонка, копорая одна только во всемъ лавиринеѣ дрожатъ можетъ. Наконецъ самая чувственножилъная преграда улитки, поколику оная различную имѣетъ ширину, весьма много споспѣшествуетъ къ впечатлѣнію и раздѣленію разныхъ звуковъ и голосовъ или поновъ.

ГЛАВА XVI.

О внутренних чувствахъ.

§ 329. Извѣстно, что душа человѣческая мыслитъ или помышляетъ въ то время, когда различаетъ себя отъ другихъ вещей; слѣдовательно понятіе есть одной какой либо вещи впечатлѣніе подъ извѣстными свойствами.

§ 330. Способность души возобновлять впечатлѣнія посредствомъ чувственныхъ орудій нѣкогда учиненныя даже и безъ присудствія внѣшнихъ предмѣтовъ, называется воображеніемъ или мечтаніемъ (*imaginatio f. phantasia*).

§ 331. Душа можетъ знать, было ли когда въ умѣ настоящее понятіе какимъ либо образомъ впечатлѣнное, или нѣтъ? паковая способность души называется: *памятію* или *вспоминаніемъ*. (*memoria f. reminiscencia*).

§ 332. Способность души, сравнивать многія настоящія вкупѣ понятія такъ, чтобы она была въ состояніи знать, имѣютъ ли какое нибудь сходственное между собою свойство различныхъ впечатлѣній, называется: *умомъ* или *остротою ума* (*ingenium*). Могущество же души размышлять, имѣетъ ли какую нибудь связь одно понятіе съ другимъ, называется *разсужденіемъ* или *разумомъ* (*judicium f. ratio*).

§ 333. Способность души разсуждать познанныхъ вещей противныхъ или пріятныхъ, и оныхъ желать или не желать, называется *во-*

летію

лею и неволею, или хотѣніемъ и нехотѣніемъ (voluntas & noluntas).

§ 334. Сея душевныя способности (§ 331.) большій спепенъ называется *пожеланіемъ* или *лтохотѣніемъ* (appetitus), которое еспѣли происходишѣ опѣ неразсудка или взбивчиваго поняпія, шо называется *чувствѣннымъ лобужденіемъ* (appetitus sensitivus). Всѣ же сіи способности душевныя однимъ словомъ называюшѣся *внутренними чувствами* (sensus interni).

§ 335. Способности душевныя вѣ различныхъ людяхъ различны бываюшѣ, какъ вразсужденіи сложенія или шемпераменша, пакъ и вразсужденіи возраста и упошребленія. Ибо вразсужденіи шемпераменша, сангвиникъ или многокровоной *воображеніе* и *остроуміе*, меланхоликъ или задумчивой, *память*, а холерикъ или гнѣвливой имѣетъ *великое разсужденіе*. Вразсужденіи возраста, вѣ юношествѣ царшвуюшѣ *воображеніе*, *память* и *остроуміе*, а вѣ мужескихъ лѣпахъ *владычествуетъ разсужденіе*, но вѣ преспарѣлыхъ и уже спѣшащихъ къ послѣднему жизни своея предѣлу, какъ *память* пакъ и *разсужденіе* мало по малу угасаюшѣ. Таковъ шо еспѣ свѣщильникъ жизни челоѣческія!

ГЛАВА XVII.

О голосѣ.

§ 336. Звукъ, который воздухомъ изъ рта, ноздрей и зѣвовъ выходишѣ опѣ спѣсненія,
или

или разширенія груди производима, называется *голосомъ* (vox); однако одинъ и тотъ же голосъ, вразсужденіи направленія своего различныя получаетъ имена. Ибо голосъ иногда плачемъ, иногда пѣніемъ, иногда модуляціею или напѣвомъ уснами производимымъ (modulatio), иногда смѣхомъ, иногда рѣчью, иногда крикомъ или воплемъ (eulatus), иногда чиханіемъ и наконецъ произнесеніемъ словъ, рѣчью или глаголаніемъ называется.

§ 337. Отверстіе гортани (glottis) есть первѣйшее мѣсто, гдѣ рождается голосъ. Непосредственная и ближайшая причина голоса есть упругость воздуха больше въ легкихъ, нежели въ натуральномъ состояніи сжатая. Дальнѣйшія же причины суть силы, коими воздухъ сжимается въ легкихъ. Связки и вышшія конечности черпалообразныхъ горшанныхъ хрящей, ко-
торыхъ отверстіе называется *глоткою* или *гортанью* (glottis), къ произведенію и умноженію голоса въ продолженіи онаго посредствомъ дрожанія своего премного споспѣшествуютъ.

§ 338. Голосъ послѣдственными звуками изображенной называется *тономъ*, слѣдственно *лѣніе* нечто есть иное, какъ голосъ, нѣсколько минушъ, посредствомъ опредѣленныхъ звуковъ, продолженной. Звонъ или голосъ бываетъ сильной отъ разширенія гортани, отъ спѣсненія же оной бываетъ слабой. Почему младенцы и женщины, у коихъ обыкновенно отверстіе гор-
шани

шани бываетъ уже, слабѣе и понижѣе имѣ-
ютъ и произносятъ голосъ.

§ 339. Голосъ произведенъ въ горшани двоя-
кимъ выходитъ путемъ: а имянно сквозь ротъ
и ноздри.

§ 340. Явственно произнесенной голосъ (*articu-
lata vox*), когда то есть кпо либо употребляетъ
оной для изображенія своихъ мыслей, называется
рѣчию *) (*loquella*).

*) Для произведенія рѣчи потребны суть слѣдующія ве-
щи. 1) Языкъ, какъ первое орудіе, составляющее
рѣчь. 2) Воздухъ различно образуемый при состав-
леніи рѣчи. 3) Легкое и его пузырьки, изъ коихъ
чрезъ воздухоносные каналы воздухъ выходитъ вонъ.
4) Горшанные хрящи а наипаче надглоточной хря-
щикъ, гдѣ голосъ, разнообразно ударяясь, дѣлается
громкимъ. 5) язычекъ съ окологзычными желѣзами,
гдѣ голосъ рѣчь образованъ начинаетъ. 6) Зѣвы и
небо, гдѣ голосъ пониженъ быть начинаетъ. 7) Но-
здри, посредствомъ коихъ рѣчь дѣлается пріятною.
8) Зубы, къ которымъ языкъ при составленіи словъ
придвигивается и дѣлаетъ рѣчь явственнѣе. Отку-
да видно, что беззубые, каковы суть младенцы и
спарики, явственно говорить не могутъ. 9) Губы,
кои разнообразно, то смыкаясь, то растворяясь,
способствуютъ хорошему выговору словъ. 10) Гру-
добрюшная преграда, способствующая исхожденію
воздуха изъ легкихъ. 11) Влажность въ ротѣ и воз-
духоносномъ каналѣ, безъ которой голосъ бываетъ
хрипливъ и непріятенъ.

§ 341. Душевная спрасъ, пріятная съ радостию
соединенная и голосомъ произнесенная, называется
смѣхомъ (*risus*); напротивъ непріятная и съ
печалію соединенная называется плачемъ (*lletus*).

§ 342. Покамѣстѣ продолжается смѣхъ (§ 339), пошамѣстѣ никакого не бываетъ вбирания воздуха въ легкія; слѣдственно когда смѣхъ долго продолжается, то кровь въ легкихъ долго не расширяется, то есть не сгущается, почему останавливается въ дыхательномъ горлѣ, отъ каковаго остановленія показывается краска въ лицѣ, и не рѣдко прорѣдаются сосуды въ мозгѣ.

§ 343. Плачь различествуетъ отъ смѣху: ибо во время плача, не расширяются, но смыкаются глаза покрывающіе вѣка. Далѣе опвисаются губы, а наипаче около угловъ рта. При этомъ вбирание воздуха хотя впрочемъ и великое бываетъ, однако часто бываетъ скорѣ пресѣкаемо и громко. Отъ какого пресѣченія внѣшнія сосуды расширяются, и разливается на лицѣ краска.

§ 344. Кашель (tussis) отъ смѣха и плача различается слѣдующимъ образомъ: во первыхъ при кашлѣ грудобрюшная преграда и внѣшнія междуреберныя мышцы сжимаются, коихъ сжатіе вдругъ преодолевается бываетъ сжатіемъ чревныхъ и внутреннихъ междуреберныхъ мышцъ. Въ семъ случаѣ мышки какъ духодвижныхъ каналовъ, такъ вмѣстѣ и дыхательнаго горла сжимаются: ибо раздраженіе выше сказанныхъ мышцъ въ болѣзненномъ кашлѣ всегда почитается случайною онаго причиною. Откуда ясно, что кашель есть насильственное и смѣха гораздо сильнѣйшее дѣйствіе (conussoria actio), попому что во время кашля какъ кровь, такъ мокро-

мокроша, гной или сукровица и все находящееся въ духодвижныхъ каналахъ движется въ верхъ, что смѣхомъ никакъ не производится.

§ 345. Сильной и громкой воздуха изъ ноздрей произшедшій шумъ называется *чиханіемъ* (*sternutatio*), которое шѣмъ различается отъ кашля, что чиханіе всегда предшесвуемъ великое втягиваніе воздуха въ легкія, что не всегда вдругъ бываетъ, но по прошествіи нѣкотораго разспоянія времени сильной и громкой оной послѣдуетъ шумъ и издохновеніе. И естли чиханіе нѣсколько разъ повторено будетъ, то должно, чтобы оное всегда предслѣдованно было новымъ вбираниемъ воздуха. Наконецъ раздраженіе, производящее чиханіе, всегда въ ноздряхъ производимо быть должно.

Г Л А В А XVIII.

О с н ѣ.

§ 346. Состояніе человѣческаго жизнию одареннаго шѣла, въ которомъ обыкновенно внѣшніе предмѣты, хотя и дѣйствуютъ на чувствительныя орудія, однако не надлежащимъ образомъ, и однѣ только темныя производятъ впечатлѣнія, пока наконецъ во все дѣйствовать перестанутъ, при продолженіи однакожъ и существованіе дыханія, кругопеченія крови и червообразнаго кишекъ движенія, называется сномъ. (*sonnus*).

§ 347. Отверстіе рта противъ изволенія человѣческаго отъ вязкости пасоки или слины произ-

произшедшее, называется *зѣваніемъ* (*oscitatio*), которое по большей части предшеспвуетъ сонѣ.

348. Во время сна медлѣннѣйшее бываетъ сжиманіе, и слѣдспвенно движеніе сердца. Чего причиною нечшо иное бываетъ, какъ умноженіе сопротивленія въ конечныхъ сосудахъ. Ибо я собственнымъ извѣдалъ опытомъ, чшо во всякомъ спящемъ челоѣкѣ меньше щипается въ одну минушу пульсовъ, нежели въ бодрспвующемъ и свои отправляющемъ дѣла. Въ восьми-лѣтнемъ отрокѣ я нащипалъ 100 поражений пульса во время его бодрспвованія, во время же сна, только 89. Въ одинаццати-лѣтнемъ спящемъ отрокѣ 80, а въ бодрспвующемъ 90 біеній пульсовъ. Въ одномъ 14 лѣтнемъ юношѣ во время сна 62, а во время бодрспвованія 82 пульса въ одну минушу я примѣтилъ.

§ 349. Время какъ бодрспвованія, такъ и сна вразсужденіи темпераменту и возраста пренного различно бываетъ. Новорожденные младенцы, еспьли не мѣшаютъ пому болѣзни, спятъ всякой день 24 часа, которое время мало по малу уменьшается. Ибо отроки рѣдко болѣе 10 или 12 часовъ просыпаютъ. Въ мужеспвенныхъ лѣтахъ рѣдко спятъ люди болѣе 8 часовъ. Чпожъ касается до стариковъ, то оныя весьма рѣдко многіе сряду просыпаютъ часы.

§ 350. Причиною сего различного времени сна въ младенцахъ еспь недостатокъ еспеспвенной щеплошы. А въ старикахъ ожесптѣніе или окрѣп-

лоспѣ волоспей и большее соединеніе жидкихъ часпей, происходящее опѣ преизлишества земляныхъ и недоспашка крѣпкихъ или душистыхъ жизненность раждающихъ часпей.

§ 351. Вибивчивыя впечатлѣнія, которыя во время сна происходятъ, и о которыхъ душа свѣдѣніе имѣетъ, хотя бы оныя были соединены съ движеніемъ шѣла, или не были, называющіяся *мечтаніями* или *сновидѣніями* (*insomnia*). Ночныя оскверненія нечто супъ иное, какъ любоспрасныя сновидѣнія, которыя бывають тогда, когда исполненной мочевой пузырь спереди, а жалъ и вѣпры находящіяся въ заднепроходной кишкѣ изъ задижимають сѣмянные пузырьки (*vesiculae feminales*). По большей части случается се опѣ разслабленія дѣспородныхъ часпей неспрезово и невоздержною жизнію причиненнаго.

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.



ЧАСТЬ ТРЕТІЯ

О

Патологїи или наукѣ, показывающей всѣ
припадки и болѣзни человѣческаго шѣла,
изслѣдывающей всѣ оныхъ причины и опи-
сывающей признаки, руководствующія къ
познанію болѣзней и оплеченію
однихъ отъ другихъ.

FACTS AND FIGURES

THE following facts and figures are taken from the report of the
Board of Directors of the American Red Cross Society for the year
1917. The report is published in the form of a book, and is
available for sale at the price of \$1.00 per copy. The report
contains a full and complete statement of the work of the
Society during the year, and is a valuable source of information
for all those interested in the work of the American Red Cross
Society.



ЧАСТЬ ТРЕТІЯ.

О патологiи или наукѣ о человѣческихъ болѣзняхъ.

ГЛАВА I.

§ 352. Ученіе, которое изъясняетъ все роды и виды болѣзней, изслѣдываетъ начала и припадки оныхъ, и какъ причины, такъ и самыя предвѣщанія или окончанія болѣзней изъ началъ Анапомическихъ и Механическихъ ясно доказываетъ, называется *Патологіею* (pathologia).

§ 353. Всякая болѣзнь есть немощь или немогущество частей живаго человѣческаго тѣла опправлять надлежащимъ образомъ и безо всякаго физическаго препятствія потребныя дѣйствія; каковое немогущество происходитъ отъ чрезвѣщественнаго или изпорченнаго состоянія тѣла.

§ 354. Причины болѣзней бывающѣ либо безпосредственныя, либо посредственныя ближайшія, либо посредственныя дальнѣйшія.

§ 355. Безпосредственная причина всѣхъ болѣзней (§ 354) есть чрезвѣснественное или испорченное состояніе живаго человѣческаго тѣла.

§ 356. Посредственная ближайшая болѣзни причина есть все то, что только въ состояніи способствовало къ продолженію чрезвѣснественнаго частей состоянія: куда по справедливости относяся всѣ влаги и соки нашего тѣла.

§ 357. Посредственная дальнѣйшая болѣзни причина есть все то, что только еснественное состояніе тѣла переменить можетъ. Куда относяся какъ шесть вещей, такъ называемыхъ ненатуральныя или неестественныя (*non naturalis res*), каковыя суть: воздухъ, пища и питье; покой и движеніе, сонъ и бдѣніе; испражняемыя и неизпражняемыя матеріи; и наконецъ душевныя движенія или спраски: такъ и натуральныя или еснественныя: каковыя суть: темпераментъ или каждому человеку свойственное сложеніе; возрастъ или лѣта; полъ; наследственное разположеніе (*hereditaria dispositio*); спроеніе тѣла; родъ жизни; обыкновеніе или привычка и особливая нѣжность или чувствительность тѣла (*idiosyncrasia*).

§ 358. Еслили части, составляющія жидкость или какую либо влагу, не имѣютъ надлежащей между собою пропорціи или мѣры; то такая изпорченная пропорція называется худокровіемъ, худосочностію или порчею соковъ (e. cochimia): каковая порча соковъ бываетъ либо желчная (biliosa), либо мокротная (pituitosa), либо меланхолическая или грусть и тоску производящая (melancholica), либо черножелчного (atrabiliaria).

§ 359. Разжиженіе крови есть разпущеніе оной съ напухлостію шѣло.

§ 360. Неумѣренность или неразтвореніе (intemperies) есть чрезбеспественное состояніе жидкихъ частей; каковое неразтвореніе происходитъ отъ изпорченной мѣры или содержанія оныхъ.

§ 361. Неразтвореніе (§ 360) бываетъ либо горячее и сухое; либо холодное и сухое; либо холодное и влажное или мокрошное.

§ 362. Горячаго и сухаго неразтворенія непосредственная причина есть желчное или черножелчное худосочіе. Напротивъ мокрошное худосочіе есть причиною холоднаго и мокрошнаго сложенія или неразтворенія. Задумчивость и уныніе причиняющее или меланхолическое, словомъ, черножелчное худосочіе есть причиною холоднаго и сухаго сложенія.

§ 363. О болѣзняхъ обыкновенно судятъ либо въ разсужденіи болѣзнующаго лица, либо въ разсужденіи степени болѣзни; либо въ разсужденіи времени и дѣйствія оныхъ.

§ 363. Въ разсужденіи лица (363) болѣзни бывають либо *всеобщія* или *всеобщія* (*universales*), либо *частныя* (*particulares*), либо *особыя самопричинныя* (*idiopathici*), либо *принадочныя* (*symptomatici*); въ разсужденіи степени болѣзни бывають: либо *сильныя*, либо *слабыя* и *малыя*. Чпожъ касается до времени; по болѣзни бывають либо *такія*, копорыя текутъ безпресѣчно, либо *такія*, копорыя имѣють свои возврапы или урочныя времена.

§ 365. Болѣзни, безпресѣчно текущія или принятыя во всемъ своемъ кругѣ, бывають либо *кратковременныя*, либо *долговременныя* (*chronici*). *Кратковременныя*, не долго тоестъ продолжающіяся, болѣзни бывають либо безъ всякой опасности, либо соединены съ опасностію, копорыя однакожъ всегда *острыми* называющся. Въ разсужденіи же возраста болѣзнъ обыкновенно раздѣляющся на *при поприща*, какъ-то: на *умноженіе* болѣзни, *крѣпость* или *утвержденіе* оной и *уменьшеніе*.

§ 366. Болѣзни опносительно до непрерывнаго ихъ теченія или долговременности бывають либо *непрерывныя* (*continui*), либо *опшсупающія* или *послабляющія* (*remittentes*), либо *перемежающія* или *перерывчивыя* (*intermittentes*).

§ 367.

§ 367. Безпрерывчивыя болѣзни называются тѣ, которыя имѣютъ одно только какъ умноженіе, такъ утвержденіе и уменьшеніе. Таковаго состоянія болѣзни называются еще иначе *непрестанными* или непрерывчивыми (*continentes*).

§ 368. Послабляющія болѣзни суть (367) тѣ, которыя послѣ сильныхъ припадковъ бывають соединены съ меньшими припадками, и по прошествіи нѣкрашкаго времени опять сильны бывають и наоборотъ. Что все производится чрезъ возвраты или пароксизмы.

§ 369. Перемѣжающіяся болѣзни (§ 366) суть тѣ, которыя послѣ печенія нѣсколькихъ припадковъ наконецъ никакихъ не имѣютъ; по прошествіи же нѣкопорого времени опять больного жесто мучають. Слѣдственно дѣйствіе свое производятъ съ перемѣжками.

§ 370. Что касается до дѣйствія болѣзней; то въ семъ случаѣ разсуждаютъ объ оныхъ либо въ разсужденіи произшествія только, либо въ разсужденіи произшествія оныхъ и припадковъ вкупѣ. Въ разсужденіи произшествія разсуждаютъ о болѣзняхъ опять либо въ разсужденіи жизни или смерти, либо въ разсужденіи пользованія.

§ 371. Въ разсужденіи жизни и смерти (§ 370) болѣзни бывають либо безопасныя, либо смертельныя, либо сомнительныя. Въ разсужденіи пользованія болѣзни бывають либо излечимыя, либо неизлечимыя. Въ разсужденіи произшествія и

вкупѣ болѣзненныхъ припадковъ бывающѣ либо доброприпадочныя лехкія или благія, либо худо-припадочныя сильныя, злыя и заразительныя.

§ 372. Болѣзни бывающѣ всеобщія или всеобщія тогда (§ 364), когда преестественное состояніе находится во всемъ кровяномъ составѣ. Самопричинныя или одномѣстныя болѣзни (*idiopathici*) называются тѣ, въ которыхъ причина болѣзни имѣетъ пребываніе свое въ той части тѣла, гдѣ ощущается немогущество или возмущеніе натуральныхъ отправленияхъ. Припадочныя же называются болѣзни, когда причина болѣзни въ другомъ находится мѣстѣ, а не тамъ, гдѣ ощущается немогущество или возмущеніе естественныхъ отправленияхъ. Таковыя болѣзни иначе еще называются *девторогатическими* или *другомѣстными*, либо *инопричинными* (*deuteropathici*).

§ 373. Припадочныя приключаются болѣзни (§ 370) единственно по причинѣ взаимной связи и соединенія волоконъ, кровеносныхъ сосудовъ и чувствительныхъ жилъ; ибо еслили изъ нихъ раздражитъ хотя одну жилу; то отъ того бываетъ гораздо большее прищеченіе жизненныхъ соковъ во всѣ кровеносныя сосуды и чувствительныя жилы, отъ одного пня исходящія.

§ 374. Крапковременныя болѣзни бывающѣ, когда силы болѣзненной матеріи бывающѣ во все неравныя

равныя: болѣзниже не имѣютъ никакой опасности, когда сила напугуры бываетъ велика, а болѣзненной матеріи мала; напропивъ имѣютъ опасность болѣзни, когда сила оныхъ бываетъ весьма велика, а напугуры мала.

§ 375. Тотъ періодъ, или по теченіе времени, въ которое больной гораздо больше страдаетъ, нежели въ другое, называется приступомъ болѣзни (*paroxismus*).

§ 376. Перебѣжающія болѣзни суть либо ускорительныя, либо замедлительныя. Ускорительныя болѣзни (*antecedentes*) называются тѣ, когда послѣдующій приступъ двумя или тремя часами ранѣе прежде бывшаго возвращается. А замедлительныя (*postponentes*) называются тѣ, когда послѣдующій приступъ двумя или тремя часами позже прежняго возвращается. Либо бываютъ неправильныя (*erratici*), либо неопредѣленныя и непостоянныя (*vagi*).

§ 377. Перебѣжающія болѣзни, называемыя ускорительныя (*antecedentes*), суть гораздо хуже и опаснѣе замедлительныхъ (*postponentes*).

§ 378. Перебѣжающія болѣзни бываютъ ускорительными, когда болѣзненная матерія въ большемъ находится количествѣ, накапливается въ кишкахъ, и, накопившись, скорѣе всасывается въ кровь. Замедлительныя же болѣзни бываютъ тогда, когда болѣзненная ма-

перія въ меньшемъ находится количествѣ, или бываетъ не много вязка и густа; попому что великая часть болѣзнетворной матеріи либо во время приступа, либо въ посреднее время изъ шѣла уже изпребилась.

§ 379. Перемѣжающіяся болѣзни спановящіяся не правильными (§ 376.) либо опъ учивенія погрѣшности въ содержаніи или діетѣ, либо опъ обращенія на свободномъ и открытомъ воздухѣ, либо опъ излишняго употребленія пищи и пипія; опъ чего болѣзненная матерія по умножаеися, по уменьшаеися.

§ 380. Заразительныя или прилипчивыя болѣзни суть шѣ, копорыя производящъ опъ бродительнаго свойства: съ воздухомъ и пипаніями вселяются въ желудокъ, и какъ соки, такъ и пасоку и самую кровь разрушающъ.

§ 381. Умноженіе болѣзни (§ 365) продолжается до шѣхъ поръ, пока дѣйствіе болѣзненной матеріи къ разрушенію кроваваго состава бываетъ большее, нежели дѣйствіе, разрушающее болѣзненную матерію.

§ 382. Утвержденіе или крѣпость (status) болѣзни называется, когда силы частей кроваваго состава бывающъ рывны силамъ болѣзненной матеріи.

§ 383. Разспояніе времени, въ которое больной относителъно до болѣзни своей опѣ всѣхъ припадковъ свободенъ бываетъ, называется *не-лихорадочнымъ* или *свободнымъ* отъ болѣзни *временемъ* (*arugia*).

§ 384. Великое изпражненіе болѣзненной матеріи естественными путями, произходящее поелѣ упвержденія болѣзни, соединеное съ облегченіемъ и послабленіемъ припадковъ, называется *судомъ* или *переломомъ* болѣзни (*crisis*); пошому что врачъ или лекаръ изъ таковыхъ непринужденныхъ изпражнений можетъ судить объ окончаніи болѣзни счастливымъ или несчастливомъ.

§ 385. Болѣзни называются *эпидемическими*, *появляющимися* или *перевальными* (*epidemiis*), еспѣли въ извѣстное нѣкоторое время года въ одномъ мѣстѣ премногіе люди одною и тою же болѣзнію бывающѣ обдержимы, а по прошествіи нѣсколькихъ недѣль или мѣсяцовъ, ни-кто изъ нихъ не бываетъ подверженъ таковой болѣзни.

ОТДѢЛЕНІЕ I.

ГЛАВА II.

О припадкахъ вообще.

§ 386. Всякое изпорченное дѣйствіе или качество человѣческаго шѣла, производящее либо опѣ причины болѣзни, либо опѣ предшедшаго очевиднаго изнеможенія, либо опѣ другаго какого либо припада, называеця прямо припадомъ (symptoma).

§ 387. По симъ шремъ причинамъ (§ 286) раздѣляюпся болѣзненные припадки на припадки причинные или самой причины (symptomata causalia), на припадки болѣзненные или самой болѣзни (morbi), и на припадки пакъ называемые припадочные или самаго припада (symptomatis). На примѣрѣ: еспѣли кшо спражденъ камнемъ, находящимся въ мочевомъ пузырьѣ; шо камень еспѣ причина боли; еспѣли же разсуждашь о боли, причиняемой камнемъ; шо она будешъ припадомъ причины, шо еспѣ припадомъ камня; а еспѣли наконецъ производшъ рвоша опѣ помянушой боли; шо въ семъ случаѣ рвоша будешъ припадомъ самаго припада.

§ 388. Всѣхъ припадовъ свойство еспѣ пакое, чшобы всегда находилось въ шѣлѣ поврежденное какое либо дѣйствіе. Дѣйствія же человѣческаго шѣла сушь прояхія: а имянно жизненные (vita-

(vitaes), естественныя (naturales) и животныя (animales). Хорошо по сему раздѣляющся и припадки на приподобныя опдѣленія, то есть: на припадки жизненныхъ, припадки естественныхъ и припадки животныхъ дѣйствій.

§ 389. Сии дѣйствія просякамъ оброзомъ повреждены быти могутъ. Ибо оныя могутъ быти либо уменьшенныя, либо изпорченныя, либо совсѣмъ уничтоженныя.

§ 390. Къ жизненнымъ дѣйствіямъ относятся теплоша, бѣненіе въ жилахъ или пульсъ и дыханіе.

§ 391. Къ естественнымъ дѣйствіямъ причисляющся сила или крѣпость, жеваніе и глотаніе, пищевареніе и опдѣленіе питательнаго сока, печеніе онаго въ млечныхъ сосудахъ и смѣшеніе съ кровью, опдѣленіе жидкостей изъ крови, надлежащее содержаніе жидкостей въ своихъ сосудахъ, испражненіе мочи и кала и наконецъ питаніе и дѣтворженіе.

§ 392. Къ животнымъ дѣйствіямъ относятся: самопроизвольныя движенія; сонъ и бдѣніе; пясть внешнихъ чувствъ, какъ-то: осязаніе, видѣніе, обонаніе, вкусъ и слышаніе; наконецъ душевныя дѣйствія: каковыя суть разсужденіе, воображеніе и память.

ГЛАВА III.

О образѣ поврежденія естественныхъ
дѣйствій и происходящихъ отъ
туда припадкахъ.

§ 393. Крѣпость или сила (§ 381) такъ какъ естественное дѣйствіе повреждается и уменьшается либо преждебывшими болѣзнями, либо лѣтами, либо голодомъ и жаждою, либо бдѣніемъ, движеніемъ и чрезмѣрными трудами.

§ 394. Силы испребляются сокрушеніемъ оныхъ (eclylis), которое есть нечто иное, какъ внезапное и скоропоспѣжное ослабленіе плѣсныхъ силъ, такъ что плѣло отъ того едва въ состояніи бываетъ прямо держаться, отъ чего человѣкъ низвергается на землю, имѣя впрочемъ неповрежденные чувства. Причина оного есть недоспашокъ жизненныхъ соковъ или духовъ въ мышцахъ и кровавомъ соспавѣ. Недоспашокъ оной происходитъ либо отъ чрезвычайной вязкости крови, либо отъ разрушенія оной, либо отъ яда, либо отъ душевныхъ припадковъ, либо отъ излишняго уменія крови, причиненнаго раною или родами, непомѣрнымъ кровопусканіемъ или сильнымъ проноснымъ лекарствомъ.

§ 395. Жеваніе уменьшается либо разслабленіемъ зубовъ, либо недоспашкомъ оныхъ:
что

что бываетъ въ опрочесствѣ и старости; либо распухлостію частей въ зѣвахъ и ротѣ, либо молошницею (arthris), либо разслабленіемъ или опухолью мышцъ, движущихъ низшую челюсть, либо поврежденіемъ нижней челюсти.

§ 396. Жеваніе испребляется опухолью и сильнѣйшимъ воспаленіемъ въ зѣвахъ, либо разслабленіемъ нижней челюсти и оной переломомъ, либо раню, либо онѣмѣніемъ или параличемъ мышцъ, приводящихъ въ движущее низшую челюсть.

§ 397. Глопаніе уменьшается опухолью зѣвовъ, либо всѣми тѣми причинами, которыми жеваніе испребляется (§ 396).

§ 398. Глопаніе испребляется весьма сильною жабою (angina), либо постороннимъ твердымъ тѣломъ, ввалившимся въ пищепріемное горло и шамъ остановившимся; либо уязвленіемъ зѣвовъ или пищепріемнаго горла; либо разбѣденіемъ или обдержаніемъ ранами пищепріемнаго же горла.

§ 399. Пищевареніе уменьшается либо лихорадками, либо щелочными солями, перемѣняющими желудочной сокъ или разтворъ, поспѣшествующій пищеваренію. Уменьшенное пищевареніе называется труднымъ вареніемъ желудка (dyspepsia); уничтоженное же пищевареніе называется невареніемъ желудка (apepsia).

§ 400. Поврежденное соко и кровопвореніе предполагаетъ изпорченное и поврежденное пищевареніе. Оно происходитъ отъ изпорченной желчи въ двенадцатипидюймовой кишкѣ, либо отъ вязкой и ѣдкой матеріи, находящейся въ оной, либо отъ червей или глистовъ, либо отъ заваловъ и засорѣній желѣзъ и внутренностей чрева.

§ 401. Пипаніе уменьшается и порпится худокровностію, сухопшкою, изпощеніемъ, Англическою болѣзнію или увѣчемъ (rachitide) и водяною болѣзнію.

§ 402. Худокровіе и худосочность или слабость въ тѣлѣ есть немощъ, въ надлежащее приводитъ движеніе члѣны тѣла и опправляя поспребныя дѣйствія, произшедшая отъ разслабленія волоконъ съ блѣдностію лица, а иногда и раздушіемъ онаго соединенное.

§ 403. Слабости въ тѣлѣ отъ худокровія произшедшей признаками бывають поспешенное или мало помалу умножающееся раздушіе лица и опухоль на ногахъ; изнеможеніе и тяжестъ въ тѣлѣ, наипаче при возсожденіи на лѣсницу ощущаемое, испребленіе позова на ѣду; весьма великіе вѣпры въ животѣ, пска, непоспоянное испражненіе желудка, когда шо еспъ испражняемая низокъ матеріи иногда бывають весьма швердыя, а иногда весьма жидкія; шрудное дыха-

дыханіе, соединенное съ шѣсною въ груди; наклонность ко сну послѣ ѣды; пульсъ швердѣ и слабѣ; моча бѣлая и не много цвѣтная, а чаще мутная; наконецъ препепаніе или прясеніе сердца (*palpitatio cordis*).

§ 404. Худокровія и производящей отъ онаго слабости въ шѣлѣ причины суть: худосочіе какъ сыворочное или водяное, такъ и мокротное (§ 358.), запоры и застои крови во внутренностяхъ, а наипаче въ печенкѣ, селезенкѣ, въ воронной жилѣ и притожемясной поджелудочной железнѣ, чрезвычайныя кровопеченія (*hemorrhagiæ nimis*), причиняемыя гемороемъ или кровопеченіемъ изъ носа и остановленіе оныхъ кровопеченій. Вогнаніе внутрь коросты и подагрической мащери, сидячая жизнь, худо пользованная лихорадка, а наипаче перемѣжающаяся. Долговременная печаль, излишнее употребленіе горячихъ напитковъ; такъ какъ и вяззельныхъ и сильныхъ слабительныхъ лекарствъ; наконецъ изпорченное пищевареніе.

§ 405. Чшо касается до предвещанія или предсказанія конца какой болѣзни; шю должно примѣчать слѣдующее: ещѣли находишся одно шокмо худое разположеніе или слабость въ шѣлѣ, отъ худокровности производящая, соединенная съ блѣдношю лица, и ещѣли шаквая худокровность приключилась молодымъ людямъ; шю часто оная исправляема бываетъ приличнымъ

чнымъ леченіемъ. Напрошивъ худые бываютъ признаки: когда худокровность нечаянно приключится, цвѣтъ на лицѣ бываетъ зеленоватой и черной, трудность въ дыханіи, напряженіе во вздохахъ, въ раздутыхъ и распухлыхъ членахъ твердость и сокрушеніе силъ часъ отъ часу умножающіяся, естли таковая худощавость произошла отъ кровопеченія геморая или мѣсячины; то по большей части перемѣняется въ водяную болѣзнь или сухопку (hectica).

§ 406. Естли женской полъ обдержимъ бываетъ худокровностію; то таковая болѣзнь называемая безцвѣтностію, блѣдностію или бѣлою желтухою (chlorosis); либо бѣлою дѣвичьею лихорадкою (febris alba virginum).

§ 407. Сухопка или чахлость (Atrophia) есть немогущество въ довольномъ количествѣ возстановлять и прилагать новыя питающія тѣло части, нечувствительною испариною разсыпаясь.

§ 408. Усохлость (aridura) есть частное изсушеніе каковалибо члена человѣческаго тѣла на прим. руки, ноги.

§ 409. Въ чахлости и изсушеніи, моча часто бываетъ густая и бѣлая, брюхо твердое и надутое; нерѣдко случаются побужденія на рвошу, при которыхъ весьма много мокрошны

изли-

изливается въ ротъ. Худой бываетъ признакъ, еспѣли изо рта будетъ выходить дурной запахъ и приключится сухопная лихорадка, соединенная съ поносомъ. Еспѣли чахлоспъ сопряженна будетъ съ сухопною лихорадкою, и моча выпѣкаетъ красная, пламеннаго цвѣта; но еспѣли она происходить будетъ отъ червей или погрѣшностей въ діетѣ; то весьма удобно вылѣченна бытъ можетъ.

§ 410. *Усѣчье или Алисская болѣзнь* естъ припадокъ уменьшеннаго или изпорченнаго тѣлеснаго питанія; или естъ неравное питаніе въ младенцахъ съ надупіемъ живота и опухолію членовъ, а наипаче съ нагбеніемъ спины или хребетной кости соединенное.

§ 411. Признаки оной сущъ, дряблоспъ мышечныхъ частей, мягкая кожа, слабоспъ въ тѣлѣ и неровное онаго питаніе; изкривленныя кости, а наипаче большая и меньшая берцовыя кости. Младенцы кашляютъ. Зубы у нихъ либо поздно выходятъ, либо шатаются, либо чернѣютъ и часто, согнивши выпадаютъ кусками. Младенцы, въ шаквомъ находясь состояніи, на бокахъ спать не могутъ, и все тѣло у нихъ иссыхаетъ съ надупіемъ живота.

§ 412. *Водная болѣзнь (hydrops)* естъ опухоль или раздутіе либо всего тѣла, либо низшихъ только частей, какъ то ногъ и брюха, копто

рое раздутье или опухоль происходитъ отъ нечиспой кровяной водяной влаги, или выпеченія оной изъ своихъ сосудовъ (*serum impratum vel extravasatum*).

§ 413. Водяная болѣзнь раздѣляется на всеобщѣнную и помѣстную или частную. Къ всеобщѣнной причисляется бѣлая мокрота (*leucophlegmatia*), повсемѣстная водяная болѣзнь (*anasarca*), брюшная водяная болѣзнь (*ascites*) и сухая брюшная водяная болѣзнь, барабаннымъ звукомъ или опухолью въ животѣ отъ въспровъ задержанныхъ произшедшею называемая (*tympanitis*). Къ помѣстной водяной болѣзни относятся головная водяная болѣзнь (*hydrocephalus*), глазная водяная болѣзнь (*hydrophthalmia*), налившѣея водою или водяные пузыри (*hydatides*), водяная шулятная или ятренная болѣзнь (*hydrocele*) и вѣтренная грыжа или кила (*hernia flatulenta*).

§ 414. Водяная болѣзнь повсемѣстною называется тогда, когда вся кожа на шѣлѣ обляпа бываетъ опухолью. Меньшая степень паковыхъ опухолей, копорая въ семъ случаѣ и мякче бываетъ, называется бѣлою мокротою (*leucophlegmatia*).

§ 415. Водяная болѣзнь брюшною называется (*ascites*), когда только брюхо и ноги пухнутъ, и стоячая вода скопляется въ животѣ.

§ 416. Сухая водяная брюшная болѣзнь бываетъ, когда брюхо на подобіе барабана разпятается такъ, что когда пожмешь оное пальцами, то едва слѣды оныхъ послѣ такого пожатія на животѣ изображены быть могутъ.

§ 417. Общія и главныя признаки водяной болѣзни суть: трудная одышка, жажда, малое выпеченіе мочи и припомѣ красной; ужасной взглядъ, перхота въ горлѣ или покашливаніе; ямы, остающіяся послѣ давленія по пѣлу пальцами, которыя мало по малу опять изглаживаются: Успалось (terror), сонливостью и отвращеніе къ пищѣ.

§ 418. Повсемѣльной водяной болѣзни признаки суть: кромѣ разслабленности въ пѣлѣ и наклонности ко сну, великая жажда, малое выпеченіе мочи, опухоль разлившаяся по всему пѣлу, которая первѣе ноги, послѣ бедра и наконецъ пахи и чрево даже до ложинки занимаетъ. Вода по большой части низпекаетъ въ мошонку, и пѣсноша бываетъ въ груди, умножающаяся при наступленіи ночи. У женщинъ пахи часто такъ раздуваются, что даже влагалище или рукавъ мапки выникаетъ наружу по причинѣ давленія воды. У нѣкоторыхъ такъ раздувается брюхо, что едва ноги свои видѣть бывають въ состояніи, и часто прикидывается медлѣнная лихорадка съ красноватою мочою.

§ 419. Брюшная водяная болѣзнь (§ 415) имѣетъ слѣдующія признаки: опухоль занима-етъ подвоздошныя части, раздувается брюхо, ятра распятиваятъ мошонку, разпухаютъ ноги, а лице, грудь и руки изпощаюцца, приклю-чаются кашель, жажда и великое дыханіе. Мо-ча имѣетъ много красной кирпичной осадки. Хотя и не много въ одинъ разъ выпекаетъ ной, по причинѣ густоты своей: сонливость, опчаяніе или поспа, непорядочное хопѣніе или желаніе пищи и воспаленіе дѣшпородныхъ члѣ-новъ.

§ 420. Сухая брюшная водяная болѣзнь мно-го имѣетъ знаковъ сходственныхъ со знаками по всепѣальной брюшной водяной болѣзни. Кро-мѣ оныхъ брюхо, будучи пожатъ пальцомъ, из-даетъ звонъ наподобіе барабана. Больные чрез-вычайно много икаютъ и весьма сильными вѣш-рами мучимы бываютъ. Тѣло въ вышнихъ ча-стяхъ начинаетъ сохнуть; больные часто бы-ваютъ удручаемы непрерывнымъ позываніемъ къ моченію, или спрадаютъ капельнымъ моче-меченіемъ (*stranguria*). Либо ощущаютъ боль въ мочевомъ спволѣ и около пупа. Опухоль брюха бываетъ великая, а наипаче около сердца и пупа. Лице и силы изпощаюцца и большой сохнеетъ.

§ 421. Всякой водяной болѣзни причина естъ поврежденное пищевареніе; запоры и засоренія
брюш-

брюшныхъ желѣзъ и внутренностей, и слѣдственно неворное опдѣленіе и испражненіе жидкихъ часпей; излишнее употребленіе вина на пощей желудокъ; чрезвычайно холодное пищье, въ шо особливо время, когда тѣло разгорячено и сильно нагрѣшо будетъ. Наконецъ все шо, что только производитъ медлѣнное теченіе крови, какъ шо: вязкія кушанья, излишнее употребленіе кофія, печаль, гнѣвъ и симъ подобные случаи.

§ 422. Сухой брюшной водяной болѣзни причинами бывають пища и пищье, раждающія въшпры; куда относятся всѣ огородныя, садовыя и мучныя вещества, также бобы, горохи, овощи, рыбы, закопченныя въ дыму мяса, жирныя, сладкія и ѣдкія. Оспановленіе или задержаніе гемороя и мѣсячныхъ кровоочищеній и все шо, что только поршитъ червообразное кишекъ движеніе, и приводитъ оныя въ слабость.

§ 423. Что принадлежитъ до предвѣщанія, какимъ образомъ имѣетъ кончиться водяная болѣзнь; шо должно примѣчать слѣдующее: шо есть должно еще надѣяться благополучнаго окончанія оной, еслили сухошная лихорадка еще съ нею не соединилась; еслили бываетъ одна только бѣлая мокрота (§ 412) (leueophlegmatia); еслили моча не красная и сырая; еслили внутренности не зашвердѣли, и лѣта еще молодыя; и еслили мышь или мокротной поносъ вдругъ съ самаго начала водяной болѣзни воспослѣдуетъ.

§ 424. Напротивъ худой знакъ бываетъ въ водяной болѣзни, еспли дыханіе бываетъ весьма прудное, и жаръ и великая жажда больного беспокоящъ; моча выпекаетъ весьма красная и мушная съ пенцаню осадкою. Еспли рожа на ногахъ и изпощительной приключится поносъ. Плачевнаго окончанія предзнаменованіе бываетъ, еспли на мочѣ показывается нѣчто стущеное, и моча имѣетъ голубой и зеленоватой цвѣтъ. Еспли на ногахъ учинится разрывъ такъ, что вода будетъ вытекать изъ онаго безъ уменьшенія брюшной опухоли и другихъ припадковъ. Еспли оная приключилась опъ худопользованной вязапелльными, сильнѣйшими лекарспвами чепверодневной лихорадки.

§ 425. Опносительно до предсказанія, какимъ образомъ окончиться имѣетъ сухая брюшная водяная болѣзнь, нижеслѣдующее примѣчать должно, что хорошей по еспь бываетъ признакъ, еспли внутренности еще не испортились тогда, когда воспослѣдовала брюшная водяная болѣзнь. Напротивъ плачевное по большей части бываетъ окончаніе оной, когда приключится оная брюшной мокрой водяной болѣзни. Еспли приключится опъ худопользованныхъ лихорадокъ, и еспли наконецъ приступятъ изсушеніе лица, сухопная или чахопная лихорадка (*febris hecticа*) и опухоль на ногахъ, соединенная съ сухимъ кашлемъ.

§ 426. Головная водяная болѣзнь (hydrocephalus) есть раздушіе всей почпи головы, съ раздашіемъ черепныхъ частей, произшедшей опѣ водяной влаги.

§ 427. Глазная водяная болѣзнь (hidrophthalmia) есть раздушіе глаза или вѣкъ, опѣ вытекшей изъ сосудовъ своихъ пасоки или кровяной влаги (lympa) около мышцъ и оболочекъ глазныхъ воспослѣдовавшее.

§ 428. Водю налившіеся пузыри суть водяныя круглыя пухлины, воспослѣдовавшія опѣ скопленія вытекшей изъ сосудовъ своихъ пасоки подѣ внѣшнюю, внутренности покрывающую, плевою.

§ 429. Мошонковая водяная болѣзнь или водяная грыжа (hydrocele), есть опухоль мошонки, опѣ изліявшейся изъ сосудовъ своихъ вѣ мошонкѣ влаги воспослѣдовавшая.

§ 430. Вѣпренная грыжа (hernia flatulenta) есть опухоль мошонки, опѣ находящейся вѣ оной вѣ великомѣ количествѣ вѣпровѣ происходящая.

§ 431. Еслили скопившаяся вода находится между подреберною плевою, грудобрюшною преградою и легкимѣ; то называется водяною грудною болѣзнію (hydrops pectoris). А еслили вода находится между околосердечною оболочкою и сердцемѣ; то называется сердечною водяною

болѣзнію (hydrops cordis.). Таковаго состоянія болѣзни весьма часно имѣютъ причиною произхожденія своего тузія олухохи (scirrh.).

§ 432. Къ припадкамъ изпорченнаго сокооспавленія принадлежатъ еще желтуха (icterus) пакъ называемая желтая и черная, и глисты или черви.

§ 433. Когда бѣлошная глазная оболочка, лице, грудь и вся поверхность кожи обьяшое будупъ желтымъ цвѣтомъ; по таковая болѣзнь называется желтою желтухою; а еспѣли желшой цвѣтъ перемѣнился на черной; по черною.

§ 434. Причины желтухи суть засоренія желчныхъ сосудовъ, оспановленіе опдѣленія и испражненія желчи въ печемкѣ; оспановленіе почечуя и мѣсячныхъ кровочищеній, гнѣвъ, непорядочное себя содержаніе, или худое наблюденіе діешы и непомѣрное употребленіе крѣпкихъ напипковъ.

§ 435. Чемъ болѣе перемѣняется желшой цвѣтъ на черной, тѣмъ болѣзнь опаснѣе спановишся. Худой еспѣ знакъ, когда моча бываетъ весьма сырая и черная, или еспѣли прикинется безпрерывная лихорадка, или таковая болѣзнь приключишся въ спаросши,

§ 436. Червей или глистовъ находятся раные виды: какъ то, естъ околопупошныя глисты, обжорами, также и волосатиками называемые (comedones vel cripiones), копорые естъ не что иное, какъ весьма маленькiя живошныя, около пупа въ младенческихъ шѣлахъ находящiяся, имѣющiя шѣло, длинной хвостѣ, и круглые выкапившiеся глаза имѣющiя. Глисты собственно такъ называемые, копорые сущъ длинные круглые черви. Глисты широкiя или пыквеобразныя, по причинѣ то естъ вида похожаго на пыковныя сѣмяна такъ называемыя (vermes cucurbitini), каковаго вида сущъ тясмеобразныя или лоскiя глисты (teniae), копорыя сущъ весьма длинныя и тонкiя и весьма коленчатыя, многiя то естъ имѣющiя коленца или стiбы. Аскариды или проходные черви (ascarides), похожiя на черви находящiяся въ сыру, и копорыя находяшся въ проходѣ и проходной кишкѣ.

§ 437. Глисты причиняютъ вредъ шѣлу, пожирая пипашельной сокъ; почему онѣ производяшъ голодъ или великое желанiе ѣсть, блѣднось въ лицѣ, слабось въ шѣлѣ, запорѣ, или поносѣ. Рѣзъ въ кишкахъ, почесоту въ ноздряхъ, надупiе и швердось брюха, чернонемочные припадки, судороги и гнилыя лихорадки.

§ 438. Къ припадкамъ поврежденныхъ натуральныхъ дѣйствiй принадлежатъ еще припад-

ки испражняемыхъ и неиспражняемыхъ матерій: почему припадки испражняемыхъ матерій суть изпорченныя или поврежденныя дѣйствія, силою копорыхъ испражняются тѣ матеріи, копорыя совсѣмъ не должны было испражняться, какъ то кровь въ мужескомъ полѣ, или копорыя хотя и должны было испражняться, но въ большемъ испражняются количествѣ, нежели въ натуральномъ состояніи, какъ то иногда случается со слюною, мочою, и мѣсячными кровями. Или естъли бываетъ испражненіе не надлежащими путями: напр. когда оспанавливаются мѣсячныя кровошѣченія и кровь послѣ оспановленія оныхъ извергается рвою, либо когда не испражняются въ приспойное время, но или скороспѣшно, или закоснишельно; какъ напр. непорядочное мѣсячное кровопеченіе въ женскомъ полѣ, и роды, прежде девяти мѣсяцовъ случающіеся.

§ 439. Почему къ припадкамъ испражненій, когда испражняются тѣ матеріи, копорыя совсѣмъ не должны было испражняться, или когда испражненіе производится необыкновенными путями, относящаяся рвота, желчная болѣзнь, или слезаніе желчью мокротное и сухое (cholera); кровохарканіе (hæmoptysis), кровавая жаркотина и кровавой потъ.

§ 440. Рвота естъ чрезбѣспеснвенное изъ желудка и двенадцатипудимовой кишки испражне-

ніе чрезъ ршѣ. Сіе испражненіе бываетъ либо мокротное, либо желчное, либо кровавое. Происходитъ же оное отъ раздраженія либо пище-пріемнаго горла, хотя бы по производимо было вѣшнимъ какимъ либо въ каналы оныя ввалившимся шѣломъ, либо приспавшею къ горпани склизью, причиняющею раздраженіе, либо отъ непомѣрнаго наполненія желудка, распягивающаго преестпешвеннымъ образомъ волокна онаго, либо отъ поспоронней ѣдкой и вязкой матеріи, находящейся въ желудкѣ, либо отъ непорядочнаго движенія жизненныхъ соковъ, отъ возрѣнія на какой либо предмѣшѣ, или отъ предспавленія мерзительной матеріи произходящаго: либо отъ непорядочнаго круговоропнаго движенія шѣла, либо отъ шакого движенія, какое бываетъ въ карепѣ и на корабляхъ: или отъ причиненія великой раны головы или желудка.

§ 441. Мокротная желчная болѣзнь (cholera) есть сильное испражненіе ршомъ и проходомъ соединенное съ весьма сильною болью и весьма сильными мученіями.

§ 442. Сухая желчная болѣзнь есть частное изверженіе вѣшровъ ршомъ и низомъ.

§ 443. Кровохарканіе (hæmoptysis) есть испражненіе цвѣшной или алой крови изъ рша, кашлемъ производимое, кошорое предполагаетъ разорваніе

рваніе весьма мелкихъ сосудовъ въ духодвижныхъ каналахъ или легкомъ, причиненное либо большимъ движеніемъ шѣла или крови; либо спояніемъ оспрой и ѣдкой маперіи, либо весьма холоднымъ пишьемъ, употребленнымъ вдругъ послѣ разгоряченія шѣла, либо многокровіемъ (plethora).

§ 444. Кроровая харкопина, естъ изверженіе крови, соединенной со склизью и безъ кашля, копорая харкопина производитъ отъ разорванія мелкихъ сосудовъ въ зѣвахъ, возпослѣдовавшаго отъ ѣдкой маперіи или чрезвычайнаго сопрясенія оныхъ, напр. во время сильнаго сморканія или рвопы.

§ 445. Кроровой потъ такъ какъ весьма рѣдкой случай имѣетъ причиною произхожденія своего весьма сильную тоску, производящую отъ спрахъ скоропостижной или насильственной смерти, сильное спѣсненіе внупреннихъ большихъ сосудовъ и расслабленіе конечностей оныхъ, по причинѣ оспановишагося или уменьшеннаго впечатенія жизненныхъ соковъ.

§ 446. Припадки изпорченнаго испражненія, а особливо великаго, когда по естъ шѣ маперіи, копорыя хотя должны было испражняться, однако испражняются въ большемъ количествѣ, нежели бываетъ въ естественномъ состояніи (§ 438); сущъ смяотеченіе или частое плюнованіе (ptyalismus), отръжка, великой потъ, флюсъ

ИЛИ

или насморкъ (catharrus), мытъ или мокротной
 поносъ (diarhœa), чрезвычайное мочеиспечение или
 истощеніе отъ мочи (diabetes), избытокъ мо-
 лока, чрезвычайное теченіе мѣсячныхъ кровей,
 чрезвычайное очищеніе родильницъ или чрезвы-
 чайное теченіе кровей, послѣ родовъ у женщинъ
 случающееся (lochia nimia).

§ 447. Слишкомъ теченіе (ptyalismus) есть большее
 изверженіе слюны, нежели въ естественномъ со-
 стояніи; которое происходитъ либо отъ
 острой и ѣдкой соли, а наипаче отъ употребленія
 ррпупныхъ лекарствъ, либо отъ избытка кровяной
 влаги или пасоки, либо отъ держимыхъ въ ротѣ
 острыхъ веществъ, либо отъ засоренія желѣзъ,
 находящихся въ брижейкѣ.

§ 448. Опрыжка (gastrus) есть громкое и ча-
 стое изверженіе вѣспровъ или воздуха изъ рта;
 опрыжка происходитъ отъ сильнѣйшаго сжима-
 нія желудка, происходящаго отъ употребленія
 раждающихъ вѣспры, или одувающихъ кушань-
 евъ, отъ раздражительной оспроты, либо отъ
 употребленія холоднаго пища и протпуженія
 желудка.

§ 449. Великой потъ происходитъ либо отъ
 преизбыточествующаго количествва водяноспи
 въ крови, либо отъ сильнѣйшаго движенія пѣ-
 ла и пеплопы, либо отъ понкихъ и лепу-
 чихъ солей, либо отъ еудорожнаго сжатія
 все

всей системы или связи чувствительныхъ жилъ.

§ 450. Насморкъ (catarrhus) есть большое припечение водяности кровяной вязкой, или соленой къ такой чашпи, въ которой также производится испражнение естественнымъ образомъ кровяной водяности (ferum), или мокроты (pituita). Налр къ легкому, зѣвамъ и воздрямъ. Произходитъ же оной либо опъ споячей вязкости въ конечныхъ сосудахъ, либо опъ наружной спужи, копорю сыворотка или водяность въ испражнительныхъ сосудахъ сгущается; либо опъ водяной худокровности и худосочности (cacochimia ferofa).

§ 451. Поносъ есть частое и многое испражнение кала, съ водяностию соединеннаго; производитъ же оной либо опъ преизбыточества водяности въ крови; либо опъ находящихся ѣдкихъ солей въ какой либо вязкой массѣ, и производящихъ запоры въ кишкахъ или препонкахъ млеконосныхъ сосудахъ и желѣзъ; либо опъ слабости и дряблости кишечныхъ волоконъ и желѣзъ.

§ 452. Мочепечение или незадержаніе мочи (diabetes) есть такое разрушеніе или разжиженіе кроваваго состава, копорымъ кровь перемѣняется въ водяность и мочю извергается вонъ. Производитъ же оное опъ изпорченности въ почкахъ, либо опъ ѣдкихъ и немного сѣрчистыхъ и невязкихъ солей.

§ 453.

§ 453. Преизбыточество молока въ сосцахъ грудницыю называемое производитъ какъ опъ избылія питапельныхъ частей, такъ и спросенія и разположенія волоконъ, составляющихъ сосцы.

§ 454. Чрезвычайнаго печенія мѣсячныхъ кровей причиною бываетъ либо чрезвычайное разжиженіе крови, производимое умноженіемъ щелочныхъ и сѣрныхъ солей, либо засореніемъ кровеносныхъ сосудовъ и другой какой либо внутренности, либо многокровіемъ.

§ 455. Чрезъ очищеніе родильницъ (lochia) разумѣется изпражненіе крови изъ влагалища матки послѣ родовъ. Чрезъ непомѣрное же очищеніе родильницы разумѣется большее изверженіе крови изъ маткина рукава, нежели какъ должно было въ естественномъ состояніи. Причиною таковой чрезвычайности бываетъ либо поврежденіе матки, при опредѣленіи дѣтскаго послѣда или младенческаго мѣша учиненное, либо дряблоспъ и расслабленіе, матку составляющихъ, волоконъ.

§ 456. Далѣе къ припадкамъ изпражнений, когда по естѣ по испражняется вонъ изъ пѣла, что совсѣмъ не должно было испражнялся, относящая еще кровотеченія, чрезвычайной лочечуи; сырой лоносъ, бѣтворастворенной лоносъ, кровавой лоносъ, и грыжа, гонорея, или теченіе ломотной матеріи, доброй и злой или ядовитой.

§ 457.

§ 457. Кровотечение (hemorrhagia) есть большее вытекание крови, ноздрами ли, низомъ ли или дѣшгородными членами. Произходитъ оное либо отъ преизбыточества крови и непомѣрнаго стремленія оной; либо отъ разслабленія частей стѣнокъ, чрезъ которыя оное бываетъ изпражнение, либо отъ засоренія другой какой либо благороднѣйшей внутренности, напр. почекъ, кишекъ, или брыженки, кишки то есть соединяющей плевы.

§ 458. Чрезвычайной геморрой или почечухъ (hemorrhoides nimiae) есть вытекание въ весьма великомъ количествѣ крови изъ золотыхъ жилъ или прохода; геморрой приключается по болѣйшей части отъ засоренія вѣшней воронной жилы, сжатія сосудовъ около прохода и отъ наполненія крови тѣскими солями.

§ 459. Сырой поносъ (coeliacus) есть изпражнение полусваренной и вонючей пищи низомъ. Такого припадка причиною бываетъ либо недоспадокъ въ желудочномъ растворѣ или сокѣ, либо вязкость острая и сѣрчислая, и слѣдственно преждебывшее невареніе желудка (§ 399. dyspepsia).

§ 460. Естественесваренной поносъ (lienteria) есть изпражнение низомъ кушаньевъ, какъ въ разсужденіи цвѣта, такъ и запаха и натуральнаго ихъ состоянія неперемѣненныхъ. Приключается припадокъ таковъ либо отъ совершеннаго засоренія

и заваловъ желудочныхъ желѣзъ, либо отъ земляныхъ часпицъ, въ желудочномъ распворѣ въ великомъ количествѣ содержимыхъ, отъ чего распворъ оной дѣлается неспособенъ къ размягченію, раздробленію и варенію пищи.

§ 461. О кровавомъ поносѣ (dysenteria) будемъ говорить въ ученіи о воспалительныхъ лихорадкахъ или горячкахъ.

§ 462. Бѣлая женская (fluor albus) есть изпражненіе вязкой склизы изъ влагалища мапочнаго: приключается она отъ меланхолической лихоспи и худосочной мокрошы (§ 358); копорой засариваются желѣзы, и проливаютъ вязкую спекловидную, а не водяную мокрошу; либо отъ сидячей жизни, либо отъ разположенія къ чахопкѣ и часпыхъ выкидышевъ.

§. 463. Злая и заразительная бѣлая всегда имѣетъ причиною печенія своего любоспраспную болѣзнь.

§ 464. Добрая или благая грыжа (gonorrhoea benigna) есть почпи непрерывное выпеченіе маптеріи изъ спвола; впрочемъ безъ всякаго ощущенія удовольствія и швердтнія дѣшороднаго члена. Произходитъ она отъ слабоспи волоконъ, пешушью головку (caput gallinaginis) соспавляющихъ. Слабость же оная произходитъ либо отъ сильного сопрясенія пѣла; либо отъ

чрезвычайно частаго спраспеудовлестворенія, либо опѣ разслабленія помянутыхъ часпей.

§ 465. Заразительная злая грыжа (gonorrhoea maligna) естъ изверженіе гноиспой, ѣдкой и вонючей матеріи изъ спвола, соединенное съ великою болью. Приключается паковой злой ломошной матеріи печеніе, либо опѣ нечиспаго сѣмянн, либо опѣ плашья, либо опѣ лежанія на нечиспыхъ постеляхъ, либо опѣ прикосновенія къ зараженной часпи, либо опѣ кормилицы, фряношною болѣзнію зараженной.

§ 466. Печеночное теченіе, иначе утробныхъ поносомъ называемое (fluxus hepaticus), естъ испражненіе низомъ жидкости, похожей цвѣсомъ на мясной щелокъ или на шу воду, въ которой мыюшъ мясо: причиною онаго бываетъ либо легкое разѣденіе кровеносныхъ сосудовъ, либо чрезвычайное разширеніе соко-опдѣлительныхъ пропковъ, либо онѣмѣлое или параличное состояніе оныхъ въ вышнихъ кишкахъ, либо опѣ поврежденія какой либо внутренности, жидкость свою изливающей въ кишки.

§ 467. Къ припадкамъ испражненій относятъ ся особливо еще пѣ, когда паковыя испражненія не въ надлежащее время, и ненадлежащимъ порядкомъ производятся. Куда принадлежатъ непорядочное мѣсячныхъ кровей теченіе, выкидышъ, скоролослѣшныя роды и ночныя оскверненія.

§ 468

§ 468. *Непорядочныхъ мѣсячныхъ кровей теченіемъ* (*menfes inordinati*) называется пошѢ припадокѢ, когда урочное кровоочищеніе у женщинѢ изѢ матки, не по прошествіи чепырехѢ недѣль, но либо ранѣе, либо позже возвращается. Причины пому сущѢ: либо погрѣшности вѢ содержаніи, копорыми кровь или сгущается, или разжиживается; либо чрезвычайно ослабѣвшія волокна составляющія матку, либо слабостѢ послѣдовавшая послѣ родовѢ, либо рана вѢ маткѢ, либо ушибѢ матки, либо еспественное упробы кѢ пому разположеніе.

§ 469. *Выкидышъ* (*abortus*) естѢ изверженіе зародыша или плода изѢ матки прежде семи мѣсяцовѢ. Причиною онаго бываетѢ либо еспественное опшорженіе опѢ матки дѣпскаго мѣста, и слѣдспвенно разорваніе или засореніе сосудовѢ между маткою и дѣпскимѢ мѣстомѢ находящихся; либо разслабленіе волоконѢ маточнаго опверстія. Что все по большей части опѢ спраха или гнѣва, сильнаго паденія, прежде бывшихѢ трудныхѢ родовѢ производшѢ и причиняешѢ сжаніе или судороги вѢ маткѢ. Также опѢ сильныхѢ проносныхѢ лекарствѢ, опѢ сильнаго плясанія и непрерывнаго поносу.

§ 470. Выкидыша признаки бывающѢ: когда беременныя женщины ощущающѢ легкое подираніе по кожѢ морозомѢ и холодѢ во внѣшнихѢ

часпяхъ шѣла, приключается пнягошипельная и какъ бы давящая боль въ поясницѣ, копорая послѣ мало по малу, или какъ говорящѣ, лоступлительнымъ образомъ къ дѣпороднымъ членамъ, ко крещу, вихреду, и наконецъ даже до лопатокъ проспирается; наконецъ выпекаетъ изъ упробы вода, подобная мясному щелоку; либо появляется изъ машки скипѣвщияся кусочками извергающаяся кровь и дѣпородныя часпи зябнушѣ, послѣ чего нерѣдко на претій день извергается плодъ.

§ 471. *Скорослѣлые роды* (partus præcox) еспѣ нечпо иное, какъ изверженіе зародыша прежде девянаго, но по прошествіи шестаго мѣсяца. Причины оныхъ супѣ шѣ самыя, чпо и выкидыша.

§ 471. *Ночное оскверненіе* (pollutio nocturna) еспѣ изпеченіе сѣмями во время сна пропивѣ изволенія больного. Изпеченіе сіе соединенно бываетъ либо съ чувствованіемъ нѣкопорого щекотанія, возспаніемъ дѣпороднаго члена и сладоспраспнымъ сновидѣніемъ, либо случается безо всякаго ошущенія оныхъ. Еспѣли оскверненіе ночное бываетъ безъ причиненія какого либо удовольствія; по сіе знакомъ бываетъ либо чрезвычайной сѣмянной жидкости, либо слабости сѣмянныхъ пузырьковъ; либо сѣрной оспропы, или большаго ошверспія и раздспія опдѣлишельныхъ яспренныхъ сосудовъ.

§ 473.

§ 473. Припадки задержанныхъ испражняемыхъ мащерей супъ дѣйствія напурѣ уменьшенныя или совсѣмъ испребленныя; когда то есть, либо совсѣмъ не испражняется, что должно было испражняться въ естественномъ состояніи, либо опдѣленіе и испражненіе въ меньшемъ бываетъ количествѣ, и при томъ съ болью, либо безъ боли. Сюда принадлежатъ силеніе при испражненіи, запоръ, боль въ подвздошной кишкѣ, остановленіе мочи, трудное вытеченіе мочи, занятіе мочи или мочерѣзъ, уменьшеніе очищенія родильницъ и слаблѣй или нутряной почечуи или геморой.

§ 474. Силеніе при испражненіи (*tenesmus*) есть болѣзненное сжиманіе мышцы, сжимающей проходъ, которое происходитъ либо отъ раздражающей оспропы, либо отъ проходныхъ червей (§ 436.); чѣмъ останавливаемо бываетъ испражненіе желудка.

§ 475. Запоръ (*alvus obstata*) происходитъ либо отъ спѣсненія кишекъ, либо отъ весьма зашвердѣлаго калу, по причинѣ малаго употребленія пищи; либо отъ недовольнаго движенія и сухаго разположенія шѣла.

§ 476. Подвздошнокишечная болѣзнь или рѣзъ во вздохахъ (*ileus*) есть весьма сильной запоръ желудка, соединенной съ чрезвычайно

въ кишкахъ болѣю и рвою. Естѣли калѣ извергается рвою; по паковой припадокъ называется Лапински (*miserere*), а по Руски ѡй, котораго причиною естѣ самое большее сжатіе кишекъ, соединенное съ воспаленіемъ желудка и кишекъ; либо чуждая какая либо маперія находящаяся въ желудкѣ; какъ-то: ядѣ, или весьма сильно зашверделой калѣ.

§ 477. *Задержаніе мочи или мочеостановленіе* (*suppressio urinae*) происходитъ опѣ мяса, выросшаго въ мочеиспускательныхъ путяхъ, либо опѣ камня, находящагося въ почкахъ, въ мочепочникахъ или сѣмъ, либо опѣ великаго количества мокроты въ мочевомъ пузырьѣ скопившейся; либо опѣ разслабленности мочевого пузыря и мочеиспускательныхъ путей.

§ 478. *Трудное мочеиссеченіе* (*dyuria*) естѣ остановленное мочи изсраженіе, въ которомъ моча съ трудомъ и съ ощущеніемъ жару при моченіи изсражается.

§ 479. *Занятіе мочи* (*ischuria*) естѣ совершенное задержаніе мочи.

§ 480. *Мочевѣзъ или капельное мочеиссраженіе* (*stranguria*) естѣ высеченіе мочи каплями, соединенное съ болѣю и непрерывнымъ мочиться желаніемъ. Причины всѣхъ сихъ припадковъ уже выше показанны сущъ подѣ § 475.

§ 481. Когда испражняемая матерія бываетъ чрезвычайно вязка и густа; по опѣ того при-
ключается *слаблѣй геморой* (hemorrhoides saxes); а когда разслабнушѣ сосуды, влаги шихо и
медлинно печь будушѣ, и наконецъ учиняш-
ся острыми и ѣдкими; по опѣ того производяшѣ
шакѣ называемая *подздошная болѣзнь*, или
и *лохондрія*, *маточная болѣзнь*, *цынготная бо-*
лѣзнь или *скорбунѣ*, и *членосоставная болѣ*.

§ 482. *Илохондрія* или *болѣзнь ео вздохохѣ*
(malum hypochondriacum) естѣ собраніе и соедине-
ніе премногихѣ пагубныхѣ припадковѣ, копорые
опѣ изпорченнаго состоянія желудка, или засо-
ренія кровевозвращной ворошней жилы и бры-
жейныхѣ сосудовѣ производяшѣ.

§ 483. Признаки (§ 462) оной имѣются сіи:
когда по естѣ больные чувствуюшѣ во вздохахѣ,
вѣ груди или запылкѣ досадную и какѣ бы шя-
гучую боль; когда лѣвой бокѣ надувается и
пухнешѣ, когда больные мучимы бываютѣ шяго-
пѣніемѣ и шѣснопою вѣ груди, позывѣ на ѣду
имѣюшѣ иногда непорядочной, а иногда весьма
сильной, и часто плюющѣ, ощущающѣ жарѣ вѣ
желудкѣ, не домогающѣ, спраждушѣ прясеніемѣ
сердца, круженіемѣ вѣ глазахѣ и пронзаемы бы-
ваютѣ печалью. Наконецъ когда моча у нихѣ
вышекаетѣ прозрачная и шонкая.

§ 484. *Маточная болѣзнь* или *истерика*
(malum hystericum) естѣ соединеніе у женскаго по-

ла многихъ припадковъ, которые произхождение свое имѣютъ отъ поврежденной мапки.

§ 485. Признаками (§ 484) оной бывающъ свѣденія жилъ или судороги въ чревѣ (fratē) и другіе премногіе припадки, сходственные съ припадками ипохондрической вышеписанной болѣзни. Когда подвздошная болѣзнь бываетъ въ самой великой степени: дыханіе приходитъ очень прудное, называемое одышкою (dyspnea); захватываніе духа, или задушеніе, обморокъ, лишеніе голоса и глубокой сонъ. Нѣкоторыя женщины безъ всякаго біенія жилъ и дыханія долгое время лежатъ, будучи поражены, на подобіе умершихъ; нѣкоторыя прежде пришествія вновь болѣзни ощущаютъ изъ живота въ верхъ и даже до самой горпани какъ бы возходящій нѣкій клубъ или шаръ.

§ 486. Скорбѣта, скорбѣтъ или цынготная болѣзнь (scorbutus) есть большая степень подвздошной болѣзни или ипохондри, признаки которой суть разслабленность и сокращеніе силъ; боль въ головѣ и всѣхъ почти мышцахъ; сонъ больше разслабляющій, нежели возстановляющій сокращенныя силы. У спраждающихъ скорбѣтою всѣ члены бывающъ какъ бы ушибленны, ноги и десны по большей части разпухаютъ вкупѣ съ шатаніемъ зубовъ, вонью изо рта и блѣднымъ, смуглымъ и желтымъ цвѣтомъ лица.

На

На кожѣ у шаковыхъ появляются красныя, черныя синія пяпина.

§ 487. Членосоставная боль или ломъ въ членахъ (arthritis) есть оспановленіе оспдѣляемой, или по большей часпи испражняемой нечиспой кровяной водяности въ членосоставныхъ желѣзахъ.

§ 488. Членосоставной боли (§ 485) бывающѣ разные виды: когда на примѣрѣ ощущается боль въ членосоединеніяхъ сѣдалищной кости: по тогда называется *утиномъ* или крестцезвою *болѣзнію* (*talum ischiadicum*): а еспли боль находится въ ручныхъ членосоединеніяхъ и связяхъ; по называется *членосоставною ручною болѣзнію* или хирагрою (*chiragra*). Еспли боль свирѣпспвуетъ въ ножныхъ членахъ, вкупѣ съ опухолью и зардѣніемъ оныхъ; по именуется *членосоставною ножною болѣзнію* или подагрою (*podagra*). Есплиже весьма долго продолжающаяся боль, однакожъ не безъ нѣкопорого переспаванія, будещъ ощущаема въ колѣнахъ; по называется *коленосоставною болѣзнію* или гонагрою (*gonagra*).

§ 489. Членосоставной боли (§ 487) признаки суть: разслабленность и пятгоспъ въ членахъ, соединенная съ непорядочнымъ ознобомъ и послѣдующимъ жаромъ, сильною болью и жаждою, безпокойспвіемъ или поскованіемъ, и весьма часпо съ запоромъ желудка; также поперяніемъ позыва

на їду, и прудностію дыханія. Наконецъ проходящѣ оныя пѣгучія и шерзакующія или грызучія боли, копорыя ночью увеличивающіяся и большую причиняющѣ гореспѣ, сѣ умноженіемъ опухоли и зардѣніемъ.

§ 490. Меньшей степенѣ членосоставной боли называется *ломотою*, *стреляніемъ*, *простудою* или *ревматизмомъ* (rheumatismus), копорой бывающѣ, естли нечиспая сыворошка и кровяная водяноснѣ оспанавливающіяся въ какой либо часпи пѣла, а наипаче въ шейныхъ, ручныхъ, лопашковыхъ и бедренныхъ мышцахъ: чпо бывающѣ причиною, чпо кровавыя сосуды разпѣгивающіяся, а чувспвительныя жилы прижимающіяся; опѣ чего большее бывающѣ пасоки и оспрой водяноспи кѣ спраждуцимъ часпямъ припѣченіе.

§ 491. Опѣ изпорченнаго кровопворенія производящѣ слѣдующіе поврежденныхъ жизненныхъ дѣйспвій припадки, шо естѣ *немогущество изсєргать такого сѣмени*, копорые могло бы оплодородить спѣлое женское яичко, чпо разумѣнѣ должно о мужескомъ сѣмѣни, и *неллодіе*, или *немогущество матернее зачинать въ утробѣ младенцевъ*.

§ 492. Кѣ изпорченному сокопворенію и производящей опѣ шого порчи соковъ опносящіяся еще: *короста*, шо естѣ многія ранки на кожѣ, причиняющія зудъ или досадную почесотпу. Так-

же *цынга* (*stomachase*) или мягкая опухоль на деснахъ, соединенная съ шипаніемъ и нечистоплюю зубовъ и вонью или вонючимъ дыханіемъ изъ рта.

ГЛАВА IV.

О припадкахъ жизненныхъ дѣйствій и о причинахъ cadaго поврежденнаго дѣйствія.

§ 493. Къ припадкамъ поврежденныхъ жизненныхъ дѣйствій относяща, слабой или сильной пульсъ или бѣненіе жилъ; большая или меньшая теллота въ тѣлѣ, трудное дыханіе, одышка, тяжкое дыханіе и захватываніе духа или удушливой насморкъ.

§ 494. Сильнаго бѣненія жилъ причинами бывающъ многокровіе, большая въ крови упругость (*elasticitas*), желчная худосочность, глисты, камни, находящіеся въ мочевомъ пузырьѣ и оспрая споячая кровь. Уменьшенное же или слабое бѣненіе происходитъ отъ прошивныхъ первымъ причинъ.

§ 495. Большая теллота въ тѣлѣ или жаръ происходитъ отъ желчной худосочности, черножелчности и умноженія бѣненія жилъ. Уменьшеніе же теплоты приключается отъ
мо-

мокрошной или задумчивость наводящей влаги, или спужи.

§ 496. *Трудное дыханіе* (*dyfpnea*) есть досадное и скорое; однако не громкое издохновеніе воздуха. Произходитъ же оное либо опѣ чрезвычайно теплаго, либо чрезвычайно тяжелаго, либо чрезвычайнаго легкаго воздуха, либо опѣ воздуха, сѣрыми парами наполненнаго, либо опѣ воспаления легкихъ, грудобрюшной преграды и другихъ часпей грудныхъ или чревныхъ; либо опѣ засоренія духодвижныхъ каналовъ, ожестпелости и засыханія оныхъ, либо опѣ легкопныхъ ранъ, какъ-то случается въ *чахоткѣ*, или *нарывѣ въ легкомъ* (*in vomica pulmonis*), либо опѣ шугихъ поухолей (*ascirrhus*), либо опѣ горбапоспи, водяной болѣзни, а наипаче повсепѣальной и брюшной. Либо опѣ сращения подреберной плѣвы съ легкимъ, либо наконецъ опѣ уязвленія и пронзенія груди.

§ 497. *Одышка* (*asthma*) есть трудное и громкое издохновеніе, копорой то есть одышки кромѣ вышесказанныхъ (§ 496.) причинъ бываещъ еще причиною спѣсненіе горпаннаго хрящика, и самой горпани или воздухопроходнаго канала.

§ 498. *Тяжкое дыханіе* (*orthopnea*) есть таковое болѣзнующихъ состояніе, въ копоромъ они, опасаясь, чшобы не задушились, не на постпели

лежа, какъ здоровые люди, но стоя прямо и разинувши ротъ, вбирающъ въ себя воздухъ таковой припадокъ, кромѣ вышеписанныхъ причинъ (§ 496.), иногда имѣетъ еще причиною произхожденія своего чрезвычайное расслабленіе легочныхъ волоконъ, а иногда и сжатія оныхъ.

§ 499. *Захватываніе духа или удушливой насморкъ* (catarrhus suffocativus) происходи́тъ либо отъ изпражненія въ великомъ количествѣ вязкой мокроты или гнойной матеріи, либо отъ воздуха, съ сильнымъ спремленіемъ входящаго въ легкія, либо отъ опухоли горпанесоспавныхъ частей, либо отъ сильного воспаленія, сведенія и сжатія зѣвовъ и рта.

ГЛАВА V.

О припадкахъ животныхъ дѣйствій и вопервыхъ о припадкахъ пяти чувствъ человѣческихъ.

§ 500. Къ припадкамъ вышнихъ чувствъ, а наипаче къ осязанію относится уменьшенное чувство осязанія, куда иринадлежитъ онѣменіе или нечувствіе (stupor). Къ чувству осязанія иринадлежитъ вообще боль, или печальное ощущеніе, производящее отъ чрезвычайнаго раз-

разпятиванія волоконъ; къ чувству уничиженнаго осязанія въ особенноспи: *онѣмѣніе* (anesthefia), или *недвижимость* какого либо члена, копорой причина единспвенно соспоишѣ въ уничиженномъ движеніи жизненныхъ соковъ.

§ 501. *Виды боли (§ 500)* вообще сущѣ слѣдующія: *боль въ головѣ и животѣ*; *зудъ* или *лчесота*, *жаръ въ желудкѣ*, *изгага* и *околосердечная боль* или *щемога*.

§ 502. *Зудъ* или *лчесота* (pruritus) еспѣ чувствованіе частію сѣ непріятноспію, частію сѣ пріятноспію соединенное на кожѣ, произходящее опѣ ѣдкихъ солей, либо весьма колкихъ живошныхъ, на кожѣ находящихся и раздражающихъ чувспвенножилыныя или нервныя волокна.

§ 503. *Жаръ въ желудкѣ* (ardor ventriculi) еспѣ чувствованіе сильной шеплошы вкупѣ сѣ досадною засухою въ ушпы и желѣзахъ пищепріемнаго горла, копорое иначе еще называепся *изгагою* или *лечѣею* (soda).

§ 504. *Околосердечная боль* или *щемога* еспѣ сильная боль, подѣ ложкою оцуцаемая, или въ споронѣ спины пропиволоженной ложкѣ, соединенная сѣ труднымъ дыханіемъ и шоскою или шощнопою въ груди. Причиною оныхъ бываепѣ ѣдкая соль, раздражающая и сжимающая грудобрюшную преграду.

§ 505.

§ 505. Къ припадкамъ чувствъ осязанія или прикосновенія, называемаго *пожеланіемъ* или *аллетитомъ*, а наипаче испребленнаго, принадлежащій, *ѣстехотѣніе* или *отвращеніе отъ пищи*; уменьшеннаго, *мерзливость* или *позывъ на рвоту*; изпорченнаго, *аллетитъ* или *позывъ на ѣду*, называемой *лесѣимъ* или *обжорствомъ*, чрезвычайная жадность и неправильное и необыкновенное желаніе *ѣствъ* (рѣса).

§ 506. *ѣстехотѣніе* или *отвращеніе отъ пищи* (anorexia) естъ опныашіе аппетита или позыва на ѣду. Причинами онаго бывающіи либо въ великомъ количествѣ находящаяся въ пѣтѣ влажность, либо желчь и мокрота, либо земляныя вещества, въ великомъ количествѣ употребляемыя; либо злая преждебывшая лихорадка, либо слабость жизненныхъ духовъ, печаль, забота и разныя попеченія.

§ 507. *Мерзливость* или *тошнота* (nausea) имѣетъ причиною приключенія своего густую мокроту и другую влагу, весьма въ великомъ количествѣ находящуюся въ желудкѣ; также острую и желчную матерію и опврапипельныя или мерзипельныя вещества.

§ 508. *Обжорство* (appetitus caninus) естъ чрезвычайная жадность къ ѣдѣ, соединенная вкупе съ рвотою, причиною котораго бываетъ чрезвычайной жаръ или чрезвычайная теплота; а наипаче

паче оспрой и ѣдкой желудочной разпворѣ. Есть-
лиже когда волокна желудка по причинѣ чрезвычайнаго количествѣ употребленныхъ кушаньевъ
разптягиваются; то оныя по прошествіи крап-
каго времени опять спягиваются и сжимаются
и наконецъ производяшъ рвоу.

§ 509. Чрезвычайная или ненасытная жад-
ность (bulimus) есть самая большая степень по-
зыва на ѣду, со слабостию и обмороками соеди-
ненная.

§ 510. Необыкновенное или изторченное же-
ланіе яствъ (pica) есть хотѣніе неприличныхъ
человѣческой природѣ веществъ: на пр. когда
какой больной или больная пожелающъ уголья,
мѣлу, кожи и пр. Особливой причины сего при-
падка еще и по сіе время неизслѣдовано. Впро-
чемъ весьма имовѣрно, что таковая чрезвычай-
ность въ апетитѣ производяшъ опѣ слабого
разсудка и испорченного воображенія и многокро-
вія.

§ 511. Кѣ припадкамъ чувствѣ видѣнія или
зрѣнія, а наипаче лишеннаго, принадлежатъ: тем-
ная вода въ глазу; кѣ припадкамъ уменьшен-
наго видѣнія, слѣлота; кѣ припадкамъ изпор-
ченнаго или поврежденнаго видѣнія принадлежатъ
близорукость, зоркость или дальновидность,
ночное видѣніе или куриная слѣлота, и косо-
или разноглазость.

§ 512. *Темная вода въ глазу* (*gutta serena*), есть совершенное лишеніе зрѣнія. Произходитъ же оное отъ совершеннаго засорѣнія зрительной чувствительной жилы.

§ 513. *слѣпота или неясное видѣніе* (*caligo*) приключается либо отъ того, когда опустился и осадетъ роговая глазная плева, либо когда между прозрачными глазными частями будутъ находиться темныя и непрозрачныя матеріи.

§ 514. *Близорукость* (*myopia*) есть забивчивое обозрѣніе либо всѣхъ, либо отдаленныхъ только предметовъ. Причины близорукости суть либо большая кривизна или плоскость кристаловидной влаги въ глазу, либо меньшее и ненадлежащее разстояніе оной же влаги отъ сетчатой оболочки; человекъ, страдающій такою припадкою, называется *близорукимъ* (*myops*).

§ 515. *зоркость или дальновидность* (*praesbiopia*) есть забивчивое обозрѣніе или видѣніе всѣхъ близкихъ предметовъ. Причинами такового недостатка бывающъ уменьшеніе поперечника въ кристаловидной влагѣ, либо умноженіе разстоянія отъ сетчатой оболочки. Человекъ имѣющій таковой недостатокъ въ зрѣніи, называется *зоркимъ* (*praesbiops*).

§ 516. *Ночное видѣніе* (nyctalopia) естъ немогущество или неспособность распознавать предмѣты въ вечеру или днемъ. Первой припадокъ происходитъ отъ чрезвычайнаго сжатія или спѣсненія зѣницы, а послѣдній отъ чрезвычайнаго разширенія оной. Но естъли оба сіи припадки случаются вмѣстѣ; то такового приключенія виною бываетъ недвижимость, и слѣдственно ожестѣлость волоконъ, составляющихъ зеницу.

§ 517. *Разноглазость или косоглазость* (strabismus) естъ такое изпорченное направленіе и впереніе глазъ, которымъ линѣи, изъ глаза чрезъ зѣницу проведенныя, не на обозрѣваемомъ предмѣтѣ, но въ другомъ мѣстѣ или и нигдѣ не соединяются; почему не пріобыкшимъ къ зрѣнію предмѣты въ таковомъ слѣчаѣ показываются всегда двоякими. Причиною оной бываетъ неравное дѣйствіе мышцъ, производящее отъ чрезбесповѣннаго спроенія глазъ, или піянсва и гнѣва.

§ 518. Къ припадкамъ чувства слышанія, а особливо лишеннаго, принадлежатъ: *глухота или ослышаніе*, уменьшеннаго, *оглухлость*, изпорченнаго слышанія, *звизніе въ ушахъ*.

§ 519. *Ослышаніе или глухота* (barusia sine obauditus) приключается, когда слуховой проходъ совсѣмъ запертъ или заваленъ бываетъ отъ
рожде-

рожденія ли, или сѣры находящейся въ ушахъ, либо когда лавириѣ наполнятся нечиспопами; или когда въ слуховой нервѣ или чувствительной слуховой жилѣ сдѣлаешся запоръ.

§ 520. *Оглулости* (dyscisia) причины имѣются сіи: лишеніе, по естѣ или недоспашокъ внѣшняго уха, нѣкоторое засореніе и запоръ въ слуховомъ проходѣ, ожестѣлоспъ и недвижимость тимпанной или слуховой перепонки, либо срощеніе слуховыхъ косточекъ. Нечиспопа, находящаяся въ тимпанной полости, либо въ лавириѣ, либо нѣкоторой запоръ въ Еспахіевомъ проходѣ и слуховой чувствительной жилѣ.

§ 521. *Звизнія въ ушахъ* (tinnitus aurium) причиною бываетъ дрожащее движеніе или прясеніе воздуха, находящагося въ тимпанной полости, либо раздраженіе слуховыхъ мышцъ, которыми оныя къ дрожливому побуждаемы бываютъ движенію.

§ 522. Къ припадкамъ движенія, а наипаче лишеннаго, относятся, *параличъ или онѣмѣніе*; къ припадкамъ уменьшеннаго движенія, *усталости или расслабленности*; къ припадкамъ непорядочнаго и изпорченнаго движенія относятся такіа движенія, которыя произходятъ либо отъ мышцъ и другихъ волоконъ преестпественнымъ образомъ къ сжиманію побу-

ждаемыхъ, либо отъ прерыванія какоголибо естественному движению мѣщающаго, либо отъ неравнаго жизненныхъ соковъ впечатлѣнія.

§ 523. *Онѣмѣніе или параличъ* (paralysis) есть нечаянное лишеніе или отнятіе движенія какой либо части тѣла; причиною котораго бываетъ либо засореніе чувствительныхъ жилъ, либо прерываніе какое либо, находящееся въ членосоединеніи.

§ 524. *Полуонѣмѣніе или полуотнятіе* (hemiplegia), есть видъ паралича, когда то есть одна сторона головы или лица онѣмѣютъ или параличемъ поражены будутъ,

§ 525. *Усталость или разслабленность въ тѣлѣ* (lassitudo), происходитъ либо отъ недостатка крови и жизненныхъ соковъ, и слѣдственно отъ изощренія жизненныхъ духовъ; либо отъ излишне употребляемаго кровопусканія, либо отъ огустѣлости крови и преизбыточества оныхъ.

§ 526. Отъ побужденія къ сжиманію волоконъ по причинѣ уменьшенія упругости крови, производящаго отъ кислоты или вязкости, находящейся въ крови, происходитъ ознобъ или холодъ: котораго меньшей степенью содроганіемъ или озлобленіемъ (horror), а самой болѣею цепенѣніемъ или околѣніемъ (rigor), называется.

§ 527.

§ 527. Отъ раздраженія, и слѣдственно поощренія къ сжиманію мышцъ, а наипаче двучервной мышцы, производитъ *эвванге* (*oscitatio*). Мышцы, находящіяся на груди, производятъ чиханіе, когда чувствительныя жилы въ ноздрахъ раздражены бывающъ.

§ 528. Когда вязкая и оспрая матерія находится въ воздухоносныхъ каналахъ, дыхательномъ горлѣ и верхнемъ отверстіи онаго; по мышцы грудныя купно съ мышцами воздухоносныхъ каналовъ производятъ кашель (*tussis*), или громкое изхожденіе воздуха изо рта, безъ изверженія или съ изверженіемъ вязкой или гноистой матеріи и сопряженіемъ груди. Откуда явствуетъ, что кашель бываетъ двоякой, *мокротенъ* по естѣ и *сухъ* (*humida et sicca*).

§ 529. *Икота* (*hugultus*) или громкое втягиваніе въ легкое воздуха вкупѣ съ попрысканіемъ надчервной спороны, производитъ отъ всѣхъ мышечныхъ желудочныхъ и преградобрюшныхъ волоконъ, либо отъ оспры, находящейся внутри, либо отъ чрезвычайнаго наполненія желудка.

§ 530. Объ икотѣ относительно до произшествія оной слѣдующее примѣчаніе должно, что по естѣ икота всегда худая и опасная бываетъ, естли прикидывается она къ оспрымъ лихорадкамъ, а наипаче горячкамъ, бреду, во-

опаленію печенки, головнымъ ранамъ и великимъ пролипіямъ крови. Также когда приключается послѣ принятія проносныхъ и рвотныхъ лекарствъ: или прикинешся къ рожѣ, кровавому поносу, мышу и членосоставнымъ болямъ.

§ 531. Опъ препящствія какого либо, дѣлающаго помѣху естественному движенію (§ 524.), производитъ трелетаніе или трясеніе сердца и хрилога.

§ 532. Трясеніе сердца (*palpitatio cordis*) есть дрожливое и чрезвычайно сильное движеніе или бѣненіе онаго. Причиною сердечнаго трясенія бываетъ полипъ, каракатица или кровавой закипъ въ сердцѣ, или большихъ сопредѣльныхъ ему сосудахъ (*polypus*). Чрезвычайно же сильное трясеніе сердца производитъ опъ чрезвычайно великаго разжиженія крови или раздраженія сердца, причиняемаго какою либо оспрошею или червями, находящимися въ пѣлѣ или сердцѣ.

§ 533. Хрилоты (*taeae*) причинами бываютъ, либо чрезвычайная вязкость или чрезвычайное количество мокроты, расслабляющей мышечныя волокны воздухоносныхъ каналовъ, такъ что оныя поизволенію челоуѣка сжимаются бывающіе не въ состояніи; либо спѣсненіе мышцъ, горпанъ расширяющихъ, либо разѣденіе черпалообразныхъ дыхательнаго горла хрящей (*erosio cartilaginum arylarum*)

§ 534.

§ 534. Опѣ ослабѣвшаго впечатенія чрезѣ чувствительныя жилы жизненныхъ духовъ въ мышцы производяшѣ: дрожаніе или трясеніе, епилептическія или черномощныя движенія, и шееслиная скорченность или судорога.

§ 535. Черномощныя движенія (motus epileptici) суть сильныя чрезѣспешивенныя членовъ корченія, копорыя либо опѣ неравнаго и сильнаго впечатенія жизненныхъ соковъ и раздраженія мышцъ; либо опѣ оспропы во всемѣ тѣлѣ находящейся и раздражающей чувствительныя жилы, производеніе свое имѣютѣ.

§ 536. Шееслиная скорченность или сведеніе (opisthotonus) приключается, когда ѣдка раздражающая матерія находится около или въ распятивающихъ и прямодержавшихъ шею и спину мышцахъ и оныя раздражаетѣ пакѣ, чпо опѣ того тѣла назадѣ изкрывляеишя. Сюда пакже опнесѣ можно сляченность или переднестороннюю скорченность, одебелѣлость и плясаніе Вишову иступану.

§ 537. Сляченность или переднесторонняя скорченность (emprostotonus) называется, когда судороги пакѣ скорчиваютѣ тѣло на переднюю сторону, чпо колѣна приводяшя къ головѣ.

§ 538. Одебелѣлость или всеѣлесное околѣніе (tetanus) естѣ потѣ судороги видѣ, ко-

гда пропиводѣиспвующія мышцы всего тѣла или одного и другого члена ѣдкою матеріею вкупѣ и равно такѣ раздражаемы бывающѣ, что тѣло отѣ того цепенѣетѣ и пружится.

§ 539. *Плясаніемъ Витову истукану* (cho-гга fancti viti) называется пошѣ припадокѣ, когда жизненные соки въ разные мышцы неправильно впекающѣ, отѣ чего скорыя и плясательныя членовѣ всего тѣла производящѣ движенія *).

в) Сію болѣзнь назвать плясаніемъ Витову истукану, которая есть нечто иное, какѣ судорога своего рода, буйственнымъ плясаніемъ называемая, врачѣ возбѣили случай отѣ того, что нѣкоторые идолопоклонники Шведскіе, почитавшіе Витова истукана, котораго они за особливаго мужа почитали, вѣрили, что естѣли спраждающіе сею болѣзнію люди принесутѣ дары въ жертву Витову истукану въ Маѣ мѣсяцѣ, и предѣ капищемъ онаго, каковое капище, говоритѣ Звингерѣ, находилось близѣ Равенбурха въ Швеціи, будутѣ плясать до шѣхѣ порѣ, пока надутѣ предѣ онымъ ницѣ на землю; то цѣлой годѣ бывающѣ свободны отѣ такой своей чудесной болѣзни. Впрочемъ болѣзнь сію не должно почитать за одно съ парансизмомъ, также плясательною болѣзнію, которая происходитѣ отѣ угрызенія Апульскаго паука, называемаго параншуда, которой паукѣ во время песьихѣ или жар-

жаркихъ дней наподобіе бѣшеной маленькой сѣ-
бачки, здѣсь сусликомъ называемой, успрямляет-
ся и прыгаетъ на людей, угрызая оныхъ смер-
тоноснымъ иногда образомъ. Пользуется болѣзнь сія,
то есть шарангизмъ, музыкою.

§ 540. Какъ чувствва, такъ и движенія вкупѣ
опнимаются и уничпожаются въ алоплекейи,
ударѣ или пострѣлѣ, въ околѣлости и ла-
ду ей болѣзни или черной немочи.

§. 541. Опниашіе или уничпоженіе всѣхъ
чувствъ и движеній самопроизвольныхъ назы-
вается ударомъ или пострѣломъ (apoplexia).

§ 542. Признаками удара бывають круженія
въ глазахъ и головѣ, звенѣніе въ ушахъ, давя-
щія боли, въ запылкѣ ощущаемыя, и внезапное
поверженіе на землю безъ чувствъ и движеній.

§ 543. Пострѣла причиною бываетъ скоро-
поспигное оспановленіе движенія жизненныхъ
соковъ въ головномъ или продолговапомъ мозгѣ,
хотя бы оспановленіе оное причинено было излі-
вшеюся изъ сосудовъ своихъ въ великомъ коли-
чествѣ влагою во впадинѣ черепа, или произ-
ходило отъ нечаяннаго сжатія и сокрушенія
черепа же, или отъ поврежденія и запора, напр.
причиненнаго скипѣвшеюся (полипною) кровя-
ною машерією, опорвавшеюся изъ сердца и ввали-
вшеюся во внутреннія сонныя боевыя жилы, или

опѣ оспрой и ѣдкой маперіи, сжимающей мозговья волокна, или весьма мѣккія біющіяся жилки въ корковомѣ шю еспѣ сосудисномѣ мозговомѣ сущесствѣ, либо опѣ худаго разположенія желудка.

§ 544. *Околѣлость* (catalepsia) еспѣ нечаянное или скоропоспѣжное опныпіе чувствѣ и движеній, соединенное съ одебѣлѣлоспію членовѣ пакѣ, чшо все шѣло въ такомѣ соспояніи, въ какомѣ оно захвачивается, вдругѣ околѣваетѣ.

§ 545. Причиною такого припадка по болѣшей вѣроятности бываетѣ оспроша, споячая въ мышцахѣ и оныя равномѣрно раздражающая, и слѣдственнѣ болѣшее припеченіе жизненныхѣ соковѣ въ мышцы.

§ 546. *Черная немочь или ладучая болѣзнь* (epilepsia) еспѣ совершенное скоропоспѣжное лишеніе всѣхѣ чувствѣ какѣ внѣшнихѣ, пакѣ и внутреннихѣ, съ непорядочнымѣ движеніемѣ или киданіемѣ и коверканіемѣ всего шѣла и членовѣ. Черная немочь раздѣляется на *самосушественную* и *приладочную* (inindipathicam et symptomaticam dividitur.).

§ 547. Черной немочи признаками бываютѣ, еспѣли обдержимые сею немочію люди чувствуютѣ прясеніе сердца, захвачиваніе духа, и воркопа-

копанія въ животѣ, большой палецъ стибаетъ въ кулакъ, повергаются на землю съ опверзтыми глазами, возбуждается скрежепаніе зубовъ, дыханіе учиняется громкимъ, которое нерѣдко соединено бываеиъ съ крикомъ и сильнымъ попрясеніемъ всего пѣла, пѣло все одѣбелѣваеиъ наподобіе спануи, и пѣна изо рта со свистомъ выпекаеиъ.

§ 548. Падучей болѣзни причиною бываеиъ ошрая и ѣдкая машерія, также кислая, однако не весьма вязкая, сжимающая какъ конечноспи чувствиншельныхъ жилъ, такъ и мозговья волокна. Также душевныя спраспи, а наипаче гнѣвъ и испугъ или нечаянной спрахъ.

§ 549. Въ обмо окѣ и обмоираніи какъ чувспва, такъ и всѣ почпи движенія вкупѣ опнимаются.

§ 550. Обморокъ (lupothimia) еспъ скоропоспижное, однако краикое сокрушеніе силъ (eslyfis § 394), до шакой спепени дошедшее, что шеплоша, біеніе въ жилахъ и чувспва вмѣспѣ умаляются.

§ 551. Обмоираніе (fupcore) называеиъ, когда біеніе въ жилахъ и шеплоша въ одно и то же время едва оиуцаемы бываюиъ, а чувспва и движенія совсѣмъ опнимаются. Опкуда явспвуеиъ, что обмоираніе еспъ боленая спепень обморока (§ 550).

§ 552.

§ 552. Сюда также отнести можно *замирание* (*asphixia*), которое есть нечто иное, какъ совершенное уничтоженіе біенія въ жилахъ и дыханія, такъ что больные, находясь въ такомъ состояніи, никакихъ не имѣютъ признаковъ ославшейся жизни.

§ 553. Къ судорожнымъ припадкамъ также еще отнести можно: *домоваго или тѣноту съ груди*, либо *захваченіе духа во снѣ* (*incubus*), которое есть нечто иное, какъ судорожное сведеніе и сжатіе грудныхъ мышцъ, во время сна приключающееся; отъ чего послѣдуютъ чувствованіе давленія или тѣпленія и опьянія могущества говорить бѣжашъ или кричашъ.

§ 554. Причиною сего припадка кажется бываетъ засореніе нервъ, отъ мозга происходящихъ, которое если бы находился вкупѣ съ опрото матеріею; то причиняетъ обезсиліе прочимъ членамъ такъ, что они двигаются бывающъ не въ состояніи.

§ 555. Припадки *великаго сна* называются *сонливыми или сылительными припадками*, каковыя суть: *спачка или сонливость, наклонность ко сну, безсонная спачка или ко сну наклонность, безчувственной сонѣ, и преестественная сонливость, или безпросылной сонѣ.*

§ 556. *Слачки или сонливости (somnolentia)* причиною бываетъ разсыпаніе и изпощеніе жизненныхъ соковъ трудами и чрезвычайнымъ бдѣніемъ, или многокровіе.

§ 557. *Наклонность ко сну (coma somnolentum)* есть шатчайшій сонъ, отъ котораго хотя и могутъ пробуживаться больные, и отвѣщать на вопросы, однако опять впадаютъ въ сонъ.

§ 558. *Бессонная слачка или сонливость (coma vigil)* есть непрерывное склоненіе ко сну съ превеликими сновидѣніями и бросаніемъ или качаніемъ тѣла соединенное. Сей припадокъ по большей части прикидывается къ оспрымъ и желчнымъ лихорадкамъ и часто предзнаменуетъ воспаленіе въ головѣ и судороги. Чемъ сильнѣе бываетъ лихорадка, чемъ скорѣе выпекаетъ моча и чемъ спарѣе люди паковой обѣяпы бываютъ болѣзнію, тѣмъ съ большею она опасностію соединена бываетъ.

§ 559. *Безпросылной или холодной сонъ (lethargus)* есть весьма глубокой сонъ, съ забвеніемъ и непрерывною лихорадкою соединенный. Въ семъ припадкѣ больные просятъ пить, держатъ въ рукахъ сосудъ, и однако позабываютъ напиться, и что говорили, не помнятъ. Весьма худой бываетъ признакъ, если къ сему сну
дро

дрожаніе членовъ и холодной пошъ на лицѣ при-
ключающся.

§ 560. *Безчувственной сонъ* (sagus) есть та-
кое опягощеніе сномъ, отъ котораго больные
никакимъ образомъ и самыми даже боденіями
(per rixtum) едва пробуживающся могутъ. Почему
таковое сонное опягощеніе должно почищать
первымъ спенемъ паралича или удара.

§ 561. Всѣхъ сихъ припадковъ причинами бы-
ваютъ весьма слабое и оспановленное движеніе
жизненныхъ соковъ, а наипаче многокровіе, мок-
ропной и водянистой кровяной соспавъ, силь-
ное воспаленіе какой либо внушренности и спо-
яніе крови въ головѣ, отъ великаго къ оной
припеченія влагъ. Чтожъ касается до безсон-
ной сонливости; шо причиною оной бываетъ
либо прееспешивное движеніе крови, либо
птягчайшее гдѣ либо учинившееся воспаленіе.

§ 562. Ощущеніе коловращенія неподвижныхъ
предмѣтовъ, соединенное съ нѣкоторымъ немо-
гушесствомъ содержатъ себя въ прямомъ соспо-
янніи или положеніи, называется *круженіемъ въ*
глазахъ (vertigo), котораго причиною бываетъ
неровное и произвольное припеченіе жизнен-
ныхъ соковъ больше въ глазныя, нежели другія
тѣлесныя мышицы; либо раздраженіе или не-
ровное засореніе, либо страхъ и боязнь смерти.

§ 563. Опныяте, шакъ какъ и уменьшеніе памяти называется забвеніемъ (oblivio). Причиною копорого бываешъ либо уменьшенное, либо умноженное и усиленное движеніе или спремленіе жизненныхъ соковъ, духами называемыхъ.

§ 564. Къ припадкамъ воображенія и испорченнаго разсудка принадлежащъ въ особливости сновидѣніе, ночеходство или хожденіе во снѣ, меланхолія или задумчивость, сумасшествіе, человеконенавидѣніе, слезелитіе, дружелюбіе и лесе неистовство. Всѣ сіи припадки сущъ виды сумозбродства.

§ 565. сновидѣнія (insomnia) бывающъ, когда во время сна опсупспивующія вещи представляющъся душѣ, шакъ какъ присупспивующія.

§ 566. Ночеходцы или лунатики (postambuli) называются шѣ люди, кои во время сна безчувственно ходящъ. Причины припадка сего должно искащъ въ сильномъ воображеніи, и спремительномъ движеніи жизненныхъ соковъ, въ многокровіи и крѣпкомъ сложеніи шѣла,

§ 567. Меланхолія или задумчивость (melancholia) естъ бредъ или сумасшествіе безъ лихорадки, но со спрахомъ и печалію соединенное.

§ 568. Припадками задумчивости почипающъ печаль, опчаяніе и любоуединеніе; шакже
когда

когда больные удобопреклонны бывають ко гнѣву и разпочишельности. Мало мочатся, опрыжки имѣють гнилыя, не много спятъ, лице имѣють блѣдное, ѣдятъ и пьютъ съ превеликою жадностію и слабое имѣють біеніе въ жилахъ.

§ 569. *Сумасшествіе (mania)* есть самая большая степень брѣда безъ лихорадки. Сумасшедшіе совсѣмъ неистовствуютъ и безумствуютъ. Раздирають на себѣ одѣяніе и разцарапываютъ плѣхо. Ведутъ жизнь безъ всякаго стыда. Иногда кричатъ, и по прошествіи пароксизма или присудствія болѣзни, бывають спокойны и печальны; имѣють наклонность ко спеси со скрежепаніемъ зубовъ; мало спятъ, крѣпость силъ имѣють чрезестественную, и сносятъ спужу съ чрезвычайно перпеливостію.

§ 570. *Человѣконенавидѣніе (misanthropia)* есть то сумасшествіе, когда люди не могутъ перпѣть ни своихъ пріятелей, ни ближнихъ своихъ ни другихъ людей, и когда ни пріятными, ни пропивными вещами не бывають прогаемы.

§ 571. *Слезелитіе (aphichantropia)* есть сумазбродство безъ лихорадки, когда то есть больные проливаютъ слезы безъ всякой очевидной причины.

§ 572. *Дружелюбіе или дружеудаленіе* (arantrophia) бываетъ, когда люди или больные не только удаляются своихъ друзей или родственниковъ, но и вмѣстѣ защищаютъ непристойныя вещи, и однимъ впечатлѣніемъ весьма долгое занимающія время.

§ 573. *Бѣшенство псѣе* (rabies canina) есть неистовство, отъ угрызенія бѣшеной собаки происшедшее, отъ котораго угрызенія человѣкъ споль много уклоняется отъ естеспвеннаго состоянія своего, что всѣ дѣйствія шѣлдвиженія производитъ того животнаго, отъ котораго онъ уязвленъ. Видъ псѣяго бѣшенства есть *боязнь отъ воды* (hydrophobia), отъращеніе по есть отъ жидкостей и яснаго свѣта. Въ семъ случаѣ брѣдъ или безуміе по большей части девятого дня послѣ угрызенія начинается вкупѣ съ лихорадкою.

§ 574. Самою ближайшею или сущеспвеннѣйшею причиною сихъ припадковъ бываетъ преестпеспвенное крови разположеніе, производящее поль необыкновенныя движенія, но въ чемъ бы состояло таковое крови преестпеспвенное разположеніе, еще и по сіе время не извѣдано.

ОТДѢЛЕНІЕ II.

ГЛАВА VI.

О лихорадкахъ вообще.

§ 575. Лихорадка (febris) есть немогущество или неспособность производить дѣйствія надлежащимъ образомъ, которое происходитъ съ начала лихорадки отъ меньшаго, а послѣ отъ большаго стремленія жидкостей. Лихорадка всегда начинается ознобомъ и холодомъ, за которымъ послѣдуютъ жаръ и преестественное бѣненіе въ жилахъ.

§ 576. Во всѣхъ лихорадкахъ находится преестественное состояніе въ крови, которое естьли находится во всѣмъ кровяномъ составѣ, то отъ того происходитъ повсепѣлесная болѣзнь. Слѣдствіемъ лихорадки суть всеобщія болѣзни горячаго свойства.

§ 577. Припадки лихорадочные вообще считаются сіи: сперва то есть ощущается слабость во всемъ тѣлѣ, отнимаются позывы на ѣду, и духъ дѣлается неспособенъ къ отправленію обыкновенныхъ дѣйствій. Потомъ происходитъ сильное движеніе крови, отъ поверхности тѣла къ центру онаго устремляющееся, отъ чего, поелику, то есть, на поверхности тѣла меньшее бываетъ теченіе крови, ощущается
спужа

спужа или холодъ въ тѣлѣ, послѣ послѣдуетъ большее стремленіе крови отъ центра къ окружности тѣла, за копорымъ послѣдуетъ жаръ въ разное лихорадошное время и въ разной степени. Жажда бываетъ либо великая, либо не весьма великая. Наконецъ приступаютъ потношы, трудное дыханіе, потъ и перемѣна въ мочи опносительно до ея цвѣту и состоянія.

§ 578. Лихорадки раздѣляются на перемѣжающіяся и неперемѣжающіяся или безпрерывныя. Безпрерывныя опять раздѣляются на острыя, преострыя и весьма острыя, на медленныя и сукотныя или чахотныя.

§ 479. Къ перемѣжающимся (intermittentes febres) лихорадамъ относятся, ежедневная, тридневная, четверодневная и полутридневная лихорадки.

§ 580. Къ острымъ лихорадамъ относятся ежедневная, безпрерывная или простудная, флюсовая либо насморкная благая и злая лихорадки, тридневная и четверодневная безпрерывныя лихорадки; печеночная и почечная лихорадки и безпрерывная гнилая горячка.

§ 581. Къ преострымъ лихорадамъ принадлежатъ воспалительная или желчная лихорадка, жаба или воспаленіе въ горлѣ, колотье, воспаление легкаго и рожа.

§ 582. Къ весьма острымъ лихорадкамъ относящаяся, бѣшеная, съ воспаленіемъ мозга соединенная, лихорадка, преградогрудобрюшное воспаление, кровавой поносъ, воела, корь, красносыльная лихорадка, высылная лихорадка, и чума или прилиличная лихорадка.

§ 583. Медлительныя и сухотныя или чахотныя лихорадки (*lentæ & hecticæ febres*) собственно сущь медлительная и сухотная лихорадки.

ГЛАВА VII.

О Ежедневной лихорадкѣ.

§ 584. Ежедневною (*quotidiana*) лихорадкою называется та, которая по прошествіи 24 часовъ и слѣдственно всякой день съ ознобомъ и послѣдующимъ за онымъ жаромъ приходитъ. Такого рода лихорадка весьма рѣдко случается.

§ 585. Признаки ежедневной лихорадки (§ 582) сущь слѣдующія: ежедневная лихорадка по большей части приходитъ по утру съ великимъ холодомъ, чрезъ часъ мѣста вообще продолжающимся; при семъ случается мерзливостъ или тошнота, поднимается рвота, а иногда случается и поносъ. Приходитъ жаръ и превеликая жажда, боль въ головѣ, склонность ко сну, моча выпѣкаетъ сырая и мутная, имѣю-
щая

щая цвѣтъ на дигпронный похожей. Присупъ лихорадочный рѣдко долѣ седми часовъ продолжается и почпи обыкновенно оканчивается произшествіемъ въ великомъ количествѣ поща.

§ 586. Причинами ежедневной лихорадки пощипаются: желчная худосочность, вязкость на первыхъ пущахъ находящаяся, произшедшая отъ непорядочнаго наблюденія въ пищѣ и пищии и во всемъ содержаніи себя. Отъ чего наконецъ зараждается порча въ поджелудочной желѣзѣ, брижѣйкѣ и кишкахъ. Лихорадку пащковаго состоянія пащже причиняющъ весьма крѣпкія проносныя и рвошныя лекарсства, ослабляющія силу и крѣпость желудка.

§ 587. Чшо касается до предсказаній окончанія сѣя лихорадки; шю должно замѣшпшъ слѣдующее: шю ещѣ, чшо хорошіе бывающъ признаки, ещѣли всякой день присупъ и возобновленіе лихорадки совершенно оканчиваются; ещѣли при оканчиваніи преесшественнаго жару проливается пощѣ, и моча выпекаетъ въ болъшемъ количествѣ, дѣлающая на днѣ осадку, и ещѣли вдругъ, сѣ самага шю ещѣ начала приключишся рвопа или не болъшой мокропный поносъ. Напрошпвъ худые бпзающъ признаки, ещѣли не бываетъ ни рвошы, ни поносу; ещѣли сильный жаръ безо всякаго умаленія своего и безпрерывно продолжается; ещѣли ежедневная

лихорадка сдѣлалась изъ четверодневной; еспѣли силы уже испощены; еспѣли по окончаніи лихорадки, пошѣ хошя и выходяшѣ, однако изнеможеніе силъ и слабое и частное бѣненіе въ жилахъ одинаковы бывающѣ; еспѣли упошребляющѣ горячипельныя крѣпкія, а наипаче вяшпельныя и сѣ опіемъ приготовленныя лекаршва, опѣ чего больные впадающѣ въ худокровность, сухощу, и наконецъ получающѣ засореніе и завалы во внушренностяхъ.

ГЛАВА VIII.

О тридневной перемежающейся лихорадки или лихоманки.

§ 588. Тридневною перемежающеюся лихорадкою (tertiana intermittens) называется та лихорадка, которая по прошествіи 48 часовъ и слѣдственно чрезъ день, сѣ ознобомъ и послѣдующимъ за онымъ жаромъ нападаешъ, и по окончаніи своемъ опять возвращается.

§ 589. Припадками или признаками лихорадки сея почишающѣ, слабость во всемъ шѣлѣ, холодъ и цепенѣніе, которое часто до прясенія членовъ доходитъ; тягучая боль въ подшвицѣ, зѣвота, пошягоша и озябеніе, а наипаче рукъ и носа; синей цвѣшъ на ногтяхъ, опшящіе позыва на ѣду вкупѣ сѣ мерзливостію и

побужденіемъ на рвопу, боль въ головѣ, жаръ и шошнопа, лице рдѣющее и загорающее, біеніе въ жилахъ сильное и скорое, что одна-кожъ бываеѣ во время жару, послѣдовавшаго за ознобомъ; безпокойство и киданіе членовъ, жажда, копорая у нѣкоторыхъ людей бываеѣ даже и во время озноба. Трудное дыханіе; и наконецъ оканчиваніе лихорадки пролипіемъ поѣа.

§ 590. Причинами придневной лихорадки бываюѣ желчное худосочіе, холодное пиѣе, упоѣреѣаемое во время разгоряченія тѣла, а наипаѣе нечистой воды; сильныя душевныя движенія, какъ то: гнѣѣ, неѣорядочное сеѣа со-держаніе или наблюденіе діеѣы и проспуженіе.

§ 591. Что принадлежиѣ до предвѣщаній окончанія придневной лихорадки; то должно знаѣе, что знаѣи окончанія оной бываюѣ хорошіе, когда испраженія, какъ то рвоѣа, или поносѣ, и поѣѣ сѣ уменьшеніемъ жару надлежащимъ производяѣся образомъ, когда приключиѣся самопроизвольно великой желчной поносѣ, или сѣ желчію соединенныя испраженія желудка, и еѣѣли поѣѣ въ поѣѣ день, въ коѣорой не бываеѣ лихорадки, хорошо проливаеѣся и такимъ образомъ лихорадка совсѣмъ оканчи-ваеѣся. Напротиѣѣ худыя бываюѣ предвѣща-нія, еѣѣли приключиѣся чрезвычайная жадностѣ

или обжирство прежде, или послѣ приступа лихорадки, ешлы послѣдующія лихорадочныя возобновленія очевидно умножшся и усиливашся будущь.

ГЛАВА IX.

О четверодневной перемежающейся лихорадки.

§ 592. Четверодневною перемежающеюся лихорадкою называется (*intermittens quartana*) называется та, которая по прошествіи 74 часовъ, и слѣдственно на четвершой день, съ ознобомъ и послѣдующимъ за онымъ жаромъ опять приходитъ. Сія лихорадка бываетъ весьма упорна и не скоро излечима.

§ 593. Четверодневная лихорадка бываетъ либо простая, либо двойная или двойная. Простую описали мы въ § 594; а двойная (*duplex*) четверодневная лихорадка бываетъ тогда, когда въ теченіи четырёхъ дней, два раза приходитъ лихорадка, такимъ по есть образомъ, что каждой приступъ наблюдаетъ свое урочное и слѣдственно особое время, и приступы также соотвѣтствуютъ попеременно одни другимъ, а на третій день совсѣмъ не бываетъ лихорадки.

§ 594. Простой четверодневной лихорадки причины суть слѣдующія: такого рода лихорад-

хорадка нападетъ по большей части по полудни, которой предшествуетъ ослабленіе во всемъ тѣлѣ. Въ сей лихорадкѣ бываетъ помятость, боль въ головѣ и въ поясницѣ, поблѣднѣніе лица и ногтей, ознобленіе носа, рукъ и ногъ, холодъ и морозъ цѣлые два или три часа продолжающейся, поднимается рвота, либо бываетъ одно только побужденіе на оную; за чѣмъ послѣдуетъ сильной жаръ съ засухой во рту, боль въ голѣ и костяхъ съ круженіемъ въ головѣ и потемнѣніемъ въ глазахъ, каковъ по есть послѣдній припадокъ иногда цѣлые два дни продолжается. Во время прясенія лихорадки моча бываетъ шонка и водяниста, а въ прочіе лихорадочные дни бываетъ густа и дѣлаетъ осадку. Приступъ лихорадочный оканчивается не большимъ пролипіемъ поща.

Примѣчан. Внутрькостная боль (osteocorus), о которой мы выше упомянули, есть нечто иное, какъ глубокое и сотрясающее чувствованіе боли въ членахъ, а наипаче въ ногахъ, копорая боль какъ будто производить нѣкоторую тягость и давленіе въ костяхъ.

§ 595. Причинами четверодневной лихорадки бываютъ худосочность желчи и черно желчная; худосочность или худое вареніе желудка (cacochylia); порча по большей части въ какой нибудь внутренности, на прим печенчѣ, поджелудочной желѣзѣ или селезенкѣ, либо засо-

ренія и запоры въ оныхъ, наконецъ кислыя, вязкія и бродипельныя сырости, находящіяся въ шлѣѣ.

§ 596. Что четверодневная лихорадка хорошо кончится, то сіе можно узнатьъ изъ того, когда она приключится весною или лѣтомъ; когда нападетъ отъ непорядочнаго наблюденія въ пищѣ и пиіи, или отъ внутри вогманной коросты. Напротивъ худымъ бываетъ предзнаменованемъ, когда она приключается осенью, нападаетъ на старыхъ людей, или воспослѣдуетъ отъ употребленія весьма сильно дѣйствующихъ проносныхъ, рвошныхъ и вяззепельныхъ лекарствъ. Еслии будешъ находиться порча въ печенкѣ, поджелудочной желѣзѣ и селезенкѣ; еслии приключится великая жадность къ ѣдѣ прежде, или послѣ лихорадочнаго приступа, и наконецъ еслии перемѣнится она на ежедневную лихорадку.

ГЛАВА X.

О полутридневной лихорадкѣ.

§ 597. Полутридневная лихорадка (*semiteriana*), состоящъ изъ перемѣжающейся придневной и ежедневной непрерывной лихорадокъ, откуда явствуетъ, что таковаго рода лихорадка всякой день приходитъ,

§ 598.

§ 598. Признаки и припадки сея лихорадки суть слѣдующіе: лихорадка сія начинается со спужен и сжапымъ и тяжелымъ біеніемъ пульса, потомъ приходитъ великій потъ. Моча въ лихорадочный день выпекаетъ тонкая и сырая, послѣ лихорадочнаго нападенія, а на третій по есть день бываетъ гуще и цвѣтна; нѣкоторые больные сею лихорадкою претерпѣваютъ иногда совершенное помѣшательство въ умъ.

§ 599. Причины сея лихорадки суть: стоячая кровь въ брижейкѣ или пленѣ, соединяющей кишки, отъ кожораго стоянія крови прозходитъ воспаленіе. Также худое наблюденіе дѣтѣ, и сильныя проспуженія.

§ 600. Хорошіе знаки окончанія сея лихорадки бываютъ, естли она нападетъ весною, а покинетъ 9. 13. или 14 дня. Естли въ лихорадкѣ сей случится сукровичной и гнойной поносъ: напрошивъ худыя бываютъ предвѣщанія, когда послѣ нападенія сея лихорадки приступятъ рвоша и тошноша въ груди, безпокойствие и смущеніе духа, вкупѣ съ дрожаніемъ рукъ. Когда возпослѣдуетъ икоша, такъ какъ самой негоднѣйшій признакъ возпослѣдовавшаго въ благороднѣйшихъ внутренностяхъ воспаления.

ГЛАВА XI.

О Ежедневной безпрерывной или хорошей
простудной лихорадкѣ.

§ 601. Ежедневная безпрерывная лихорадка, которую древніе просто безпрерывною называли, и которая иначе называется *флюеною* или *простудною хорошою лихорадкою*, есть одна изъ острыхъ лихорадокъ, которая происходитъ отъ сыворощки или водяности и пасоки нечистой и въ весьма великомъ количествѣ находящейся въ крови, которая влага испражняется либо ртомъ, либо носомъ, либо воздухоносными каналами.

§ 602. Лихорадки сея признаки суть ниже-слѣдующія: простудная лихорадка приходитъ по большей части въ вечеру; которой предшествуютъ разслабленность во всемъ тѣлѣ, холодъ и спужа, слабость въ головѣ, зашвердѣніе желудка, или покрайнѣй мѣрѣ засуха онаго. Послѣ чего послѣдуетъ превеликой жаръ, соединенный съ жаждою, потнотою и щемотомъ около сердца, шруднымъ глотаніемъ и тягостнѣмъ въ груди. Въ вечеру жаръ еще болѣе умножается и пульсъ скорѣе ударяется, кашель бываетъ сильнѣе, но не съ большимъ извѣрженіемъ матеріи. Насморкъ въ носу (*coriza*) вкупѣ съ опхлѣваніемъ позыва на ѣду и бессонницею, по утру больной потѣетъ; моча вытекаетъ ша-
кая,

кая, какая бываетъ въ оспрыхъ лихорадкахъ; то есть, цвѣтомъ походитъ на померанцевой и дѣлаетъ осадку блѣдноалую (*roseopallidum sedimentum*).

§ 603. Причинами сея лихорадки (§ 600) почитаются худые соки, избыточество желчной и водяной или мокротной матеріи въ пѣлѣ, проспуженія послѣ сильнаго пѣлодвиженія и употребленія холоднаго пища случающіяся. Также все то, что оспанаавливаетъ испарину. Нечаянныя или внезапныя воздушныя перемѣны, брошенныя обыкновенныя кровопусканія. Вогнанная внутрь какая либо острая матерія, на пр. внутрь скрывшаяся короста и шелуди. Наконецъ тонкая и жгучая матерія, которая вселяется также въ желѣза чрезъ вбирание или втягиваніе скважинъ нашего пѣла. Откуда заключается, что флюсная или проспудная лихорадка часто бываетъ ловальнойю всеобщею и заразительною болѣзнію (*epidemicus & contagiosus morbus*)

§ 604. Что касается до того, какимъ образомъ оканчивается сія лихорадка; то должно знать, что добрая или хорошая проспудная лихорадка (*febris catharrhalis benigna*) сама по себѣ никакой опасности не имѣетъ, еслили пошѣ съ самаго начала лихорадки бываетъ великой, или мокротная и вязкая матерія либо харкопиною и сморканіемъ носа, либо низомъ испражняется, и когда моча, которая прежде была
тон-

шонкая и въ маломъ выпекала количествѣ, послѣ гуща и много испражняшья будещѣ. Напротивъ худые признаки имѣющѣ простудная лихорадка, когда она нападаетъ на ипохондриковъ, или подвздошными болѣзнями спраж-
дающихъ людей, въ коихъ и безъ лихорадки находяшья внупри спазмы или судороги и сведенія, или когда нападаетъ она на спраждающихъ запорами, и шѣхъ женщинъ, у коихъ пресѣклось теченіе мѣсячныхъ кровей: также и тогда бываетъ исполненна опасностей лихорадка сія, когда находится вкупѣ какое либо воспаленіе, или острая гнойная матерія, которая предозначаетъ гніеніе и скоро послѣдоващѣ имѣющее совершенное помертвѣніе (*phacelus*) спраждающихъ какихъ либо частей.

ГЛАВА XII.

О тридневной безлрерывной лихорадкѣ.

§ 605. Тридневная безлрерывная лихорадка (*tertiana continua*) есть видъ острыхъ лихорадокъ, которая имѣетъ не во все перемѣжающіеся, но нѣсколько послабляющіе свои приступы.

§ 606. Припадки сего горячки суть сіи: приступы лихорадочные на другой день послѣ нападенія лихорадки не во все уничтожаются, но
нѣ-

нѣсколько полько уменьшаются. Напр. засуха ощущается во рту съ жаждою и продолжается вкупѣ съ головою болью. На ѣду почти никакого не бываетъ позыва вкупѣ съ сильнымъ біеніемъ жилъ, жаромъ и уменьшеніемъ силъ. По прошествіи же 48 часовъ всѣ припадки опять возвращаются и умножаются.

§ 607. Причины сея лихорадки бываютъ шѣже самыя, что и придневной перемежающейся лихорадки (§ 588.), а различествуютъ оныя полько однимъ степенемъ на лр. въ сей лихорадкѣ болѣзненная матерія, возжигающая лихорадку, большому подверженна бываетъ окисанію и слѣдственно броженію. Всякія сильныя прѣспуды бываютъ также виною придневной непрерывной лихорадки.

§ 608. Что касается до предсказанія конца сея лихорадки, то надлежитъ вѣдать, что признаки окончанія ея тогда хороши бываютъ, когда по прошествіи нѣсколькихъ дней переѣнился лихорадка сія на придневную перемежающуюся лихорадку; напротивъ худое бываетъ явленіе, если изъ придневной перемежающейся лихорадки сдѣлается непрерывная.

ГЛАВА XIII.

О четверодневной безпрерывной лихорадкѣ.

§ 609. Безпрерывная четверодневная лихорадка (*quartana continua*) есть одна изъ острыхъ лихорадокъ, кошорая кажется яко бы имѣла приступы четверодневной перемѣжающейся лихорадки (§ 590). Однако не совсѣмъ перемѣжающейся, но только послабляющейся лихорадки имѣетъ приступы.

§ 610. Припадки четверодневной лихорадки сходствуютъ со многими припадками четверодневной перемѣжающейся лихорадки. Впрочемъ въ послѣдующій день не совсѣмъ унимаются, но только нѣкоторое имѣютъ послабленіе такъ, что рѣдко случается, чтобы больные не находились въ поспѣлѣ. Таковыя припадки суть: шрясеніе головы, соединенное съ болью, круженіе въ головѣ, неспокойной сонъ, засуха во рту, сильное біеніе въ жилахъ, мушная и густая моча съ осадкою. Впрочемъ всѣ сіи припадки не въ такой находящаяся степени, въ какой находящаяся въ томъ день, въ кошорой приходитъ лихорадка.

§ 611. Что касается до причинъ безпрерывной четверодневной лихорадки; то оныя различаются также однимъ токмо степенемъ отъ причинъ четверодневной перемѣжающейся лихорадки (§ 595) на лр. въ сей лихорадкѣ матерія, причинствующая

ющая ону бываетъ вязчѣе и густѣе, и засореніе въ какой либо внутренности бываетъ глубже, нежели какъ по случаю въ четверодневной переменяющейся лихорадкѣ.

ГЛАВА XIV.

О печеночной лихорадкѣ или воспаленіи въ печенкѣ.

§ 612. Печеночная лихорадка (*febris hepatica*) есть одна изъ острыхъ лихорадокъ, которая происходитъ отъ воспаленія печени, и рѣже прочихъ лихорадокъ случается.

§ 613. Припадки лихорадки печеночной (§ 612) суть слѣдующія: лихорадка сія начинается съ продолжительнымъ ознобомъ, за которымъ послѣдуетъ жаръ, скорое, острое и частое бѣненіе въ жилахъ, великая жажда, истощеніе силъ, прудное дыханіе, бессонница и беспокойство вкупѣ съ пягопишельною болью, правой бокъ занимающею такъ, что больные не бывающъ въ состояніи ложиться на правой бокъ. Въ воспаленіи печени кашель бываетъ сухъ съ зашвердѣніемъ желудка, или и насоящимъ запоромъ, во рту всегда находится засуха; моча съ начала выплекаетъ шонка и гуща, а на

четвертый или пятый день производитъ осадку.

§ 614. Причины печеночной лихорадки или воспаления въ печенкѣ суть сіи: спояніе по естѣ крови въ печенкѣ, которое производитъ либо опѣ многокроя, либо опѣ избылія худыхъ желчныхъ соковъ и слѣдственно скопленія крови къ печенкѣ или порчи и заваловъ въ оной; излишнее употребленіе сильно вяжущихъ лекарствъ; остановленныя крови испражненія, на пр. остановившейся почечуй, употребленіе горячительныхъ напитковъ и внезапныя проспуженія.

§ 615. Что касается до предсказанія конца печеночной лихорадки, то должно примѣчать, что сія болѣзнь благополучно пройдетъ, естѣли на 7, 9 или 11 день великой прольется изъ пѣла потъ. Напротивъ худое предозначается окончаніе оной, когда лихорадка съ большимъ свирѣпствуетъ неистовствомъ; также когда надуется правой бокъ, то естѣ правая подвздошная сторона, когда потъ изливаясь будетъ водяной, моча испражняясь сѣпла и прозрачна, или и мутная, однако не дѣлающая никакой осадки; наконецъ самой худой бываетъ признакъ, когда поднимется черная рвота, на подобіе бузиннаго взвару; пошому что таковое явленіе озна-

означаетъ либо учинившейся нарывъ на поверхности печени, либо уже возпослѣдовавшее помертвѣніе оной. Чѣмъ наипаче справедливо бываетъ въ то время, когда ко рвотѣ прикинепся еще икопша съ нечаяннымъ уменьшеніемъ всея болѣзни.

ГЛАВА XV.

О почечной лихорадкѣ или воспаленіи въ почкахъ.

§ 616. Почечная лихорадка (*febris nefritica*) есть видъ острыхъ лихорадокъ, которая обыкновенно соединяется съ воспаленіемъ почекъ (§ 69 и 92).

§ 617. Припадки почечной лихорадки имѣются сіи: лихорадка почечная нападаетъ на больныхъ съ болью, ощущаемою въ чреслахъ или поясницѣ, а наипаче въ лѣвомъ боку съ чувствованіемъ нѣкопорого давленія. Потомъ послѣдуютъ неперяодное подирание морозомъ по кожѣ, жаръ и сильное бѣненіе пульса: лихорадка дѣйствіе свое совершаетъ поступательнымъ образомъ, и дознано, что гораздо больше она мучитъ ночью, нежели въ другое время, что самое и бываетъ причиною безсонницы, безпокойствія и умноженія болей. Во время сея лихорадки желудокъ бываетъ пвердъ и мочи

выпекаетъ мало, хотя впрочемъ и частное бываетъ побужденіе къ моченію.

§ 618. Источникомъ сея лихорадки (§ 616) могутъ быть многокрое, пресѣченныя крови изпражненія; стояніе крови въ почкахъ, камышки, находящіеся въ почкахъ и употребленіе горячительныхъ и мочегонительныхъ лекарствъ.

§ 619. Щасливое окончаніе сея лихорадки открывается изъ того, когда камышекъ, находящійся въ почкахъ, бываетъ ненастоящій, котораго то есть настоящаго камышка существованіе въ почкахъ узнается изъ мучительныхъ болей, тошноты и безпокойствія, и наконецъ возпаленія; также когда лихорадка не весьма сильно свирѣпствуетъ; напрошивъ худое бываетъ предзнаменованіе, если лихорадка съ большою свирѣпствуетъ нагласною и слѣдственно большее бываетъ разгоряченіе и волненіе въ крови; если чаще приходитъ, или когда другой приступъ оныя вдругъ послѣдуетъ за первымъ, вкупѣ съ безпрерывнымъ запоромъ.

ГЛАВА XVI.

О селезеночной лихорадкѣ или воспаленіи въ селезенкѣ.

§ 620. Селезеночная лихорадка (febris splenetica) есть одна изъ острыхъ лихорадокъ, соединенная съ воспаленіемъ селезенки.

§ 621.

§ 621. Припадки болѣзни сея сходятся съ припадками воспаления печонки (§ 613).

Г Л А В А XVII.

О безпрерывной лихорадкѣ.

§ 622. Безпрерывная лихорадка (*febris synocha*) есть видъ оспрыхъ лихорадокъ, которая соединена бываетъ съ воспаленіемъ перепончатыхъ и мышечныхъ часпей, и не наблюдаетъ равенства во всемъ своемъ печеніи. Лихорадка сія называется еще кровяною или безпрестанною лихорадкою (*sanguinea five continens*).

§ 623. Сія лихорадка обыкновенно начинается съ едва примѣтнымъ ознобомъ; послѣ чего послѣдуютъ великой жаръ, жажда, отвращеніе къ ѣдѣ, боль въ головѣ, трудное дыханіе, надутіе лица, зардѣніе очей, печеніе слезъ противъ изволенія больного, звинѣніе въ ушахъ, круженіе въ глазахъ и головѣ и сонливость съ неровнымъ, малымъ и сжатымъ біеніемъ въ жилахъ. Моча бываетъ густа и красна и припадки чрезъ все печеніе сея болѣзни никакого не имѣютъ послабленія.

§ 624. Причины сея лихорадки суть многокровоіе и разныя накопленія оной, медлительныя по естѣ въ какой либо часпи тѣла обращенія крови, слѣдственно запоры въ желѣзахъ или во

внутренностяхъ. Также и все то можетъ быть виною сея лихорадки, что только въ состояніи умножитъ спремленіе крови.

§ 625. Пластиваго окончанія сея лихорадки бываетъ признакомъ то, когда по прошествіи чепырехъ дней, или около крипическихъ то естъ переломныхъ дней, либо кровь самопроизвольно поидетъ изъ носа, либо сдѣлается поносъ, либо великой прольется потъ. Напротивъ смертельное окончанія сей лихорадки бываетъ предвѣщаніе, когда вышеупомянутыхъ изпражнений не случится, и сверхъ того дыханіе учинится труднымъ, или и самая возпосѣдуетъ одышка, киданіе во всѣ спороны пѣла и его членовъ, и дрожливое движеніе оныхъ, моча въ переломные дни вытекаетъ будетъ гораздо густѣе и краснѣе и наконецъ помѣшательство въ умъ въ купѣ съ бреженьемъ приключатся.

ГЛАВА XVIII.

О желчной лихорадкѣ или огневицѣ.

§ 626. Желчная лихорадка, горячка или огневица (febris biliosa five canfus) естъ преострая лихорадка, соединенная съ чрезвычайнымъ жаромъ и почти нестерпимою жаждою.

§ 627. Припадки лихорадки сея суть нижеупомянутыя: сперва больные начинаютъ чув-
ствовать

спивоватъ великую слабость во всемъ тѣлѣ; попомъ приходятъ ознобъ, жаръ, жажда и нестерпимая засуха на языкѣ. Поднимается желчная рвота или бываетъ одинъ только позывъ на оную; спраждающіе ощущающъ боль въ головѣ превеликую и жаръ какъ бы огненный или жигучей около сердца и подъ ложкою, удареніе въ жилахъ имѣющъ скорое и частное, моча вытекаетъ густа красна и пламенна. Цвѣтъ на лицѣ и въ глазахъ по большей части бываетъ желтый, похожей на цвѣтъ, означающій присудствіе желтухи, или и совсѣмъ бываетъ такъ называемый илгоходрический.

§ 628. Причинами сея лихорадки бываютъ худыя соки и мокроты желто и черножелчныя, находящіяся въ тѣлѣ, изліяніе желчи въ двенадцатиперстную кишку, гдѣ отъ того питательной сокъ порпшился, дѣлается весьма ѣдкимъ и послѣ смѣшивается съ кровью, отъ чего происходитъ сильное волненіе и разжиженіе крови, а въ самыхъ малыхъ сосудахъ застой оной и совершенныя запоры, и слѣдственно воспаленіе. Впрочемъ и самыя душевныя движенія причиняющъ такового состоянія лихорадку.

§ 629. Что касается до предузнанія, какое бы имѣла окончаніе горячка; то надлежитъ примѣчать слѣдующія явленія: что хорошей по есть бываетъ признакъ, когда сего рода лихорадка переѣнилась на придневную или четверо-

дневную лихорадку, или воспослѣдуетъ желчная рвоша безъ поносу. Напропивъ худое бываетъ предвѣщаніе, когда на пышый или шестый день маперія будетъ извергаться черная, имѣющая различной цвѣтъ; потъ поидетъ холоденъ, конечныя часпи пѣла спануть забнутъ, покажутся синѣва на ногпяхъ, и приступитъ икота. Также когда моча высекаетъ черная и въ не большемъ количествѣ съ засухою желудка и чрезвычайною пѣснопою въ груди. Каковыя всѣ припадки предозначаютъ какъ превеликое воспаление, такъ и скоро воспослѣдовать имѣющую мерпвость (*phacelus*), копорая есть не что иное, какъ разрушеніе поы часпи, копорая обдержима была воспаленіемъ.

ГЛАВА XIX.

О жабѣ или воспаленіи съ зѣвахъ и окрестныхъ частяхъ.

§ 630. Жабѣ или жабная лихорадка (*angina*) есть одна изъ преострыхъ лихорадокъ, соединенная съ воспаленіемъ зѣвовъ и мышцъ начала пищепріемнаго горла или горпани; слѣдственно жаба всегда почти соединена бываетъ съ трудностію какъ въ глотаніи, такъ и дыханіи.

§ 631. Жаба раздѣляется на внутреннюю или сокрытую, не подлежащую то есть внѣшнимъ чув-

чувствѣмъ (*angina occulta sine interna*), и на внѣшнюю или явную либо очевидную. Первый видъ жабы, есѣли занимаетъ она внутреннія пищепріемнаго горла или начала онаго мышцы безъ опухоли и зардѣнія, называется *внутригорловою жабою* (*synanche*); а есѣли объемлетъ внутреннія мышцы горпани или начала, копорыхъ мы дышемъ; то называется *внутригортанною или легкою жабою* (*synanche*). Хопя внутрыгорпанная жаба также бываетъ безъ опухоли и зардѣнія внутреннихъ гортанныхъ частей; однако всегда исполненна естъ великой опасности. Но есѣли жаба или воспаленіе занимаетъ наружныя мышцы начала пищепріемнаго горла, съ опухолью и зардѣніемъ оныхъ; то называется въ такомъ случаѣ *внѣгорловою жабою* (*parasyanche*), а есѣли объемлетъ наружныя гортанныя части, также съ опухолью и зардѣніемъ; то именуется *внѣгортанною* (*parasinanche*) жабою.

§ 632. Припадки сея болѣзни суть сіи: жаба, или жабная лихорадка нападаетъ по большей части съ ознобомъ и холодомъ; послѣ чего скоро послѣдуютъ великой жаръ въ тѣлѣ, боль и жженіе въ зѣвахъ. Потомъ трудность въ глотаніи безъ или съ опухолью мышцъ пищепріемнаго или дыхательнаго горла. Жилы спановяпся черными, а лице и глаза красными, и больной при продолженіи болѣзни, по ознобомъ и легкимъ холодомъ, по лепучимъ или непо-

спояннымъ жаромъ мучимъ бываетъ. Естли
таковое зло проспирается долѣе; то дыханіе
становится пруднѣе и языкъ чрезвычайно раз-
дувается, разпухаетъ и темнокраснѣетъ; го-
лосъ становится хриплымъ и звонкимъ вкупѣ
съ пѣснопою въ груди, выпекаетъ пѣна изо
рта и пульсъ бѣетъ часпо и швердо.

§ 633. Приключенія жабы виною бываютъ много-
кровіе, и произшедшее отъ онаго сильное спремле-
ніе и спояніе оныя въ языкъ и его мышцахъ, не-
бѣ и миндаловидныхъ околожычныхъ желѣзахъ;
брошенныя и сами по себѣ пресѣкшіяся крово-
теченія и другія симъ подобныя изпражненія
на пр. почечуй или геморой, кровотеченіе изъ
носа, кровоочищенія у женщинъ (lochia); обык-
новенныя и рожечныя или баночныя крове-
панія. Или упоеніе крѣпкимъ напишкомъ послѣ
сильныхъ движеній духа и гнѣва и послѣдовав-
шаго попомъ преспуженія. А наипаче излишнее
употребленіе крѣпкихъ окисательныхъ удобныхъ
то есть къ окисанію и броженію пишьевъ.
Дымъ, изъ мышьячныхъ и ртутныхъ пѣлъ про-
изходящій, чуланы и горницы новопобѣленыя
извѣсткою.

§ 634. Относительно до предсказаній окон-
чанія жабы примѣчать должно слѣдующее: что
то есть хорошей бываетъ знакъ, когда опухоль,
боль и зардѣніе глазъ мало по малу спанутъ
умень-

уменьшашся. Напрошивъ печальнаго окончанія ожидать должно, когда опухоль, боль и зардѣніе во внѣгорловой и внѣгоршанной жабахъ вдругъ исчезнушъ изъ глазъ, однако шакъ, что отъ того припадки еще болѣе умножашся спанушъ. Въ такомъ случаѣ лихорадочная маперія ударяется либо къ мозгу, гдѣ рждаетъ воспаленіе мозговыхъ оболочекъ, просто блажь или бредъ съ бѣшенствомъ и горячкою соединенный (phrenitis § 648), либо къ легкому, гдѣ воспаленіе сосудовъ онаго причиняетъ (peripneumonia § 639). Также весьма худой бываетъ признакъ, когда жаба около крипическихъ дней къ какимъ либо лихорадкамъ приключится; или во время жабы будетъ выходить пѣна изъ рта и языкъ чрезвычайно распухнетъ и почернѣетъ; естли приспущаютъ чрезвычайная одышка (§ 446 orthopnea) и холодъ въ конечныхъ частяхъ шѣла вкупѣ съ судорогами; ибо въ такомъ случаѣ скоро смерти ожидать должно. Также когда жабная маперія переселился въ легкое. Пошому что тогда больные на седьмой день умираюшъ; наконецъ когда жаба прикинется къ вывихнушю какихъ либо позвонковъ.

ГЛАВА XX.

О колотьи или лихорадкѣ, соединенной съ колотьемъ

§ 635. Колотье или съ колотьемъ соединенная лихорадка (febris pleuritica) естъ одна изъ пре-

преоспрыхъ лихорадокъ, соединенная съ воспаленіемъ подреберной плевры (§ 71) или между-ребренныхъ мышцъ. Первый видъ истиннымъ холотъемъ (vera), а послѣдній ложнымъ (frugia) называется.

§ 636. Колошья припадки имѣются сіи: оно почти обыкновенно нападаетъ съ ознобомъ, жаромъ, жаждою, безпокойствомъ, круженіемъ въ головѣ, прудностію въ дыханіи, пвердымъ и частымъ біеніемъ въ жилахъ и побужденіемъ на рвоу; Колючія боли ощущаются въ правомъ или лѣвомъ боку около реберъ, копорыя боли при сухомъ кашлѣ умножаются и больного чрезвычайнымъ мучатъ образомъ. Больные на спраждущемъ боку лежатъ никакъ не могутъ. На третій или четвертый день приходитъ мокрота и харкопина гнойная, или смѣшенная съ кровью. Очищенія грудныя производимыя харканіемъ и произхожденія поща иногда хорошо, а иногда худо производятся. Съ начала лихорадки моча бываетъ красноватая и напипанная, но около переломныхъ дней либо дѣлаетъ осадку и бываетъ мутна, либо не дѣлаетъ оной и бываетъ прозрачноблѣдная; впрочемъ хорошо наблюдаетъ переломы, и лихорадка на 7, 9, 11 или 14 день либо пролишіемъ виликаго поту, либо харкопиною оканчивается.

§ 637. Колошья причинами бываютъ осприя сѣрныя часпицы, приведенныя во внутреннее
силъ-

сильное движеніе и попомѣ оспановившіяся въ самыхъ конечныхъ сосудахъ либо подреберной плѣвы, либо между ребренныхъ мышцѣ. Отъ чего производимѣ воспаленіе, жарѣ и великая жажда, колючіе или колошье причиняющія боли; также многокрое, проспуженія разгоряченнаго пѣла, копорыми оспановляется испарина и помѣ и вгоняюща вънутрь; брошенныя кровопусканія и другія обыкновенныя пѣлоизпражненія.

§ 638. Чшо касается до предузнанія, какимъ образомъ кончимся имѣемѣ колошье; по должно примѣчать, чшо въ шо время нѣчего опасаться, еспли оное приключается молодымъ людемѣ, и когда моча прежде чепвертаго или пятаго дня дѣлаемѣ осадку на днѣ и дыханіе не весьма трудно бываетѣ. Когда изверженіе гноисшой или съ кровью смѣшенной маперіи хорошо производимѣ и поидемѣ изъ носа кровь съ уменьшеніемѣ припадковѣ. Напротивѣ худое бываетѣ предвѣщаніе, когда харкотина и слѣдспвенно грудоччищеніе не хорошо производимѣся, и великія бываютѣ помѣнія прежде переломныхъ дней. Когда у больныхъ часно бываетѣ на низѣ, моча въ критическіе или переломные дни бываетѣ свѣпла и не дѣлаемѣ никакой осадки, и лихорадка долѣе 14 дней продолжимся: ибо всѣ шакковыя явленія означаюмѣ учинившейся нарывѣ въ легкомѣ.

ГЛАВА XXI.

**О воспаленіи въ легкомъ, или лихорадкѣ
соединенной съ воспаленіемъ въ
легкомъ.**

§ 639. *Колошье въ легкомъ* (peripneumonia) есть не что иное, какъ преострая лихорадка, соединенная съ воспаленіемъ легкаго (§ 82). Колошье въ легкомъ называется истиннымъ (vera peripneumonia), когда воспалены бывающѣ біющіяся легкаго жилы; а есѣли возгорѣніе будетъ въ боевыхъ жилахъ однихъ только духовъ-движныхъ каналовъ; то называется ложнымъ или ненастоящимъ (pneumia).

§ 640. Что касается до колошья иль воспаленія въ легкомъ; то оно различается отъ колошья въ бокахъ однимъ только большимъ мученія и опасности степенемъ. Напр. лихорадка въ семъ случаѣ съ большимъ дѣйствуетъ спремленіемъ, ощущаемыя боли пречиняющѣ большее давленіе и гнѣшеніе въ груди и простирающія даже до лопатокъ. Тошливостъ, безпокойство, лишеніе сна, твердый пульсъ, трудносъ въ дыханіи и харканіи бывающѣ большія, нежели въ колошѣ въ бокахъ.

§ 641. Причины сея болѣзни сходствуютъ съ тѣми причинами, о которыхъ говорили мы въ § 637, однако должно примѣчать, что въ воспаленіи или колошѣ въ легкомъ сосуды онаго бывающѣ засорены и завалены.

§ 642.

§ 642. Опиносительно до предсказанія конца сея болѣзни, должно примѣчать слѣдующее: чпо въ воспаленіи легкаго хорошій бываетъ знакъ, когда поносъ не вдругъ съ самаго начала болѣзни, но около переломныхъ дней приключился. Когда зардѣніе глазъ и лица также прудность въ дыханіи уменьшился, моча будетъ выпекасть весьма красная и около переломныхъ дней дѣлать осадку. Напрошивъ худой бываетъ знакъ, когда поносъ вдругъ съ самаго начала болѣзни появился. Самыя же худыя бываютъ признаки, когда приспустилъ бредъ, и на одиннадцатый день красносипная или багряноцвѣтная учинилась лихорадка (rigor). Ибо таковыя явленія означаютъ имѣющее скоро возпослѣдовать померщивѣніе въ легкомъ и слѣдственно плачевное лишеніе жизни.

ГЛАВА XXII.

О рожѣ или распалительной лихорадкѣ.

§ 643. Летучая, горячая олухоль, рожа или распалительная лихорадка (erysipelas) есть одна изъ преострыхъ лихорадокъ, соединенная съ воспаленіемъ поверхностной кожи, на лицѣ ли, или на прочихъ частяхъ тѣла, какъ то рукахъ и ногахъ, съ легкимъ жаромъ, зардѣніемъ и опухолью.

§ 644.

§ 644. Припадки рожи суть слѣдующія: рожа нападаетъ на больного съ скоропоспигнымъ и нечаяннымъ ознобомъ, за чемъ вдругъ послѣдуютъ жаръ и боль. Если рожа сидитъ на головѣ; то занимаетъ вкупѣ и околоушные слюнопочныя желѣзы (parotides); а если на сосцахъ и груди, то занимаетъ раменные или подмышечныя желѣзы (axillares). Въ рожѣ перелетается позывъ на ѣду, а иногда высыпаются пятна на третій по естѣ или четвертый день съ опухолью, жаромъ и легкимъ зардѣніемъ. Рожа иногда переходитъ съ одного мѣста на другое; а иногда по всему тѣлу разливается. Когда она занимаетъ лице, а наипаче чело; то отъ того разпухаютъ глаза. Чѣмъ больше свирѣпствуетъ и умножается лихорадка, тѣмъ больше умножается безпокойствіе, жажда и прочіе припадки.

§ 645. Большой степень рожи, когда по естѣ всѣ припадки оный умножаются, называется *возгорѣніемъ, болячкою или горячею кровяною олухолію* (phlegmone).

§ 646. Разпалительной лихорадки или рожи бывающей источникомъ желчная худосочность, и всѣяныя вещества, которыя могутъ причинить кровяныя застои. Гнѣвъ, остановленные или задержанные обыкновенныя какъ естественныя по естѣ, такъ и искусствомъ производимыя испражнения на пр. кровошеченіе изъ носа, почечуй,

течуй, кровопусканія ланцетомъ и банками прежде производимыя, а послѣ брошенныя; нечаянныя или скоропоспѣжныя пѣлесныя перемѣны, а наипаче оспановленная нечувствительная испарина.

§ 647. Чѣмъ касается до предузнанія окончанія рожи; то должно примѣчать, что хорошій бываетъ признакъ, когда ни опухоль, ни твердость не продолжаются долѣ шрехъ или чепырехъ дней, но при продолженіи порядочной испарины и хорошаго пошѣнія какъ самая опухоль, такъ и жаръ, твердость и боль чувствительнымъ уменьшающся образомъ. Напротивъ худый бываетъ признакъ, когда въ рожѣ все противное вышесказанному происходитъ будещъ, и когда горячая мягкая опухоль перемѣнишся въ тугую и твердую опухоль (*in scurghum evaserit*).

ГЛАВА XXIII.

О буйственной лихорадкѣ или воспаленіи въ мозгѣ и его оболочкахъ.

§ 648. Буйственная, бѣшеная, то есть съ бѣшенствомъ соединенная или какъ здѣсь зовутъ бѣшеная лихорадка (*phrenitis*) есть одна изъ самыхъ острыхъ лихорадокъ, соединенная съ воспаленіемъ мозговыхъ оболочекъ или и самого мозга.

Часть III.

Р

§ 694.

§ 649. Сея лихорадки припадки суть ниже-
слѣдующіе : она нападаетъ на больныхъ съ силь-
нымъ ознобомъ и превеликимъ жаромъ. Потомъ
приступаеиъ почти непрерывная безсонница ;
въ запылакѣ весьма сильная ощущается боль,
и больные вдругъ позабываютъ то , что хотѣ-
ли говорить. Пульсъ бываетъ неровный , то
скоръ то естъ и часиъ , то малъ и пвердъ ;
сердце прысается часто ; оспанавливается изпе-
ченіе мочи, глаза бываютъ красны и не рѣдко за-
липаются слезами ; бросаніе рукъ въ разныя сто-
роны , кровь выпекаетъ изъ носа , наклонность
то ко гиѣву, то веселости бываетъ , однакожъ
все взбивчиво производися. Рѣчи бываютъ со-
единены съ брѣженъемъ и неисповспвомъ , руки
трясутся , моча выпекаетъ водянистая , из-
пражнения низомъ бываютъ бѣлыя ; а наконецъ
прилодаютъ икота , прысеніе языка и судороги.

§ 650. Виною бѣшеной лихорадки бываютъ
кровяныя захряслости въ мозговыхъ оболочкахъ,
либо опиъ сильнаго движенія и спремленія крови
къ головѣ , либо опиъ ушибу произведшія . опиъ
чего производися воспаленіе мозговыхъ оболо-
чекъ , и самое вещество мозга по причинѣ сое-
единенія съ оными оболочками спраждетъ чрез-
вычайнымъ образомъ.

§ 651. Что принадлежиъ до предсказанія
окончанія сея жесточайшія лихорадки ; то над-
лежиъ обращать вниманіе свое на слѣдующія
об-

обстоятельства, то есть что тогда бываетъ хорошей знакъ и хорошая надежда счастливаго окончанія сея лихорадки, когда кровь пойдетъ изъ носа въ великомъ количествѣ, и возпослѣдуютъ испражненія желудка и потѣнія рѣшающія лихорадку. Въ противномъ случаѣ бѣшеная лихорадка всегда исполнена бываетъ бѣдствія и опасности. Худый бываетъ знакъ, когда испражненія и моча бываютъ бѣловаты и противъ изволенія больного производятся. Когда конечныя части тѣла спанутъ забнутъ и дрожатъ языкъ; когда голосъ бываетъ звонкій; больной говоритъ взбивчиво, и всѣ припадки нечаянно утихнутъ. Также когда приключится дрожаніе и скрепѣніе зубовъ, икота, судороги, и наконецъ прикинешся красносыпная лихорадка.

ГЛАВА XXIV.

О воспаленіи грудобрюшной перелонки.

§ 652. Преградогрудобрюшная лихорадка или возгорѣніе грудобрюшной перелонки (paraphrenitica febris f. paraphrenitis) есть весьма острая лихорадка, соединенная съ воспаленіемъ перепонки, отдѣляющей грудь отъ живота.

§ 653. Признаки предрадогрудобрюшной лихорадки или воспаленія грудобрюшной преграды

суть сіи: лихорадка нападетъ съ ознобомъ и холодомъ, за копорыми послѣдуетъ жаръ. Дыханіе бываетъ весьма трудное и по большей части разверстіемъ рта производимое (*anbelofa*), съ сухимъ кашлемъ и рвотою либо мокротною, либо черною. Больнымъ приходитъ смѣхъ, икота и помѣшательство въ умъ.

§ 654. Причины помянутой лихорадки суть: стояніе крови въ грудобрюшной перепонкѣ, переселеніе злой матеріи къ оной же перепонкѣ въ оспрыхъ лихорадкахъ и обыкновенныя кровопусканія брошенныя и совсѣмъ оставленныя.

§ 655. Относительно до предсказанія окончанія сея болѣзни надлежитъ вѣдать, что она благополучно пройдетъ, когда лихорадка не весьма сильная будетъ, и воспаленіе на 4, 5 или 7 день раздробится и рѣшится поносомъ. Напротивъ болѣзнь сія бываетъ смертельною, когда жаръ больше прежняго умножится и усилятся жажда, зашвердетъ желудокъ и опъ того возпослѣдуетъ внутреннее воспаление. Когда приступятъ сардоническій или лицевискривлятельный смѣхъ (*risus sardonicus*), безпорядочная и сумасбродная рѣчь и мучительная икота и судороги. Ибо при таковыхъ обстоятельствахъ больной скоро лишается наслажденія пріятельностями сего свѣта.

ГЛАВА XXV.

О кровелыноснон лнхорадкаѣ или кровавомѣ
и съ рѣзомѣ въ живомѣ соединенномѣ
лыносѣ.

§ 656. Кровелыноснон лнхорадка (dysenterica febris) естъ одна изѣ весьма оспрыхѣ лнхорадокѣ, копорон всегда соединена бываеиъ съ кровавымѣ или рѣзѣ въ живомѣ производяиимѣ лыносомѣ и воспаленіемѣ кишекѣ.

§ 657. Кровавый лыносѣ (dysenteria) раздѣляется на красной и бѣлой, и слѣдспвенно на доброй и злой или заразителной. Мы здѣсь наипаче говоримѣ о зломѣ и заразителномѣ или бѣломѣ лыносѣ. Въ бѣломѣ лыносѣ испражняеиъ ннзомѣ склизиспая, гноиспая и кровавая маиерія, а въ красномѣ одна толькѣ кровавая маиерія.

§ 658. Припадкн и признаки кроваваго лыноса или кровелыноснон лнхорадки сущѣ сн: нападаеиъ лнхорадка сн съ великимѣ сокрушеніемѣ силѣ, ознобомѣ, жаромѣ, жаждою, испребленіемѣ апспппа, побужденіемѣ на рвошу или н самую рвошою, часпымѣ и скорымѣ бненіемѣ въ жилахѣ, тѣсношою въ груди и рѣзомѣ или воркопаніемѣ и разными мученіями въ живомѣ, опѣ чего приходиѣ напуженіе при испражненіи или безпрерывное на ннзѣ хопѣнне (tenesmus), испражненія желудка бываюиъ почти безпрерывныя,

частыя же всегда, которыя бывають либо гное-кровавыя, либо кровавыя, либо смѣшанныя съ кровью или кровяными полосками. Попомъ приходящъ оспановленіе печенія мочи, непорядочныя ознобы; боли въ кишкахъ бывають преждеспокия, и во время сильнаго при изпражненіи напущенія кажется какъ будто кишки выходятъ вонъ. Скоро же возпослѣдовавъ имѣющей смерти признаками бывають икота, болячая сыпь во рту, называемая *молошницею* (aphthæ), холодный потъ, постепенное уменьшеніе или совершенное унытіе жесточайшихъ болей, жажды и оспраго біенія въ жилахъ, гнусныя язвыны на пѣлѣ сѣрыя, или темноцвѣтныя, гноевыя и черныя, издающія весьма великой смрадъ и чрезвычайно изхудалое лице (facies hypocratica), иногда высыпають и багровыя пятна на пѣлѣ (petechiæ).

§ 659. Причиною злаго и заразительнаго кроваваго поносу бываетъ матерія весьма острая, ѣдкая, жгучая (caustica) и весьма тонко окисающая, наипаче чрезъ заразу въ желудокъ вселившаяся. Но каковаго бы была свойства сія матерія, или оная заразительная влага, еще и по сіе время не изслѣдованно. Причины же, представляемыя о кровавомъ поносѣ, суть только однѣ мнѣнія, никакого основанія не имѣющія. Довольно для насъ: что худое воздуха состояніе или особое вѣтровъ разположеніе, и раны изпеченія земли подають случай къ возро-

жде-

жденію кровепоносной лихорадки. Кровавой поносъ можетъ также произойти и отъ разныхъ фруктовъ и овощей или плодовъ, отъ излишней теплоты дневнаго зноя и великаго холоду въ ночи. Наконецъ отъ окиспительныхъ брашенъ и напитковъ, каковыя суть яблочные и грушевые не въ пору пригошовленные напитки.

§ 660. Что касается до предсказанія конца кровепоносной лихорадки; то надлежитъ вѣдать, что она всегда исполнена бываетъ опасностей. Худыя и бѣдспвенныя бываютъ предзнаменованія, когда испражняемая рвотою матерія бываетъ черная или зеленая: когда впущенныя въ проходъ промывашельныя лекарства вдругъ вонъ выпекаютъ. А что смерть неопмѣнно послѣдовать имѣетъ, то сіе показываютъ нижеслѣдующіе весьма худые и опасные знаки, какъ-то: икота, трудность въ глотаніи, распаленіе и какъ бы жгучей жаръ внутри, а холодъ снаружи; нечаянное болѣе уменьшеніе, молошница, помѣшательство въ умѣ, судороги, а иногда багровыя пятны высыпающія на шлѣ (petechiae § 678).

ГЛАВА XXVI.

Объ осленной лихорадкѣ или ослѣ.

§ 661. Ослѣ или осленная лихорадка (febris variolosa) есть видъ самыхъ оспирѣйшихъ лихорадокъ

радокъ, которая соединяется съ пяпинами или лучше сказать съ язвинами на пѣлѣ, которыхъ язвины вообще называются ослою (variola). Оспа по большей части свирѣпствуетъ повальнымъ и приличнымъ образомъ.

§ 662. Оспенная болѣзнь раздѣляется на чепыре круга или поприща времени, а именно на *кругъ или поприще наладенія, возжигенія или заразы* (periodus invasionis, ebullitionis, contagii); *Поприще высыпанія или выступленія* (eruptionis periodus); *поприще загноенія* (periodus suppurationis) и *поприще подсыханія или схожденія ослы* (exsiccationis periodus).

§ 663. Припадки оспенные во время нападенія оспы суть слѣдующіе: съ начала больные ощущающъ великой ущербъ или уменьшеніе въ силахъ, жалуются на боль, ощущаемую ими въ головѣ и спинѣ, на опнытіе позыва къ пищѣ, безпокойный сонъ, непорядочный ознобъ, жаръ и преестествонное бѣненіе въ жилахъ; жалуются также они и на рвоу или побужденіе на оную, тошноту и мученіе въ груди. Потомъ приступаетъ частый позывъ къ моченію, или моча на нѣсколько дней оспанаавливается. Часпо производящъ черномочныя движенія, найпаче младенцовъ почесота и боль въ вѣкахъ, закрывающихъ глаза. Слезы проливаются самопроизвольно и жажда и лихорадка мало помалу умно-

умножаются. Всѣ же сіи припадки почитаются обыкновенными хорошей имѣющей послѣдовать оспы признаками. Припадки же злой и опасной оспы во время нападенія оной суть сіи: лихорадка нападаетъ съ большимъ стремленіемъ всѣхъ вышеупомянутыхъ припадковъ а именно: съ превеликимъ силъ сокрушеніемъ, съ большею болью въ поясницѣ, затылкѣ и спинѣ, такъ что младенцы отъ того кричатъ и плачутъ. Потомъ приступаютъ непрерывное безпокойство и киданія членовъ въ разныя спороны, дрожаніе и холодъ въ рукахъ. Послѣ чего послѣдуютъ то жаръ, то холодъ попеременно, великій потъ, всегдашнее бдѣніе и безсонница, слинотеченіе, большая тоска и тѣснопа въ груди, бреженіе съ поносомъ и слабымъ и частымъ біеніемъ пульса. Иногда какъ боль, такъ и тоска или тѣснопа и жажда прочь отступаютъ.

§ 664. Оспенной сыпи хорошіе признаки бываютъ, когда по прошествіи двухъ или трехъ дней появляющіяся красныя пятна на тѣлѣ, которыя мало по малу умножаются и обращаются въ раздѣльные пупырышки. Пятна и пупырышки оныя съ начала высыпаютъ на шею и лицо, а послѣ на груди, раменахъ или мышцахъ, рукахъ, голеняхъ и брюхѣ. На лицѣ, шеѣ, мышцахъ, рукахъ и ногахъ въ весьма великомъ высыпаютъ множествѣ; а на груди, спинѣ, голеняхъ и брюхѣ въ меньшемъ бываютъ коли-

честивѣ. Кругъ оспеннаго высыпу продолжается до пяти или шести дней, въ которое время зудъ или почесота, боль, и раздутіе лица и глазныхъ вѣкъ, безъ или съ зашвореніемъ глазъ производящъ; по окончаніи же оспеннаго высыпу, всѣ прежніе сильные припадки нѣсколько уменьшаются и утихаютъ. Худаго же высыпу оспы признаки бывающъ, когда оспенныя пяпны хопя и появляющся на шѣлѣ, однако между оными показывающся и другія еще красныя и большія пяпны. Или когда послѣ оспеннаго высыпу, новыя опять выступаютъ оспины. Если оспины ни красны, ни въ верхъ подняты не бывающъ, но прижаты къ шѣлѣ съ ямочками на срединѣ оныхъ находящимися, черного, блѣднаго или смуглаго цвѣту, если послѣ оспеннаго высыпу никакого не бываетъ послабленія припадковъ, такъ что хопя біеніе въ жилахъ и сонъ бывающъ спокойны, однако сокращеніе или испощеніе силъ примѣчается еще большее и приходящъ тоска нестерпимая, ознобы не постоянныя, сильной сонъ и великія корчи.

§ 665. Загноенія оспы хорошія признаки бывающъ: когда то есть загноеніе начинается по большей части шестого или седьмаго дня, которое мало по малу совершается, приходивъ то есть какъ бы новая лихорадка и красныя и возвышенныя пяпны наливающся изъ бѣлажелымъ гноемъ. Потомъ послѣдуетъ большой жаръ

жарѢ, сильная боль, весьма скорое біеніе въ жи-
лахѢ, и великая пошливость. НапротивѢ худые
бывающѢ знаки не хорошаго загноенія оспы, когда
пупырышки какѢ бы прижапые къ шѢлу и по-
рожніе, наподобіе гороховой шелухи, пепельнаго
или зеленовапаго цвѣшу безѢ сукровицы и изѢ
бѣла желтовапаго гною пребываютѢ, и
посрединѢ оспинѢ находяпся ямочки, черныя
пятнышки имѣющія. Когда опухоль на лицѢ и
рукахѢ бываетѢ очень малая или и совсѣмѢ ни-
какой не бываетѢ и слина течетѢ непорядочно.
Когда произойдетѢ кровавая рвота и поносѢ съ
труднымѢ моченіемѢ (§ 404), тоскою, безпо-
койствомѢ, безсонницею, перемененіемѢ постели,
великимѢ ознобомѢ, и труднымѢ дыханіемѢ,
или приключипся еще багрянокрасная сыпь.

§ 666. Въ разсужденіи кругоподсыханія оспы
должно примѣчать слѣдующее: что по естѢ
оспа по большей части начинаетѢ подсыхать
девяпаго, одиннаццатаго или четырнадцатаго
дня; и когда начнетѢ сходить опухоль; то и
боль и жарѢ сами по себѢ уменьшаются.
ЧѣмѢ скорѣе подсыхаетѢ и исчезаетѢ оспа,
тѣмѢ меньше оставляетѢ на кожѢ пятенѢ руб-
цовѢ и ямѢ. Однако многіе младенцы во время
подсыханія оспы умирающѢ.

§ 667. ПослѢ изсушенія оспы (§ 666) часто
дѣлающся парывы, болячки, корчи и внутрен-
ніе чахотныя вереды или чирьи.

§ 668.

§ 668. Изъ разпознавательныхъ до сихъ поръ упоминаемыхъ объ оспѣ знаковъ удобно открывающагося и предсказывательные оспенные знаки, что по еспѣ оспа благополучно оканчивается въ то время, когда она въ надлежащую пору и надлежащимъ порядкомъ высыпаетъ, и когда надлежащимъ образомъ загнивается и изсыхаетъ. Напрошивъ того худо кончится имѣетъ оспа, когда ни въ надлежащее время, ни надлежащимъ порядкомъ, но либо ранѣе, либо позже высыпаетъ, и прижимается къ тѣлу, имѣя цвѣтъ багровый и черный съ черными краями. Когда оспа бываетъ сливная, и когда послѣ высыпу оной всѣ припадки какъ-то твердые и скорое бѣненіе въ жилахъ, уменьшеніе силъ, безпокойство безсонница и жажда въ одинаковомъ пребывающъ состояніи; Когда сильной поспѣ чрезъ все печеніе болѣзни продолжается, и острые и упорныя боли подъ ложкою и въ поясницѣ ощущаются. Когда приключится кровавый поносъ, или кровавое мочеиспеченіе, холодъ въ конечныхъ частяхъ тѣла, а жаръ въ нутри, превеликая трудность въ дыханіи, наконецъ и красносыпная прикинется лихорадка.

ГЛАВА XXVII.

О корьной лихорадкѣ или кори.

§ 669. Корьная лихорадка (febris morbillosa) еспѣ видъ весьма острыхъ лихорадокъ, когда
ню

то есть острая матерія безъ загноенія и чирьшекъ выходящъ изъ тѣла наружу. Откуда явствуетъ, что корьная лихорадка есть высыпная лихорадка, которая часто прилипчивымъ и повальнымъ ходитъ образомъ.

§ 670. Корьной лихорадки припадки суть такіе: корь нападаетъ на младенцевъ съ разслабленіемъ силъ, великою усталостію, ознобомъ и холодомъ, болью въ головѣ, жаромъ и преспешеннымъ біеніемъ въ жилахъ, уничтоженіемъ желанія есть, жаждою, кашлемъ, препешаніемъ сердца, рвою или однимъ только позывомъ на рвоту и безпокойствомъ. На третій или на четвертый день выходятъ на тѣлѣ красныя пяпны, похожія на ужаленія блохинныя, и прежде чело или лобъ, потомъ лице и шею, грудь и ноги, а наконецъ животъ занимаютъ. Послѣ высыпу кори, всѣ припадки нѣкоторымъ образомъ утихаютъ, какъ-то біеніе въ жилахъ становится спокойнымъ и почти натуральнымъ и сонъ возстановляющій увядшія силы. На седьмой или девятый день красныя пяпны по большей части съ великимъ зудомъ или почесочною губъ исчезающъ, или соединяющяся съ багровыми пяпнами.

§ 671. Матерія, производящая корь (*morbilli*), есть острого и сѣрчистаго свойства;

§ 672. Какимъ образомъ оканчивается корь, всѣмъ довольно извѣстно, что по естѣ корь, относительно до ея свойства и состоянія, обыкновенно мало имѣетъ опасности. Однако худой бываетъ знакъ, когда лихорадка съ самаго начала сильно свирѣпствуетъ; а еще хуже и много и гораздо опаснѣе бываетъ знакъ, когда на седьмой или девятый день произойдетъ рвота съ поносомъ, безпокойствомъ, бросаніемъ пѣла, великимъ сокращеніемъ силъ, ознобаніемъ наружныхъ и конечныхъ частей пѣла, и жаромъ внутри ощущаемымъ, съ трудностію въ дыханіи, красными и багровыми пятнами по пѣлу и обмороками; ибо въ такихъ обстоятельствахъ больные по большей части умираютъ задушеніемъ.

ГЛАВА XXVIII.

О краснабагровой или багряноцвѣтной лихорадкѣ.

§ 673. Лихорадка съ багровинами или краснабагровая лихорадка (*febris purpurata*) есть одна изъ весьма сильныхъ сыпныхъ лихорадокъ, въ которой красныя или бѣлыя пятна величиною въ пшениное зерно выступаютъ на поверхности пѣла.

§ 674. Сія лихорадка раздѣляется на самостоятельную или самопричинную и припадочную

дочную (*idiopathica et symptomatica*). Самосуще-
спвующая пурпурою или багряною лихорадкою
называется та, копорая ни опѣ какой другой
болѣзни не производимѣ; а припадочную та,
копорая на седьмый, девятый или одиннаща-
тый день кѣ другимѣ прикидывается лихорад-
камѣ.

§ 675. Припадки и причины багровой лихорад-
ки сущѣ сѣм: то естѣ лихорадка сего роду на-
падаетѣ сѣм легкимѣ ознобомѣ, за копорымѣ
послѣдуетѣ жарѣ, пѣсноша вѣ груди, птвердое
и сильное бѣеніе вѣ жилахѣ, запорѣ, безпокой-
ство сѣм непостояннымѣ подираніемѣ по пѣлу
морозомѣ, такѣ что кажется болной имѣетѣ
кожу похожую на гусиную. Нерѣдко весьма ве-
ликой проливается потѣ. Напретій или чеш-
вертый день высыпаютѣ пѣпны первѣе на шеѣ,
потомѣ на груди, спинѣ, мышцахѣ и рукахѣ,
коимѣ предшесствуетѣ почесота или зудѣ и
чувспвоаніе колющей боли вѣ спинѣ. Моча вы-
пекаетѣ красная; по выпупленіи пѣпенѣ при-
падки либо нѣкопорымѣ унимаются образомѣ,
либо вѣ прежнемѣ пребывающѣм состояніи. Ко-
гда по срединѣ красивыхѣ пѣпенѣ производятѣ
бѣлые пупырышки; то тогда лихорадка сѣя
называется бѣлою пурпурою или лихенною
лихорадкою. Помянутые пупырышки наполня-
ются вонючею острою матеріею. Наконецѣ сѣи
припадки на 7, 9, 11 или 14 день сѣм вели-
кимѣ

кимъ подѣ кожею зудомъ начинающѣ сохнуть, и наподобіе шелуховинѣ сѣ пѣла сходить и исчезать. Случается сѣ родильницами, что молоко и мѣсячныя крови пересыхающѣ печь у оныхѣ, а послѣ выхожденія пѣпенѣ на пѣлѣ какѣ молоко, пакѣ и мѣсячина опять возвращающѣся.

§ 676. *Базиллярная или лихорадка* (miliaris febris) бывающѣ причинами оспрая и ѣдкая матерія, изпорченная опѣ крови отдѣлившаяся влага или пасока; обыкновенныя кровопыпженія оспановленныя или брошенныя и душевныя спраспи, а наипаче печаль, излишнія бѣвнія и многокровіе.

§ 677. Что касается до предсказанія, какимъ образомъ кончипсѣ имѣетѣ сѣя лихорадка, то надлежитѣ вѣдать, что то есть оная благополучно кончипсѣ, естли не будетѣ весьма сильная и сѣ безпокойствомъ соединенная; когда будетѣ ходипсѣ неповально и прилипчиво; когда сыпѣ бываеетѣ только красная, и когда у женщинѣ не вдругѣ сѣ самага начала лихорадки приходятѣ мѣсячныя кровопеченія. Напротивѣ худой знакѣ бываеетѣ, когда больные вдругѣ сѣ самага начала и даже чрезѣ все печеніе лихорадки весьма много потѣющѣ, моча вытекаеетѣ блѣдная, и вѣ великомъ количествѣ сѣ непрерывнымъ побужденіемъ кѣ моченію. Когда послѣ

алѣ довольнаго высыпу пяшенѣ, какѣ лихорадка, пакѣ и всѣ припадки вѣ прежнемѣ пребываютѣ состояніи. Когда пяшны по показывающіся и выступаютѣ наружу, то опятѣ входятѣ внутрь и исчезающѣ; когда высыпная матерія упорствуеѣ и не выступаетѣ наружу, что узнать можно изѣ посклиивости и пѣлеснаго безпокойства. Когда внутри ощущается жарѣ, а снаружи холодѣ, сѣ холоднымѣ попомѣ. Иногда причлючающіся обмороки, давленія вѣ груди, молошница и багровыя заразительныя пяшны.

ГЛАВА XXIX.

О пятносыпной заразительной лихорадкѣ.

§ 678. Пятносыпная заразительная лихорадка (*febris petechialis*) естѣ весьма оспрая высыпная горячка, копорая красныя пяшны блохиннымѣ ужаленіямѣ подобныя на поверхности пѣла выгоняеѣ и копорыя пяшны никакого возвышенія на пѣлѣ не имѣющѣ.

§ 679. Припадки сея болѣзни суть слѣдующіе: больные сѣ самаго начала приходятѣ вѣ весьма великое изнеможеніе, за копорымѣ послѣдуеѣ легкой ознобѣ, а послѣ приходятѣ великой жарѣ, боль вѣ головѣ почти несперпимая, совершенное кѣ їдѣ желанія изпребленіе, околосердечная боль, мерзливостѣ и рвопа, поносѣ сѣ мученіемѣ и рѣзомѣ вѣ живопѣ, шоска, опѣ

чаяніе съ малымъ, слабымъ и зыблующимся біеніемъ въ жилахъ, безпокойствомъ и бросаніемъ пѣла, лежаніемъ на необыкновенной постелѣ, гнѣпеніемъ въ груди и скаканьемъ или трясеніемъ сухихъ жилъ. Весьма часпо на пяпи и или шестый либо седьмый день выспунающъ красныя или синія либо желшыя пяпны первѣе на шеѣ, потомъ спинѣ и рукахъ. Больные поспѣющъ много и иногда чрезъ все теченіе болѣзни. Нѣкоторые больные ни на жажду, ни на жаръ, ни на боль не жалуются, и думаящъ, что они никакого зла, кромѣ безсонницы, и недоспашка силъ не чувствующъ. Иногда приключается поносъ (§ 451), рвоша, молюшница, жаба (§ 630), икоша (§ 529), брѣженъе и опняніе или лишеніе рѣчи.

§ 680. Причиною сея лихорадки почитается весьма удобная къ причиненію воспаления и гнили матерія, находящаяся либо въ воздухѣ, либо водѣ и пицѣ, кошорая матерія входивъ въ челоѡческое пѣло и тамъ производивъ разрѣшеніе и порчу въ крови, а наипаче въ худокровныхъ и хилыхъ людяхъ. Также сильная проспуда послѣ разгоряченія пѣла и излишнее употребленіе хорячихъ напишковъ.

§ 681. Что принадлежитъ до предсказанія окончанія сея лихорадки, то должно примѣчать, что пяпиносущная заразительная лихорадка

радка всегда исполнена бываетъ опасности. Ибо пятны въ сей лихорадкѣ либо выступаютъ наружу, либо внутри скрываются; и слѣдственно никакого послабленія лихорадки, слѣдственно и никакого уменьшенія припадковъ не бываетъ, но еще чѣмъ скорѣе и больше выступаютъ пятны, тѣмъ большаго и скорѣйшаго возженія и порчи крови, а пвердыхъ частей помертвѣнія опасаться должно. Когда сильной потъ чрезъ все печеніе болѣзни продолжается, а большая бываетъ трудность въ дыханіи и глотаніи, молошница или губныя и усныя язвинки (aphthæ); жажда либо никакой, либо чрезвычайно великая и почти нестерпимая бываетъ, языкъ черной, жаба или боль въ горлѣ, непрерывное безпокойствіе, подсакиваніе сухихъ жилъ, обмороки, поносъ, и брѣдъ приключаются. Ибо въ такомъ случаѣ больные по большей части умираютъ.

ГЛАВА XXX.

О моровязвенной или повѣтренной лихорадкѣ.

§ 682. Чума, моровязвенная или прилипчивая лихорадка (febris pestientialis) есть видъ весьма острыхъ и высыпныхъ лихорадокъ, копорая бубоны или паховики и горючіе чирьи производитъ на тѣлѣ.

§ 683. Припадки сея заразительныя лихорадки суть сии: лихорадка прилипчивая нападаетъ съ превеликимъ силъ сокрушеніемъ и слабостію; болью въ головѣ и сонливостію, испугленіемъ чувствъ, великою слабостію въ памяти, безпокойствіемъ, безсонницею, мерзливостію, рвою, и весьма великою пошностью и пѣснопою въ груди, со слабымъ, частымъ и сжатымъ біеніемъ въ жилахъ и обмороками. На претпій или четтверпый день выходятъ паховыки или многоглавыя чирьи (саккули), съ превеликимъ, а иногда съ нестерпимымъ жаромъ. Нѣкоторые больные ни на жажду, ни на жаръ, ни на боль не жалуются; потомъ приспупаютъ поносъ, чрезвычайная, слабость въ пѣлѣ и опчаяніе, обмираніе (§ 551), и пораженіе аншоновымъ огнемъ пищепріемнаго горла, желудка, кишекъ, и мозговыхъ оболочекъ.

§ 684. Виною сея болѣзни бываетъ матерія чрезвычайно тонкая и жгучая, ядовитая, находящаяся въ воздухѣ, или приспавшая къ плащю, пищѣ и пищю, коцорая матерія весьма удобна къ произрожденію гнили въ нашемъ пѣлѣ. Также всѣ издохновенія или изпаренія гнилыя и ядовитыя.

§ 685. Что касается до предсказанія и окончанія моровой заразы, то примѣчать должно слѣдующее: что то есть она благополучно кон-

кончипся, когда бубоны или паховыя опухоли и черныя ѣдкіе спрунчащыя вереды (antrax), наипаче занимающіе подмышечныя и паховыя желѣзы, попомѣ спину, рамена и бедра, на третій или четвертый день выдутѣ наружу, и чемѣ скорѣе сіе производипся, тѣмѣ большая надежда останеся кѣ избавленію отѣ сея непріязненныя роду человѣческому болѣзни. Ибо моровой и заразительной лихорадки или болѣзни никакого другаго спасительнѣйшаго не находипся перелому, какѣ вышеказанныя вышедшія язвыны, попому что ни поплѣ, ни кровотеченіе изѣ носа, ни поносѣ не рѣшаютѣ и не оканчиваютѣ заразы. Напротивѣ худое бываепѣ предвѣщаніе, когда никакой сыпи и никакихѣ чирьевѣ и волдырей не выходипѣ наружу, или когда выступившія язвы опятѣ внутрь скрывающыяся, когда больныя ни жару, ни жажды, ни боли не ощущаютѣ. Или когда жарѣ, жажда и поплѣ бывають чрезвычайны и нестерпимы, или когда появляпся на плѣхѣ багровыя или синія пяпны, либо возпоследуетѣ обмираніе.

ГЛАВА XXXI.

О тихой или медлинной лихорадкѣ.

§ 686. Медлинною или тихою лихорадкою (lenfa) называется та горячка, копорая мало по малу кровавой соспавѣ, или проспо

сказать, кровь спихимъ, но безпрестанно умножающимся внушреннымъ, движеніемъ испощаетъ, почему таковая лихорадка слабость и чаклоссть или сухопу щѣлу причиняетъ.

§ 687. Припадки медленной горячки имѣются сіи: въ сей лихорадкѣ бываетъ весьма сильной жаръ послѣ обѣда и въ вечеру съ умноженіемъ біенія въ жилахъ. Поутру, когда больные возстанушъ отъ сна, біеніе въ жилахъ бываетъ натуральное. Непорядочный позывъ на ѣду, а иногда и совсѣмъ ѣсть не хочется. Великой потъ, производящей во время сна. Круженіе въ головѣ; въ желудкѣ по бываетъ засуха и зашвердѣніе онаго, по великое слабленіе и поносъ; по большей же части бываетъ засуха.

§ 688. Причины сея горячки сущь: матерія сѣрчислая, оспрая и гнидая, и слѣдственно удобна къ произведенію разрѣшенія и порчи въ крови; ибо таковая матерія возмущаетъ внушренное крови движеніе и разрушаетъ смѣшеніе или еспешивенное оной состояніе. Преждебывшія худо пользованныя лихорадки посредствомъ чрезвычайно вязущихъ лекарствъ или непомѣрно горячипельныхъ, какъ таковыхъ средствъ, копорыя причиняютъ слабость во внушренностяхъ, и производяшъ запоры въ оныхъ. Запоръ въ брижейкѣ и поджелудочной мясеподобной желѣзѣ, оспановленіе обыкновенныхъ испра-
жне-

жненій, налр. запоръ или оспановленіе мѣсячныхъ кровопеченій женскихъ, гемороя и другихъ кровоизліяній. Пренебреженныя кровопусканія, спраспи и движенія душевныя, какъ по гнѣвъ, печаль, тоска, чрезвычайное любоудіе и привязанность къ своему опечеспву.

§ 689. Въ разсужденіи предсказанія конца сея горячки надлежитъ примѣчать слѣдующее: чпо, то есть медлиная лихорадка благополучно кончипся, когда пульсъ даже днемъ бываетъ равной и никакой боли и жару въ животѣ не ощущается. Когда попу во время сна совѣмъ не бываетъ и желаніе на ѣду съ умноженіемъ силъ возвращаются.

ГЛАВА XXXII.

О сухотной или чахотной лихорадкѣ.

§ 690. Сухотная или чахотная лихорадка (febris hecticа) есть видъ медлинныхъ лихорадокъ, копорая всегда почти соединена бываетъ съ запоромъ, вередомъ и порчею какой ни есть внутренности.

§ 691. Припадки сея болѣзни суть такіе: жаръ съ неспешивеннымъ біеніемъ въ жилахъ, то есть скорымъ и слабымъ пульсомъ почти непрерывно продолжается, каковыя припадки

въ вечеру гораздо больше увеличиваются. Засуха бываетъ на языкѣ, во рту и на кожѣ. Слабое желаніе ѣсть, истощеніе въ силахъ, дрожаніе головы и круженіе въ оной; моча бываетъ оранжеваго цвѣту съ розовою осадкою, и лоснящаяся, жирною лазоревою покрывается пленкою; поносъ и опухоль на ногахъ, вылезаніе волосовъ и премного истощающія шѣла потѣнія (*sadotes colliquativi*).

§ 692. Причинами сего лихорадки бываютъ либо запоры и засорѣнія въ какой нибудь благороднѣйшей внутренности, либо нарывъ и затгноеніе въ оныхъ и наконецъ все то, о чемъ говорили мы въ § 688.

§ 693. Относительно до предузнанія, какимъ образомъ кончиться имѣетъ сухопная лихорадка или чахотка, надлежитъ примѣчать слѣдующее: опъ истинной сухопной лихорадки, или наспоящей чахотки рѣдко когда либо больныхъ совершенно воспользоуать можно; почему въ леченіи чахотки употребляютъ по большей части однѣ только болеушолительныя лекарства. Потому что внутренней порчи какой нибудь внутренности чрезъ опираніе и очищеніе лечитъ никакъ не должно, кольми паче пугой и затвердѣлой опухоли опворительными, пропускными и разбивательными лекарствами. Худые бываютъ признаки, когда больные

ные начнушѣ ощущать отвращеніе къ ѣдѣ и
умаленіе въ силахѣ, лихорадка спанешѣ увеличи-
вапсья, приключипсья испощипельный поносѣ,
опухоль на ногахѣ, вылѣзаніе волосовѣ (*defluvium*
capillorum), ночныя испощипельныя пошѣнія,
закривленіе ногшей и масляная и жирная моча
возпослѣдуешѣ.

КОНЕЦЪ ТРЕТЕЙ ЧАСТИ.



1. *Содержание*
 2. *Введение*
 3. *Глава I. Общие сведения*
 4. *Глава II. Описание*
 5. *Глава III. Заключение*
 6. *Приложение*
 7. *Список литературы*
 8. *Словарь*
 9. *Индекс*
 10. *Дополнения*

СОДЕРЖАНИЕ

Те
 сл

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

О

Теоретической Хирургіи или наукъ , из-
слѣдывающей причины однихъ токмо на-
ружныхъ припадковъ и показывающей
признаки , по которымъ ихъ узна-
вать можно.

LAST & FETTER

THE FETTER AND THE FETTER
THE FETTER AND THE FETTER
THE FETTER AND THE FETTER
THE FETTER AND THE FETTER
THE FETTER AND THE FETTER



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

О хирургіи или наукъ о наруж- ныхъ болѣзняхъ.

ГЛАВА I.

О болѣзняхъ и недостаткахъ испорченна- го тѣлеснаго строенія или сообразія.

§ 694. Болѣзнъ худого спроеія или сложе-
нія тѣлеснаго естъ немочъ производить дѣй-
ствія человѣческаго тѣла надлежащимъ обра-
зомъ, происходящая отъ испорченнаго тѣле-
снаго сложенія или сообразія частей тѣла.

§ 695. Откуда явствуешъ, что болѣзни ху-
дого спроеія или испорченнаго сообразія и со-
гласія частей тѣла происходятъ либо отъ
преозлишества или недостатка частей тѣла,
либо отъ фигуры или вида, копорый видъ или
фигура естъ двоякая, либо наружная, либо
внут-

внутренняя, полости и проходы образующая, къ копорой фигурѣ или начертанію относящаяся вкупѣ и поверхностныя случайности или недоспадки, когда по есть жесткая будещъ поверхность или гладкая, слабая или рѣдкая, густая или плошная, прозрачная или темная; либо опѣ превосходной или недостаточной величины, либо опѣ непорядочнаго положенія частей, куда принадлежатъ мѣстоположеніе и соединеніе (*fitus et connexio*).

§ 696. Преизлишество частей (§ 693) называется прееспешивнымъ, когда натуральная орудная или органическая часть, копорая должна было не быть, находится въ бытности, и тѣмъ составляетъ такъ называемую погрѣшность или порокъ излишества; или когда натуральная органическая часть, копорой надлежало быть, не находится; въ такомъ случаѣ погрѣшность состоитъ въ недостаткѣ. Первый недостатокъ опѣ самаго рожденія, а послѣдній не только опѣ рожденія, но и опѣ всякихъ случайныхъ наружныхъ и внутреннихъ причинъ произойти можетъ.

§. 697. Примѣры излишества частей составляютъ шесть персповъ; четыре руки, при ятра и прочая. Недостаточными частями называются тѣ, кои безъ лишенія жизни опны быть могутъ. Таковаго произшествія примѣры составляютъ

вляющѣ отъ самаго рожденія бывающіе покло чепыре перста, или неимѣніе руки, ноги, уха, и мозгу.

§ 698. Наглое и не равное давленіе или сна- ружи причиненной ушибъ часпей пѣла нашего въ молодыхъ лѣтахъ: такъ же неравное пи- таніе костей и погрѣшность Напурь или при- роды при самомъ рожденіи, состоящая въ пере- мѣненіи натуральнаго ихъ вида или образованія, называющія пороками наружнаго начертанія или вида. Сюда принадлежатъ всѣ худыя строенія или сообразія головы, членовъ и хребетной или спановой кости.

§ 699. Пороки или недоспашки наружнаго строенія или образованія головы суть сіи: когда по есть передняя часть головы бываетъ плоска или внутрь вогнута, или когда голова на задней сторонѣ не довольно расширяется, либо когда большее бываетъ распояніе височ- ныхъ костей отъ чела и затылочной кости. Наконецъ, когда боковыя головныя кости весь- ма высоко въ верхъ выдадутся.

§ 700. Отъ недоспашковъ или пороковъ на- ружнаго начертанія или вида членовъ происхо- дящъ особыя имена: такимъ образомъ назы- вающіяся кривоногими или раскаряками (valgi) шѣ люди, у коихъ голени такъ искривленны бывающъ, что выпуклыя оныхъ поверхности одна
одна

одна стоемъ противъ другой, или одна противоположается другой; *косоногими же* (*vari*) называются тѣ люди, у коихъ ноги такое имѣютъ положеніе, что ножные персты весьма близко смыкаются между собою, а пяпы въ далекѣмъ находясь разспояны.

§ 701. *Горбъ* бываетъ (*gibbus*), когда къ груди принадлежащіе позвонки, такъ бывающъ искривленны, что выпуклость или согбенность спины назадъ выдается.

§ 702. *Рытению* или *выдутливостію* (*lordosis*), называется тогдѣ порокъ строенія тѣлеснаго, когда хребетная кость такъ бываетъ искривленна, что отъ того полость или впадина дѣлается на спинѣ и поясницѣ, а брюхо напередъ выдается.

§ 703. *Кривобочностію* (*scaliasis s. divaricatio*) называется тогдѣ недостатокъ, когда грудные позвонки на правой или на лѣвой бокаъ бывающъ искривленны.

§ 704. Еслили вся спановая кость такъ накривленна бываетъ, что выпуклая поверхность выдается въ верхъ; то таковой порокъ *нагбенностію* или *согбенностію* (*seifis s. incurvatio*) называется.

§ 706. Натуральное состояніе впадинъ есть
1) твердость и гибкость ихъ боковъ; 2) со-
держи-

держимыхъ и кругообращаемыхъ въ оныхъ шѣлъ надлежащая плавкость и жидкость, а соспавныхъ частей надлежащая величина; 3) дѣйствія происходящія отъ надлежащей величины, впадинъ или полосей.

§ 706. Почему изъ худорасположеннаго спроченія и соспоянія полосей происходятъ такъ называемыя болѣзни полосей или впадинъ, таковыя сущь: засоренія и залоры; алертура или открытїе и слабость.

§ 707. Засореніе или залоръ (*obstructio*) естъ невозможность пропускавъ надлежащимъ образомъ швердыхъ и жипкихъ шѣлъ или частей, копоры должны было бытъ пропущены.

§ 708. Алертура, отверстїе, пропущеніе, раздатїе (*apertura*) естъ немогущество удержи-
ванъ шѣхъ швердыхъ и жидкихъ частей, копорымъ надлежало бытъ задержанымъ.

§ 709. Слабость (*debilitas*) естъ немогущество двигавъ или приводивъ въ движеніе и кругообращеніе шѣхъ швердыхъ и жидкихъ частей, копоры должны было находивъся въ движеніи и кругообращеніи.

§ 710. Стѣны (§ 703) полосей или сосудовъ бывають слабы или приходятъ въ слабость либо отъ недостатка жизненныхъ со-
ковъ,

ковѢ, либо отъ распягиванія; либо отъ давленія и побужденія наружныхъ пшвердыхъ пѣлъ; либо наконецъ отъ излишняго влажностей количествѣ.

§ 711. Преестественное волоконѢ соспоянїе, причиняющее слабость (§ 707), древнїе называли *дряблостію и разслабленностію* (*laxitas antiquis vocabatur*).

§ 712. Отъ каковой разслабленности или дряблости послѣдуетъ неогуществѣ сопроти-вляющагося или пропшводѣшшовающаго, двигающагося и соединяющагося, по мѣрѣ, какъ разслабляющагося или проходящаго въ слабость волокона.

§ 713. Волокна дѣлаются чрезвычайно крѣпкими и жесткими, либо отъ излишняго употребленія крѣпкаго и нескоро варимаго питания; либо отъ недоспашка влажностей и присушности пѣхъ веществъ, копорыя разсыпаютъ влаги; каковыя суть: *теплый воздухъ и соленыя кушанья*.

§ 714. Отъ чрезвычайной пшвердоспи и жесткости волоконѢ (*sticcitas et rigiditas*), произходитъ невозможность уступать или подаваться, двигающагося и пропускающагося.

§ 815. Влагѣ дѣлаются жидкими и пекучими пѣхъ веществъ, копорыя причиняютъ желчную
худе-

худосочность; напрошивъ густыми и недѣя-
тельными все то содѣлываетъ, что причи-
няетъ и раждаетъ мокротную худосочность.

§ 716. Мокротная худосочность раждается
и производится употребленіемъ вязкихъ и холо-
дныхъ кушаньевъ; многимъ пиіемъ, холо-
днымъ и влажнымъ воздухомъ и недоспашкомъ
или малымъ употребленіемъ солей. Меланхоли-
ческая же худосочность раждается или произ-
ходитъ отъ холоднаго воздуха, употребленія
кислой пищи и пребыванія въ праздности или
продолжительнаго сидѣнія и покоя.

§ 717. Престественное пространство или
смыслище сосудовъ есть двоякое: либо по
есть бываетъ меньшее надлежащаго, и тогда
называется *смысненіемъ* (contractio), либо боль-
шее надлежащаго и въ такомъ случаѣ *разви-*
реніемъ (dilatatio) именуется.

§ 718. Всякая спячая матерія въ какой ли-
бо полости мало помалу умножается, и либо
оную совсѣмъ запираетъ; либо по крайней мѣ-
рѣ дѣлаетъ оную уже. Словомъ производитъ
завалъ или залоръ (emphraxia).

§ 719. Слѣдственно залоръ въ сосудахъ (em-
phraxia) происходитъ либо отъ зашвердѣлаго
калу, либо производится камышкомъ, либо
сѣданиемъ крови, либо соединеніемъ чуждыхъ час-

шищѣ сѣ кровавымъ соспавомъ, каковыя частицы сущѣ: виннокаменныя и земляныя (tartareae et terreae), либо отъ ввергшихся поспоронихъ веществъ въ какой либо проходъ на примѣръ: въ дыхательное горло, желудокъ и слуховой проходъ.

§ 720. Еслили какія наростѣнія запираютъ или заключающѣ пушь или пропокъ, когда по естѣ сдѣлающся наростѣнія въ какой нибудь натурально проходимой впадинѣ; по таковъ видъ запора, производитъ *путестѣненіе* или *лутесослященіе* (stenochoria). Примѣры онаго сущѣ: каракапища или кровавой закипъ въ ноздряхъ и сердцѣ, въ дыхательномъ горлѣ, легочный чирей или волдырь, находящійся въ духодвижныхъ каналахъ; наконецъ выросшшее мясо въ спволѣ.

§ 721. *Бокостѣненіе каналовъ* (thlipsis) естѣ претій видъ запора, копорый производитъ отъ ксякаго сжатія впадины и боковъ канала.

§ 722. *Разширеніе полостей или впадинъ* (§ 715) происходитъ либо отъ сильнаго спре-мленія влагъ, либо отъ слабости въ бокахъ сосудовъ, либо отъ саднѣнія и разбѣденія сосудовъ пропоковъ.

§ 723. *Отверстіе или раздатіе* (§ 706), происходящее отъ разширенія самыхъ малыхъ успѣвъ сосудовъ, причиненное большимъ спре-млені-

мленіемъ и удареніемъ жидкошей и слабостію спѣнѣ, называется устѣразширеніемъ (anastomosis). Но опверзпѣе, происходящее отъ разширенія скважихъ въ бокахъ сосудовъ пѣми же самыми причинами производимаго, называется поверазширеніемъ или раздатіемъ скважинъ (diapedesis).

§ 724. Опверспѣе, происходящее отъ порыву или разбѣденія сосудовъ, называется сосудоразбѣденіемъ (diarexis).

§ 725. Ипакъ невозможности пропускашь надлежащимъ образомъ шого, что должно быть пропущенно, причинами бывающъ либо сосудо-проходные залоры (§ 716), либо путевосященія (§ 718), либо обкостѣненія сосудовъ (§ 719).

§ 726. Невозможности задерживать жидкошей въ сосудахъ, либо скважинахъ оныхъ, супъ либо устѣразширеніе (§ 721), либо раздатіе скважинъ (§ 721), либо сосудоразбѣденіе (§ 722).

§ 727. Еспѣли пшвердыя часпи не довольно сопропивляются и проппиводѣйствующъ влагамъ и сокамъ, копторыя должны было сопропивляпшся и проппиводѣйствовашъ, хопя бы шо происходило отъ большаго спремленія или ударенія помянушыхъ влагъ, или отъ большаго соедине-

ніа часпей, либо опѣ слабости сосудныхъ волоконѣ; по вѣ таковомѣ случаѣ происходишѣ или дѣлаеиця опухоль, и болѣзни опшуда происходиця суть нешто иное, какѣ немогущества производишѣ шѣхѣ дѣйствій, которыя по причинѣ болѣзни производимы бышѣ не могутѣ и которыя довольно познавающихся изѣ припадокѣ.

§ 728. Естѣли твердыя часпи больше надлежащаго будишѣ прошиводѣйствовати влагамѣ, хотя бы того виною были самыя твердыя часпи, по мѣрѣ, какѣ онѣ преестественно соединяются между собою, или жидкія медлиннѣе и слабѣе спремиащіяся и соединяющіяся съ твердыми часпиами, либо кровяная водяность, или недоспашокѣ вѣ жизненныхѣ сокахѣ и недѣяпельность оныхѣ; по вѣ такомѣ случаѣ поришѣ естественныхѣ часпей состояніе, состоящее вѣ недоспашкѣ надлежащей величины, и называется сухотою, сухоткою или чахлостію (*atrophia five contabescencia*).

§ 729. *Нелюрядочное мѣстоположеніе*, производишѣ ненашуральное положеніе мѣспа, налр. естѣли нашуральныя часпи, которыя должны находились вѣ шѣлѣ, находяшяся вѣ онаго; или естѣли шѣ часпи, которыя по природѣ должны было находились вѣ шѣла, находяшяся во внутренности онаго. Первое непорядочное или ненашуральное мѣспоположеніе на-

называется *выпаданіемъ*, а послѣднее *стяженіемъ*.

§ 730. *Выпаданіе* (prolapsus) раздѣляется на два вида, на *выпаденіе*, то есть въ тѣсномъ или точномъ смыслѣ взятое, когда выпавшія части находятся нагя внѣ пѣла, какъ то обыкновенно случается въ *выпаденіи* или *выхожденіи* заднепроходной кишки, мапки, глаза, сальника, какъ на примѣрѣ случается въ *грыжахъ* или *килахъ*, и *навпаденіе* въ *пространномъ* смыслѣ взятое, когда то есть части, а особливо кишки, *вывалившіяся* изъ чрева, еще бывающіе покрыты кожною.

§ 731. Все, что только волокна, посредствомъ которыхъ части, внѣ пѣла находящіяся, соединяются съ пѣломъ, ко внутреннимъ приводить частямъ, производить *стягиваніе* или *стяженіе*. (§ 727); сюда принадлежащія впаженіе внутрь дѣшороднаго уда въ спарости и въ каменной болѣзни; также впагиваніе сосочковъ въ пипькахъ.

§ 732. Почему болѣзни, происходящія отъ припадка такъ называемаго *стяженія*, суть неспособности имѣть совокупленіе и чинить питаніе грудьями.

§ 733. Порочное соединеніе частей, есть неадекватное положеніе, относительно до связи

частей, и состоитъ либо въ ненатуральномъ соединеніи, либо раздѣленіи.

§ 734. Соединеніе раздѣляется опять на сращеніе и сокращеніе или сведеніе (*coalitus et contractura*); а раздѣленіе на зѣвнѣ и вывихъ (*hiatus et luxatio*).

§ 735. Сращеніе есть такое расположеніе и преестествонное состояніе, въ которомъ тѣ части, которыя поком должны быть сопредѣльны другимъ, дѣлаются непрерывными, словомъ срастаются между собою.

§ 736. Сращеніе не бываетъ, какъ только отъ самаго рожденія, на пр. сращеніе пальцевъ, языка со своею уздочкой, или когда сроснутся задній проходъ, либо пупи дѣтородныхъ частей, что наипаче случается у женскаго пола. Сращеніе причиняется также вязкою нечиспотою, либо прежде бывшею болѣзнію, причиненною ранами.

§ 737. Болѣзни, отъ сращенія происходящія, суть: немогущество производить тѣхъ дѣйствій, которыя не могутъ производимы быть тѣми частями, которыя натурально должны быть отдѣлены, а несращены.

§ 738. Скорченіе или сокращеніе есть такое преестествонное частей смѣжныхъ расположеніе, по причинѣ котораго части движущіяся между

жду

жду собою, бывающѣ противѣ напуры своей
недвижимы.

§ 739. Иногда сокращенія (§ 736) случаю-
тся отѣ рожденія, что происходитѣ тогда,
когда одна изѣ пропировдѣйствующихѣ мышицѣ
бываетѣ больше надлежащаго короще. Откуда
явствуетѣ, что все то, что только волокна
мышицѣ дѣлаетѣ противѣ напуры короще, и
пасоку находящуюся вѣ членосоединеніяхѣ дѣ-
лаетѣ вязкою и виннокаменною, производитѣ
сокращеніе или корчу.

§ 740. Почему болѣзни, происходящія отѣ
сокращенія или скорченія, называются немогу-
щесствомѣ приводитѣ вѣ движеніе скорченныхѣ
членовѣ.

§ 741. Зіаніе (hiatus) есть такое частей
разположеніе, по причинѣ котораго мягкія или
твердыя части, которыя должныствовали бытъ
безпрерывными, не находящяся вѣ соединеніи,
но либо бывающѣ смѣжныя, либо однѣ отѣ дру-
гихѣ отдаленныя; примѣры тому суть: раз-
двоенныя губы, растреснутыя сосочки и раз-
двоенной подбородокѣ.

§ 742. Зіанія причиною бываетѣ либо чрезвы-
чайная сухость, либо погрѣшность природы
при самомѣ рожденіи.

§ 743. Почему болѣзни, происходящія отъ зіянія, есплы случаются на зубахъ; по опису да производишь нечто иное, какъ неспособность хорошо говорить и пишь.

§ 744. Вывихъ (luxatio) еспь такое расположеніе или состояніе членососпавныхъ связей, въ которомъ сопредельныя и смѣжныя между собою части, не въ напульномъ находятся мѣспѣ.

§ 745. Всякая наружная или посторонняя сила, членъ болѣе надлежащую наклоняющая, можетъ причинить вывихъ. Иногда весьма сильное мышицъ спягиваніе можетъ причинить вывихъ. Какъ то нерѣдко случается съ нижней челюстію.

§ 746. Вывихи раздѣляются существенно взглядамъ степини или стороны (a gradu et plaga). Взглядомъ степини вывихи раздѣляются на соверщенные вывихи и на полувывихи. Взглядомъ спороны вывихъ раздѣляется на *вывихъ* либо на переднюю или заднюю сторону, либо на *вывихъ* *внутрь* или *наружу*.

§ 747. Полувывихъ (subluxatio) должно взимать въ двоякомъ смыслѣ. Ибо оный означаетъ либо такой вывихъ, послѣ котораго вывихнутая часть сама собою на прежнее успановляется мѣспю, или когда часть сдвигивается съ своего мѣспа и сама собою на первое не возвраща-

вращается мѣсто, однако часть вывихнутой кости еще содержится воспріемлющею оную впадиною, хотя все воспріятіе оное и не производится надлежащимъ образомъ.

§ 748. Въ вывихахъ обыкновенно случаются перемѣны въ мѣстоположеніяхъ и связяхъ.

ГЛАВА II.

О болѣзняхъ разрушеннаго соединенія или цѣлости.

§ 749. Второй родъ хирургическихъ болѣзней состояющій въ немогуществѣ или неспособности, происходящій отъ разрушеннаго частей соединенія, или болѣзни такъ называемыя разрушеннаго соединенія или цѣлости.

§ 750. Разрушенное соединеніе или цѣлость есть то состояніе, въ которомъ ни твердыя части не соединяются между собою, ни влаги, ни жидкости не имѣютъ движенія и печенія своего въ опредѣленныхъ и надлежащихъ сосудахъ; почему разрушенная цѣлость есть непосредственная причина болѣзней какъ въ жидкихъ, такъ и твердыхъ частяхъ находящихся.

§ 751. Непосредственною причиною разрушеннаго соединенія или цѣлости есть всякое па-

кое прееспешивное швердыхъ часпей состояніе, въ копоромъ жидкости не могушъ содержашься или бышъ содержимы въ своихъ предѣлахъ (или сосудахъ).

§ 752. Къ болѣзнямъ разрушенной цѣлости относяшя ушибы, порывы, раны, переломы, чирьи или вереды и костоѣды или череоточины въ костяхъ.

§ 753. Ушибъ (contusio, есть такое прееспешивное нѣкопрыхъ швердыхъ часпей состояніе, въ копоромъ жидкости не могушъ содержашься въ своихъ сосудахъ, причиненное ударомъ швердаго шупаго шѣла въ какую нибудь часпъ человеческого шѣла, однако такъ, что не все часпи опѣ шого бываюшъ разорваны, но нѣкопрыхъ еще пребываюшъ цѣлы и не находися въ нихъ очевиднаго зіянія.

§ 754. Порывъ (ruptura) есть прееспешивное состояніе нѣкихъ мягкихъ часпей человеческого шѣла такое, что влаги и жидкости не могушъ содержимы бышъ въ своихъ определенныхъ сосудахъ, учиненное нѣкопорымъ шѣломъ, многія впрочемъ распягивающимъ части, однако такъ, что зіяніе или разрывъ бываешъ примѣшенъ шокмо между нѣкопорыми часпиями шѣла.

§ 755. *Рана* (vulnus) есть такое нѣкоторыхъ мягкихъ частей человѣческаго тѣла состояніе, въ которомъ жидкости въ своихъ сосудахъ удержанны бытъ не могутъ, причиненное нѣкоторымъ твердымъ тѣломъ давящимъ, проникающимъ въ тѣло и разрѣзывающимъ всѣ волокна онаго въ томъ мѣстѣ, въ которое оно ударяется.

§ 756. *Переломъ* (fractura) есть такое преспешенное костяныхъ частей человѣческаго тѣла состояніе, въ которомъ жидкости не могутъ держаться въ своихъ надлежащихъ мѣстахъ. Переломъ причиняется какою нибудь внѣшнею поспороннею силою, а иногда и корченьемъ шынницъ.

§ 757. *Чирей или язвѣ* (ulcus) есть то состояніе мягкихъ частей человѣческаго тѣла, въ которомъ жидкости не содержащія въ своихъ хранилищахъ, и въ которомъ какъ влаги, такъ и мягкія части тѣла вкупѣ гниваютъ.

§ 758. *Виною гніенія* бываютъ худосочныя влаги, изъ сосудовъ своихъ вытекшія и пришедшія во внутреннее, то есть гниль производящее, а неспѣятельное движеніе, въ какомъ случаѣ соль и сѣра изліявшихся изъ сосудовъ своихъ влагъ какъ на самихъ себя, такъ и на ближнія части дѣйствуютъ и оныя разрушаютъ.

§ 759.

§ 759. Костоѣда или гниль въ кости (caries) есть такое состояніе костныхъ частей чело-вѣческаго тѣла, въ которомъ жидкости не держатся въ своихъ сосудахъ, но выпекши изъ оныхъ, опѣ испорченнаго внутренняго движенія вкупѣ съ костными волокнами разрушаются и сгниваютъ.

ГЛАВА III.

Объ олухолахъ.

§ 760. Болѣзни, происходящія опѣ умноженія величины (§ 725), называются олухолами или немогуществами представляющъ надлежащее начертаніе или видъ и величину тѣла такія, какія въ натуральномъ бывающъ состояніи, также производятъ тѣ дѣйствія, которыя опухуда производятъ.

§ 761. Ко классу опухолей относятся слѣдующіе припадки.

§ 762. Ячмень (hordeolum), которой нечто есть иное, какъ маленькая на ячменное зерно похожая шишечка или опухоль на глазахъ, которая происходитъ опѣ зашверденія одной изъ такъ называемыхъ Мейсеновыхъ желѣзъ.

§ 763. Бѣлая, круглая и мягкая шишечка или наростъ на внутреннихъ частяхъ глазныхъ вѣкъ, называется по Липини (grando), по Русски градъ.

§ 764. Кротъ, кротовидная олухола, грыжа (talpa), которая есть нечто иное, какъ великій и мягкій нарывъ, имѣющій величины около пяти или восьми линей Парижскихъ, находящійся подъ черепною кожей.

§ 765. Подбородочная кила или грыжа (figma), то есть опухоль, лежащая на щитовидномъ горшанномъ хрящѣ или другой какой либо шейной желѣзѣ.

§ 768. Зобы, свинухи или желевики на шеѣ (scrophulae), которые суть нечто иное, какъ опухоль многихъ шейныхъ желѣзъ.

§ 767. Тугій желевикъ, тугая олухола (scirrhus), которая есть нечто иное, какъ затвердѣлоснѣ спячей болѣзненной матеріи во внутренностяхъ или наружныхъ какихъ либо частяхъ шѣла на пр. въ грудяхъ, губахъ, въ дѣшгородныхъ частяхъ и прочая, то есть тамъ, гдѣ находится собраніе желѣзъ. Какъ то легкомъ, печенкѣ и селезенкѣ.

§ 768. Всѣ сіи опухоли то имѣютъ между собою сходство, что всѣ происходятъ отъ вязкой

вязкой влаги, и слѣдственно опѣ мокротною худосочности (sасoschīma), или опѣ стоячей матеріи въ концахъ и вѣтвяхъ сосудовъ, либо опѣ большаго дѣйствія шѣлеснаго, копорымъ влаги иногда къ одному мѣсту съ большимъ стремленіемъ низливаются.

§ 769. опѣ шѣхъ же самыхъ причинъ производящѣ отеки, бубоны или паховыя олухоли и жабы.

§ 770. Отекъ (oedema) есть опухоль на ногахъ мягкая, равномерная, великое разспяніе занимающая, копорую ешѣли пожаръ перешомѣ, по ямка и по опняшіи переста оспаеаъ на пожаромѣ мѣспѣ.

§ 771. Бубонъ или паховыхъ (bubo) есть по большей части твердая паховыхъ желѣзъ опухоль, соединенная съ весьма великою болью. Бубоны по большей части происходятъ опѣ любострастной жизни, а иногда и опѣ моровой заразы, въ какомъ случаѣ называются вообще однимъ словомъ чумою (bubo pestifentialis).

§ 772. Жаба (gana) есть опухоль миндаловидныхъ зѣвныхъ желѣзъ, соединенная съ воспаленіемъ подъязычныхъ частей и самаго иногда языка

§ 773. Ракъ (cancer, carcinoma) есть опухоль желѣзистыхъ частей, а особливо пипечныхъ,

копо-

которая сперва бываетъ величиною съ горошину и не болитъ, потомъ мало помалу умножается и причиняетъ боль, первѣе пягошипельную, а потомъ такъ сказать грызучую и ѣдкую, съ нервною опохолью или напряженіемъ ближнихъ крововозвратныхъ жилъ.

§ 774. *Аневризма*, *кровонабитіе* или *обесжилная опухоль* (aneurisma) есть раздупіе въ волдырь поврежденной боевой жилы, которое иногда весьма велико бываетъ.

§ 775. *Жилонатяженіе* или *вахлакъ* (varix) есть мягкая, синяя и колѣнчатая опухоль поврежденной крововозвратной жилы.

§ 776. *Жилонатяженная грыжа* (hernia varicosa) есть опухоль или напряженіе крововозвратныхъ жилъ въ мошонкѣ.

§ 777. Всѣ сіи опухоли въ томъ сходствуютъ между собою, что предполагаютъ причину своего происхожденія либо нѣкоторую вязкость, которою нешюкмо расслабляются мясистыя волокна, но и проходы засариваются и запираются; либо нѣкоторую внѣшнюю силу, расслабляющую и разрывающую волокна; либо большее стремленіе или побужденіе, происходящее какъ отъ запора, такъ и отъ великаго стремленія влагъ по причинѣ вязкости или спѣсненія сосудовъ; также и отъ слабости спѣнъ, причиненной внѣшнею силою.

§ 778

§ 778. Опѣ вышесказанныхъ причинѣ, из-
ключая разслабленность сосудныхъ спѣнѣ, про-
исходящѣ также и нижеслѣдующія опухоли.

§ 779. Грыбѣ, грибообразное наростѣнне
(fungus) естѣ грибчатая мягкая и безболѣзнен-
ная опухоль сухихъ жилѣ, наипаче около ко-
лѣнѣ случающаяся. Когда паковая пухлина
естѣ еще малая; то ее можно вкупѣ сѣ сухою
жилою передвигивитѣ сѣ мѣспа на мѣспо, на
правую то естѣ и лѣвую спорону.

§ 780. Сухожильной желвакѣ (ganglion) естѣ
твердая и безболѣзненная опухоль на сухихъ
жилахѣ.

§ 781. Мясистая шулятина грыжа или жи-
ла (sarcocele), копорая естѣ нечто иное, какѣ
мягкая яспренная опухоль, опѣ разширенія мя-
сиспыхѣ волоконѣ происходящая.

§ 782. Мяистой наростѣ (sarcoma) естѣ
мясиспая пухлина мягкая, великая и безболѣ-
зненная, иногда величиною сѣ голову бывающая,
копорая по большей части случаетѣся на ниж-
ней челюспи.

§ 783. Сюда также опносятся каракатица
въ ноздряхѣ (polipus naŕium), выросшнее мясо
въ стволѣ, всякія мозоли, (clavi), какѣ по
мозоли на ногахѣ, и прочая и бородавки
(verrucae).

§ 784.

§ 784. *Дикое мясо* (caro luxurians) есть мясовидной наростъ, происходящій отъ наростѣнія мясистыхъ уязвленныхъ или израненныхъ частей пѣла.

§ 785. *Дикое мясо въ мозгу* (fungus cerebri) есть мясное, мягкое, ноздревашное наростѣніе, отъ поврежденія пшвердой мозговой оболочки происходящее.

§ 786. *Дикое мясо въ глазу* (encanthis) есть наростъ слезнаго мяща въ глазу.

§ 787. *Дикое мясо на деснахъ* (epulis), есть наростъ на деснахъ, происходящій отъ разпухлости мясистыхъ волоконъ.

§ 788. *Заднепроходныя шишки* (condylomata) суть пшвердые мозолистые наросты, на внутренней оболочкѣ задняго прохода.

§ 789. *Гребнеподобныя шишки* (crueta) суть мясныя наростѣнія около задняго проходу или дѣшпородныхъ удовъ, имѣющія видъ пепушьяго гребня.

§ 790. *Дикое тимяновидное мясо* (thymus) есть мясистой наростъ около дѣшпородныхъ частей или задняго прохода, видомъ и цвѣшомъ похожей на шиміановъ цвѣшъ.

§ 791. *Рогообразныя шишки* (cornua) суть оспроглавыя наросты, подобныя бородавкамъ; но нѣсколько ширѣе и швердѣе оныхъ.

§ 792. *Костенаростѣнія или любострастныя* костныя олухоли (gummata gallica), суть швердые наросты или пухлины, по большей части случающіяся на берцовыхъ костяхъ, копорыя чемъ больше болящъ, тѣмъ большее бываетъ подозрѣніе о любострастномъ ядѣ, опъ копорого онѣ свое получили происхожденіе.

§ 793. *Фрянки, любострастныя ослеподобныя* наросли (variola magna) суть не что иное какъ опухоли на кожѣ, подобныя настоящимъ оспинамъ, однако безъ лихорадки и безъ гною. Таковыя наросли происходящъ опъ невоздержной и любострастной жизни.

§ 794. *Колтунъ* (plica polonica) есть нечто иное, какъ умноженіе пугой пухлины на черепной или бородной кожѣ вкупѣ съ сплешеніемъ и курчавостію волосовъ.

§ 795. Всѣ сіи опухоли, пухлины и наростѣнія въ томъ сходствующъ между собою, что имѣющъ причиною своея случайности какое нибудь прежде учиненное поврежденіе, и произшедшее опшуда засорѣніе или запоръ; далѣе волокна по причинѣ того же поврежденія учинившіяся слабыми, наконецъ великой недо-
спашокъ

ешпашокъ хорошаго пипашельнаго сока. А раз-
личествуюшѣ въ помѣ полько, чпо наросты
наипаче около задняго прохода, дѣпородныхъ
удовъ и на костяхъ, еспѣли они произошли
отъ невоздержной жизни, по причинѣ соедине-
нїя съ ѣдкими солями, великую причиняюшѣ
боль.

§ 796. Къ опухольмъ, происходящимъ отъ
выше (§ 793) сказанныхъ причинъ, относяся
еще и пакъ называемыя оболочечныя или пле-
вныя олухоли либо волдыри (*tunores tunicati*).

§ 797. Каковыя сушѣ: медозникъ или пле-
еный не большій желеакъ (*meliceris*), копорый
еспѣ нечпо иное, какъ волдырь, желшую маше-
рію подобную меду въ себѣ содержащій. Сюда
относїшся и легкопный волдырь или пузырь
съ гноемъ въ легкомъ (*vomica pulmonum*).

§ 798. Кашникъ или безболѣзненный жел-
вакъ на тѣлѣ (*atheroma*), копорый еспѣ нечпо
иное, какъ пухлина или волдырь въ собспвен-
ной плевѣ заключающійся, имѣющій въ себѣ
подобную кашїцѣ машерію.

§ 799. Салъникъ или салъный волдырь на
тѣлѣ (*steatoma*), копорый шо еспѣ содержишѣ
въ собспвенной плевѣ своей салу подобную ма-
шерію.

ГЛАВА IV.

О чирьяхъ или вередѣхъ.

§ 800. Чирьи и вереды (ulcera) раздѣляются либо вразсужденіи лица, которое ими страдаетъ, либо въ разсужденіи матеріи и опасности, либо въ разсужденіи степени и возраста.

§ 801. Въ разсужденіи лица вереды раздѣляются на всеобщіе или всебѣлесные, и частные или помѣстные.

§ 802. Въ разсужденіи матеріи вереды раздѣляются на мокротные, сухіе и бѣдкіе или ядовитые (fangosa).

§ 803. Въ разсужденіи опасности вереды раздѣляются на добрые и злые.

§ 804. Въ разсужденіи мѣста вереды раздѣляются на упорные или труднолечимые и заразительные или раскидывающіися (serpentina ulcera).

§ 805. Въ разсужденіи степени вереды раздѣляются на поверхностные и глубокіе.

§ 806. Въ разсужденіи времени вереды раздѣляются на свѣжіе и застарѣлые.

§ 807. Къ повсепбѣлеснымъ вередѣмъ (§ 799) принадлежатъ нѣ, которые происходятъ отъ

вене.

венерической болѣзни. Такъ же проказа и короста.

§ 808. Проказа, которую Греки, такъ сказать, слоновостию или кожеморщивательною коростою называющѣ (lepra s. elephantiasis) есть нечто иное, какъ злые и заразительные сухіе вереды или раны чешуицащія и вонючія по всему тѣлу разкинувшіяся, шаковаго рода болѣзнь происходишѣ отъ весьма великой порчи въ сокахъ и черной желчи, въ тѣлѣ избыточествующей.

§ 809. Къ частнымъ или помѣстнымъ вердамъ или чирьямъ (§ 799); и припомъ хорошимъ принадлежащѣ, садно или изолрелость кожи, лишай, летучи или мышьи огонь, огнишъ, млечная пѣнка или мокротыя нористыя раны на головѣ, гостецъ, ячеичатыя болячки на маковѣ, болячая сыль ворту или молошница: щели или растрещины, водяные пузырьки, зудная сыль и востцы.

§ 810. Изолрѣлость (atrita, hydroa, intetrigo) есть болячка, развѣденіе или ссадка на тѣлѣ съ нѣкоторымъ зардѣніемъ соединенная, причиненная ѣдкою и сѣрною солью, которая сползаетъ во внѣшнихъ сосудахъ и не испражняется ни попомъ, ни мочею.

§ 811. Лишай (lichen, ferrigo) есть поверхностная болячка, соединенная съ лупленіемъ кожи.

Лишай происходиѣтъ отъ желчной худосочности.

§ 812. *Летучей огонь* (herpes) есѣтъ поверхностная болячка, нѣсколько болѣе и мокрѣе лишая, съ болью и жаромъ соединенная: Цельсѣ называетъ сію болячку *адскимъ или проклятымъ огнемъ* (ignis sacer).

§ 813. *Млечная лѣпка*, *огниѣхъ или гостецѣ* (crusta lactea f. achores) сущѣ маляинкѣя глубокѣя ранки на лицѣ у младенцевѣ.

§ 814. *Моль*, *соты*, *шелуди или ларши* (favi) сущѣ мокротинныя глубокѣя раны на головѣ, соединенныя съ вылезаніемъ волосѣ.

§ 815. *Молошница* (aphthæ) есѣтъ нечто иное, какѣ поверхностныя бѣлыя ранки или пупырышки, ѣдкую и оспрую соляную водяноспѣ вѣ себѣ содержащѣе, копорые случаются во рту и на языкѣ у младенцевѣ, также у спраждущихѣ худыми лихорадками и наконецѣ у чахотныхѣ людей, вѣ какомъ случаѣ великую означающѣ опасность.

§ 816. *Растрецины* (fissuræ) сущѣ поверхностныя продолжительныя раны, подобныя скважинамъ или щелямъ, отъ чрезвычайной засухи происходящѣя. Таковыя растецины бывающѣ на губахъ, пишкахъ, рукахъ и ногахъ.

§ 817.

§ 817. *Водяныя лузырки* (hydatides, phlyctenæ) суть маленькіе свербячіе, соленою водянистою наполненныя, пупырышки, на ручныхъ кистяхъ и между пальцами взбѣгающіе.

§ 818. *Зудная сыль* (sudamina) есть нечто иное, какъ выше помянутыя меньшіе пупырышки, величиною съ пшечное, копорые вездѣ на кожѣ случаются.

§ 819. *Чернозудная сыль на тѣлѣ или сос- тцы* (sigones) суть маленькія черныя ранки, на ладоняхъ и подошвахъ случающіяся, соединенныя съ великимъ зудомъ и свербобою; что касается до величины оныхъ, то оныя бывающѣ меньше пшечнаго зернышка. Сіи ранки содержатъ въ себѣ погоже имени маленькія животины.

§ 820. Къ частнымъ или помѣстнымъ злымъ ранамъ (§ 801), относяся: *чахотка*, *нора*, *рытликъ* или *свищъ*, *шелуди* и *кожесморте- сательная короста* или *Арабская проказа*.

§ 821. *Чехотка* (phthifis) есть вередъ въ легкихъ, копорымъ соединенъ бываетъ либо съ лихорадкою, либо бываетъ безъ лихорадки.

§ 822. Признаки чехотныя имѣются сіи: съ начала болѣзни харкошина бываетъ вязкая, бѣлая и въ великомъ извергается количествѣ; потомъ мало помалу спановишся гнойною, а

нерѣдко и съ кровью смѣшивается, Гнойная харкопина, будучи брошена на огонь, издаетъ весьма негодный запахъ, и еспли бросишь ее въ сосудъ наполненный водою, то опускается на дно. *Потомъ* приступаетъ лихорадка, рѣніе бываетъ въ щекахъ и хрипоша; моча высекаетъ щелочная, со многою осадкою бѣлою, желтою или рыжею. Давленіе и пѣсноша въ въ груди, а иногда и оспрыя боли. Трудное дыханіе и одышка или задыханіе; великая жажда; испощипельныя подъ вечеръ бывающія поппѣнія. Поносъ. Опухоль на ногахъ; звонкіи голосъ; вылъзаніе волосовъ и шрупоподобное или чрезвычайно изхудалое лице.

§ 823. Причиною чахопки бываютъ желчная и мокротная худосочность, отъ чего производящая заспой влагъ по причинѣ ихъ вязкости въ самыхъ малыхъ легкотныхъ сосудахъ, а влаги, стоя недвижимо, спановящая ѣдкими, нечиспыми и солеными. Такъ же чрезвычайныя пролипія крови, каковыя суть: великія кровопеченія изъ носа и ранъ, остановленіе всѣхъ обыкновенныхъ испражнений на пр: гемороя, мѣсячины у женщинъ, кровопусканій, кровоочищений, бывающихъ у женщинъ послѣ родовъ. Испорченное и худое спроеіе шѣла, какъ на пр: шѣсная и изкрывленная грудь, великое простуженіе шѣла, вогнанная внутрь короспа, кровохарканіе (hæmoptifis) и излишнее употребленіе крѣпкихъ напитковъ.

§ 824.

§ 824. Чшо принадлежитъ до предсказанія окончанія чахопки , по надлѣжитъ примѣчать слѣдующее: чшо по естъ окончаніе чахопки всегда подвержено бываесть сомнѣнію ; и чшо чахопка почпи всегда бываесть смертоносна. Слѣдспвенно весьма за худые почипающія признаки дыханіе ; съ превеликою трудностію соединенное , голосъ чрезвычайно хрипливый, пугія опухоли подѣ мышками величиною съ греческой орѣхъ. Ночныя потѣнія , приводящія пѣло въ превеликую слабость, кашель и великая жажда ; малое и слабое біеніе въ жилахъ; великая пощнопа ; опухоли на ногахъ ; уменьшеніе тною при изверженіи хархопины , прупной запахъ изъ рта. Вонючей желповаааго цвѣту поносъ, и вылезаніе волосоеъ; ибо въ такомъ случаѣ смерти скоро ожидашь должно.

§ 825. *Рытикъ или нора* (sinus) естъ глубокий и широкій вередъ , имѣщій узкое , но немозолистое отверстіе.

§ 826. *Свищъ* (fistula) естъ глубокий долгій вередъ , имѣющій узкое отверстіе , коего края вязкою зашвердѣлою склизью наподобіе кожи сущь обведены.

§ 827. *Шелуди* (tinea) сущь глубокія язвыны на головѣ.

§ 828. *Арабская проказа* (elephantiasis Arabum) естъ опухоль на ногахъ красная , синяя и чер-

новашая, съ пресѣкающимися чирьями въ длину раскидывающимися и оспрую маперію проливающими. Раны поверхность пѣла дѣлающъ морщиноватую, а нерѣдко и шелуховатую.

§ 829. Костоѣда или червоточина въ кости (caries) раздѣляется на настоящую червоточину и на вѣтренную остъ или внутрькостную и околосвязную костную гниль.

§ 830. Червоточина въ кости въ собственномъ смыслѣ взятая, называется всякое развѣденіе въ костяхъ, происходящее отъ внутренней причины, отъ оспрой и ѣдкой сползшей изъ сосудовъ своихъ выпекшей влаги.

§ 831. Вѣтренная остъ, или внутренняя гниль (spina ventosa) есть развѣденіе костей, облеченнымъ своими натуральными покровами.

§ 832. Околосвязная костоѣда или гниль (pedartrocase) называется развѣденіе костей, около связей оныхъ случающееся.

§ 835. Килы или грыжи (herniae) раздѣляются въ разсужденіи мѣста, на пулочныя и паховыя; а паховыя опять раздѣляются на простыя и мошонковыя. Всѣ же вообще на свободныя и заключенныя (incarceratae herniae).

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ.



*

*

*

АНАТОМИЧЕСКІЯ ТАБЛИЦЫ

ИЛИ

КАРТИНЫ,

Изображающія всѣ части человѣческаго тѣла, какъ наружныя, такъ и внутреннія, изъ коихъ каждая на своемъ мѣстѣ въ сей части кииги суть описанны, а здѣсь представленны такимъ порядкомъ, каковъ могъ быть вразумительнѣе и понятнѣе для начинающихъ обучаться раздробленію человѣческаго тѣла, познавать связь частей онаго и изслѣдывать естественное ихъ мѣстоположеніе.

Quam iucundum et quam necessarium nosse
partes machinam corporis nostri constituentes.

Фигура первая, показывающая образъ живаго человека, на которомъ какъ внѣшнія чревныя части, такъ и ощутительныя подъ кожею жилы зрѣнію предспавляются.

- | | |
|--|---|
| <p>А. Правая верхняя боковая часть живота, правой вздохъ. <i>Hypochondrium dextrum.</i></p> | <p>Л. Головная или внѣшняя кровезовратная правого рама жила. <i>Vena cephalica brachii dextri.</i></p> |
| <p>З. Лѣвая верхняя боковая часть живота, лѣвой вздохъ. <i>Hypochondrium finistrum.</i></p> | <p>М. Кровезовратная внутренняя правого рама или руки жила. <i>Vena basilica brachii dextri.</i></p> |
| <p>СС. Наружная часть брюха, обрѣщаемая между пупомъ и лономъ, подбрюшная сторона. <i>Epigastrium.</i></p> | <p>Н. Кровезовратная средняя локотная жила, копорая по различію тѣла различно на рукѣ проходитъ. <i>Vena mediana.</i></p> |
| <p>DD. Наружныя чревныя подреберныя, подвздошныя части. <i>Иа.</i></p> | <p>О. Головная кровезовратная жила лѣваго рама или лѣвой руки. <i>Vena cephalica sinistra.</i></p> |
| <p>ЕЕ. Внѣшняя часть брюха, между пупомъ и вздохами лежащая. <i>Hypogastrium.</i></p> | <p>Р. Внутренняя кровезовратная лѣвой руки жила. <i>salvatella brachii sinistri.</i></p> |
| <p>FF. Пахи. <i>Inguina.</i></p> | <p>QQ. Берцоплюсовая наружная кровезовратная низходящая жила. <i>Saphæna descendens.</i></p> |
| <p>Г. Надбѣпородная часть, волосами покрываая. <i>Pubis regio.</i></p> | <p>RR. Сѣя же самая жила, на сѣмой уже ногѣ или стопѣ разпроспировающаяся. <i>Saphæna in ipso pede.</i></p> |
| <p>Н. Чельная, на челѣ проходящая кровезовратная жила. <i>Vena frontis.</i></p> | <p>SS. Лядейная, надвертлужная кровезовратная жила. <i>Vena ischiadica.</i></p> |
| <p>И. Височная кровезовратная жила. <i>Vena temporum.</i></p> | |
| <p>К. Шейная внѣшняя кровезовратная жила. <i>Vena jugularis externa.</i></p> | |

Фигу-

Фигура впорая, показывающая покровы человеческого плѣла и опкрышыя подѣ оными мышцы.

АА. Кожица. Cuticula.

ВВВВ. Кожа. Cutis.

СССС. Жирѣ, тукѣ. Pinguedo.

ДДДД. Мясистый покровѣ подѣ кожей. Panniculus carnosus.

ЕЕ. Нѣкоторая опкрытая часть грудныхъ мышцъ. Pars detecta musculorum pectoralium.

FFF. Нѣсколько началъ переднихъ большихъ зубчатыхъ мышцъ. Aliquot initia serratorum anticorum majorum musculorum.

GGHHII. Чревные, косонизходящїя, на своемъ мѣ-

стѣ лежащїя, мышцы. Musculi abdominis oblique descendentes in suo situ.

ГНН. Зубчатые оныхъ начала. Initia eorum dentata.

IIII. Сухая жила косонизходящихъ мышцъ, подѣ которыми явственными кажутся прямые чревные мышцы, съ круглыми ихъ окончанїями. Tendo oblique descendantium musculorum, sub quibus recti abdominis musculi, cum nervosis inscriptionibus transparent.

КК. Бѣлая полоса, на чревѣ или на животѣ лежащая. Linea Abdominis alba.


ело-
мы-

ицы.
lique
itu.

на-
den

ониз-
подъ
ыми
чрев-
кру-
ями.
den-
qui-
mus-
scrip-

ревъ
цая.



Таб
шая,
или ч
и девя
жасть
шины,

Фиг
шая п
позво
зерцае
буквы
аааа.
пер
ро
бран
мил

Фиг
шая за
звонко
а. Дыр
гов
мед

в. По
Pro
ссс. К
cessu
д. Остр
Sp

Фиг
шая
подвд
ной ко
онная
слихъ.

Таблица вторая десять фигуръ представляющая, изъ коихъ семь показывають брюшныя или чревыя кости; двѣ осьмая по естъ и девятая чревыя мѣшцы, а десятая изображаетъ положеніе частей по снятіи брюшины, зрѣнію представляющихся.

Фигура 1. изображающая пять поясничныхъ позвонковъ, спереди соображаемыхъ, на коихъ буквы:

аааа. Представляютъ поперечныя позвонковъ отростки. *Processus vertebrarum transversos expriment.*

Фигура 2. изображающая заднюю сторону позвонковъ;

а. Дыра для спинной мозговой жилы. *Foramen pro medulla spinali.*

bb. Поперечные отростки. *Processus transversi.*

сссс. Косые отростки. *Processus obliqui.*

d. Остроконечный отростокъ. *Spina.*

Фигура 3. изображающая внутренній видъ подвздошной или лонной кости такъ, какъ она находится во взрослыхъ людяхъ. Сія кость

по положенію сочинителей состоить изъ трехъ другихъ костей, каковыя суть:

A. Подвздошная кость. *Os ilium.*

BB. Сѣдалищная кость. *Os coxendicis.*

C. Лобковая, надъпердняя кость. *Os pubis.*

Фигура 4. изображающая внѣшній видъ подвздошной, безименной или лонной кости, на коей опять примѣчательны суть:

A. Подвздошная кость. *Os ilium.*

аа. Спина или верхній край подвздошной кости. *Spina ossis ilii.*

B. Сѣдалищная кость. *Os coxendicis.*

CC. Лобковая кость. *Os pubis.*

Фигу-

Фигура 5. изображающая внутреннй видъ крестцовой кости, на которой примѣчательны суть :

а а а. Дыры, пропускающіе нервы или чувствительныя жилы. *Foramina nervos demittentia.*

б. Три частицы копчиковой кости. *Tres particulae coccygis.*

Фигура 6. изображающая внѣшней видъ той же кости, на которой примечательны суть :

а. Дыра, пропускающая низходящую спазовую жилу. *Fovea pro medulla dorſi descendente.*

ббб. Меньшія дыры для проходящихъ нервъ.

с. Копчиковая кость. *Os coccygis.*

Фигура 7. изображающая въ особливости подвздошную лонную кость такъ, какъ она находится въ младенцахъ. Здѣсь примѣчательны суть :

А. Подвздошная кость, немножко отъ прочихъ отдѣленная. *Os ilum a reliquis non nihil distans.*

ВВ. Сѣдалищная кость. *Os coxendicis.*

сс. Лобковая кость. *Os pubis.*

а а. Щели, раздѣляющія сѣдалищную и лобковую кости. *Fissurae os coxendicis et os pubis distinguentes.*

Связь всѣхъ сихъ чревныхъ костей должно смотрѣть на 17 таблицѣ.

Фигура 8. изображающая чревные мышцы, каковыя суть :

А. Косо низходящая чревная мышца, находящаяся не въ натуральномъ положеніи, но на лѣвую сторону закрывленная. *Musculus abdominis oblique desceadens.*

а а. Сей мышцы зубчатая начала. *Initia eius dentata.*

бб. Бѣлая брюшная полоса оканчивающаяся. *Tendo eius lineae albae abdominis inhærens.*

В. Косо восходящая брюшная мышца. *Musculus abdominis oblique adscendens.*

Сія мышца около произхожденія своего есть зубчатая.

ссс. Мышца сего начала или произхожденіе. *Initium huius musculi.*

О: d d. Часть сухой жилы, ко п о р а я покрываетъ прямую чревную мышцу. *Portio tendinis rectum operientis.*

сб- е с. Прямая чревная мышца. *Rectus musculus abdominis.*

на Фигура 9. чревные же мышцы изображающая. Здѣсь примѣчанія заслуживаютъ:

А. Поперечная, при началѣ своемъ отрѣшенная, мышца. *Musculus transversalis, in principio solutus.*

а а а. Мышцы сего происхожденіе. *Initium hujus musculi.*

б б. Часть сухой жилы. *Portio tendinis.*

В. Прямая чревная мышца. *Musculus abdominis rectus.*

с. Ея происхожденіе. *initium eius.*

д д д. Сухожильныя ея прирѣженія или приращенія. *Inscriptiones nervosae.*

е. Конечъ или окончаніе сего мышцы. *Finis.*

С. Задней видѣ другія прямыя мышцы.

Часть IV.

д. Кровевозрастная и бѣющая питательная жила, по сей мышкѣ нисходящая. *Vena et arteria mammaria descendens.*

е. Кровевозрастная и бѣющая подчревная, вверхъ идущая жила. *Vena et arteria epigastrica ascendens.*

Г. Соустіе кровевозрастныхъ жилъ. *Anastomosis venarum.*

Г Г. Брюшина, по снатіи мышцъ глазамъ представляющаяся. *Peritoneum musculis denudatum.*

Д Д. Пирамидальныя мышцы. *Musculi pyramidales.*

Е Е. Продолженія брюшины, въ мощну нисходящую. *Processus peritonaei in scrotum descendentes.*

Фигура 10. тѣ же самыя, и вкупѣ другія чревные части, показывающая:

А. Открытая часть грудной мышцы. *Pars rectoralis musculi detecta.*

В. Грудная кость, грудины. *Os sterni s. pectoris.*

С. Желудокъ, нѣкоторымъ образомъ подѣ печенью скрывающийся. *Ventriculus*

Ф

- culus sub pectore aliquo-
modo oculatus.
- D. Печенка. Jecur.
- E. Сальникъ въ натураль-
номъ положеніи. Omentum in suo situ.
- b. Часть онаго, посред-
ствомъ которой соеди-
няется онъ съ печенкою.
- сс. Часть, соединяющаяся
съ желудкомъ.
- d d d. Сальничный остатокъ,
покрывающій кишки.
- ff. Кишки, въ натураль-
номъ находящіяся поло-
женіи. Intestina, in suo
situ hærentia.
- G. Пупочная кровезоврат-
ная жила. Vena umbili-
calis.
- H. Связка или придѣлочка
мочевого пузыря. Liga-
mentum vesicæ.
- Сія связка составляется изъ
мочеточнаго зародыше-
ва канала, двохъ бѣю-
щихъ пупочныхъ жилъ
и одной кровезоврат-
ной жилы. Fitex uracho,
duabus arteris umbilicali-
bus et una vena.
- i. Дно мочевого пузыря.
Fundus vesicæ.
- а а а а. Раздѣленная, раз-
рѣзанная брюшина. Peri-
tonæum divisum.




оам-
bill-

очка
iga-

изъ
ше-
ію-
илъ
м-
cho,
ali-

рл.

аз-
eri-





и б
жел
цы
или

ЮЩ
ЖЕЙ
А А

а а
В В

В Н

CC

D 1

III:

И

A

B

Таблица претія, представляющая сальникъ и брыжейку, пищепрѣмное горло и его мышцы, желудокъ и кишки, кишечныя плѣвы, мышцы заднепроходной кишки и шестую пару нервъ, или чувствительныхъ жилъ.

Фигура 1. изображающая сальникъ и брыжейку.

А А А А. Разширенная, разтянутая брыжейка съ присоединенными къ оной кишками. *Monfenterium explicatum cum adiacentis intestinis.*

а а а а. Брыжейныя желѣзы. *glandulae mesenterii.*

В В В. Брыжейные сосуды, къ кишкамъ идущіе. *Vasa mesenterii.*

С С. Проведенная часть ободочной кишки. *Coli pars protracta.*

Д Д. Часть сальника, вверхъ поднимаемая. *Pars omenti sursum deducta.*

Фигура 2. изображающая пищепрѣмное горло и его мышцы.

А А. Первая пара мышцъ пищепрѣмнаго горла, или пара головогорловыхъ мышцъ. *Primum par gulæ sive cerphalopharyngeorum.*

В В. Вторая пара мышцъ пищепрѣмнаго горла, или пара мышцъ крылообразной кости и пище-

прѣмнаго горла. *Pars secundum musculorum gulæ sive pharyngeorum.*

С С. Третья пара мышцъ шилообразнаго опресника и пищепрѣмнаго горла. *Pars tertium stylopharyngeorum.*

Д Д. Сжимающая пищепрѣмное горло мышца. *phincter gulæ.*

Е Е Е. Задней видъ пищепрѣмнаго горла. *Gulæ facies posterior.*

Г. Вышняя лѣвая нервъ шестой пары. *Nervus externus sinister sexti paris.*

Г. Правая вышняя нервъ шестой пары. *Dexter nervus externus sexti paris.*

Н. Вышнее или лѣвое отверстие или устье желудка. *Orificium ventriculi superius, s. cardia.*

І І І. Дно желудка. *fundus ventriculi.*

К. Низшее или правое устье, правой проходъ Желудка, съ присоединенною къ нему частью двенадцатиперстной кишки. *Pylorus cum portione duodeni.*

Фигура 3. по же самое показывающая.

А А. Спереди видны головогорловые мышцы. *Musculi cephalopharyngæi anteriorius conspicui.*

В В. Крылообразной кости и пищепрѣмного горла мышцы. *Musculi ipheopharyngæi.*

С С. Шилообразного отростка и пищепрѣмного горла мышцы. *Stylopharyngæi.*

Д Д. Раздѣленная пищепрѣмного горла сжимательная мышца. *Sphincter gulæ distractus.*

Е. Внутренний видъ пищепрѣмного горла. *Facies gulæ interna.*

Ф. Низходящая часть пищепрѣмного горла.

Фигура 4. изображающая желудокъ съ кишками.

А. Вышнее или лѣвое отверстие желудка, ниткою перевязанное. *Orificium superius s. cardia, filo constricta.*

В. Нижнее или правое отверстие желудка. *Pylorus.*

С С. Общая оболочка или плѣва желудка, отъ онаго отдѣленная. *Communis tunica ventriculi ab eo separata.*

Д. Собственная первая желудочная или средняя плѣва. *Media ventriculi.*

Е. Собственная другая или внутренняя, самая пость низшая желудочная плѣва. *Intima ventriculi.*

Ф. Часть двенадцати дюймовой или первой пищепрѣмной кишки. *Pars duodeni.*

Г Г. Тощая, порожняя, другая кишка. *Jejunum intestinum.*

Н Н. Подвздошная, многоизлучистая, третья кишка. *Intestinum ileum.*

І. Слѣпая кишка. *Cæcum intestinum.*

К К. Ободочная кишка. *Colon.*

Л. Открывшая заслоночка вначалѣ ободочной кишки. *valvula in principio coli aperta.*

М. Начало заднепроходной кишки, перевязанное ниткою. *Initium recti filo constrictum.*

Фигура 5. изображающая кишечные плѣвы.

Р Р. Отдѣленная общая кишечная плѣва. *Tunica intestinalium communis separata.*

Q. Средняя кишечная плѣва, первая изъ собственныхъ кишечныхъ плѣвъ. *Tunica media, prima propriarum.*

Фигу-

Фигура 6. изображающая по же самое, что и пятая.

R. Самая низшая кишечная плѣва, другая изъ собственныхъ плѣвъ; иначе *морщиноватая* называемая. *Rugosa intestinorum.*

Фигура 7. изображающая плѣвы заднепроходной кишки.

M. Отрѣзанная заднепроходная кишка. *Intestinum rectum abscissum.*

N N. Двѣ подъемныя заднепроходней кишки мышцы. *Duo recti levatores.*

O. Сжимательная заднепроходней кишки или прохода мышца. *Sphincter recti f. ani.*

Фигура 8. изображающая шестую пару нервовъ или чувствительныхъ жилъ.

4. Нерва шестой пары съ правой стороны. *Nervus sexti paris in latere dextro.*

A A. Внешняя большая вѣтвь. *Ramus externus major.*

a. Вѣточка съ вѣтви, идущая къ затылку. *Ramus ad cervicem veniens.*

b. Вѣтка седьмой пары, соединенной съ шестой парой, которая вѣтка идетъ къ затылку.

c. Нерва седьмой пары, соединяющаяся подъ черепомъ съ шестой парой. *Nervus septimi paris, sub cranio sexto conjunctus.*

d. Вѣтка нервы, идущая къ языку.

e. Вѣтвь отъ седьмой пары происходящая, идущая къ роговой язычной кости. *Ad os hyoidis.*

f f. Нерва, отъ внешней вѣтви шестой пары происходящая и идущая ко внутреннимъ мышцамъ глотки. *Nervus ad internos laryngis musculos veniens.*

g g. Назадъ возвращающаяся правая нерва. *Nervus recurrens dexter.*

h h. Многія маленькія чувствительныя жилки, разсѣлавшіяся по легкомъ и дыхательномъ горлѣ. *In pulmonem et asperam arteriam distributi nervuli.*

iii. Раздѣленные вѣтки правой желудочной нервы. *Rami stomachici dextri nervi distracti.*

V V V. Внутренняя или ребренная вѣтвь безъ сдѣшенія жилъ. *Ramus internus f. costalis gangliis denudatus.*

- Δ. Слѣпеніе чувствительныхъ жилъ въ брыжейкѣ, окруженное нѣсколькими мозолистыми шѣльцами. Plexus mesenterii nerveus.
11. Вѣшъ къ салнику, двѣ на пщипидюмовой кишкѣ и печенкѣ идущая. Ramus ad omentum, duodenum et hepatis.
- т т. Вѣшъ, идущая къ правой почкѣ. Ramus ad renem dextrum veniens.
- п п п п. Вѣшви, раздѣлившіяся по брыжейкѣ и кишкамъ. Rami per mesenterium et intestina diffusi.
- с. Нерва, идущая ко крестцовой кости. Ramus ad os sacrum veniens.
- р р. Конѣцъ внутренней правой вѣшви, теряющей-ся въ маткѣ и мочевомъ пузырьѣ.
- сг. Вѣшочки, отъ внутренней правой вѣшви происходящія, составляющія на той же сторонѣ слѣпеніе чувствительныхъ жилъ.
- ♀. Нерва шестой пары въ лѣвомъ боку или съ лѣвой спороны, которой раздѣленіе шѣми же буквами означаеся, какъ и съ правой спороны, исключая одну букву
- Г. Которую означаеся нерва, происходящая отъ возвратной лѣвой чувствительной жилы и теряеся въ сердечномъ мѣшкѣ и самомъ сердцѣ. Qui in pericardio et corde ipso evanescit.
- * *. Нерва, происходящая отъ внѣшней лѣвой желудочной нервы, и идущая къ печенкѣ.
11. Нерва идущая къ селезенкѣ и ободочной кишкѣ. Nervus, qui fertur ad lienem et intestinum colon.
- т т. Нерва, къ лѣвой почкѣ идущая.
- Прочія буквы означающъ шѣ же самыя чувствительныя жилы или нервы, что и на правой споронѣ.





M
30
B
Ж
III
A.
B.
a.
C.
D.
EE
FF
G.

Таблица четвертая, изображающая пригоже-
мясную поджелудочную желѣзу, печенку, селе-
зенку, положеніе оныхъ и въ особливости кро-
вевозвратную, пакъ называемую воротную,
жилу.

Фигура 1. изображаю-
щая печенку.

А. Сводоподобная, вогну-
тая спораона печени.
Pars concava jecoris.

В. Выпуклая спораона пе-
чени. *Convexa jecoris*
pars.

а. Пупочная кровевозврат-
ная жила, верхъ под-
нятая. *Vena umbilicalis,*
fursum retracta.

С. Желчный пузырекъ въ
натуральномъ положе-
ніи. *Vesica fellea in situ*
naturali.

Д. Селезенка въ натураль-
номъ положеніи. *Lien in*
suo situ.

Е Е. Поджелудочная желѣ-
за, на своемъ мѣстѣ
оспаденная. *Pancreas*
in suo loco.

Ф Ф. Воротная жила, отъ
печени чрезъ подже-
лудочную желѣзу внизъ
идущая. *Vena portæ per*
pancreas descendens.

Г. Брижейная вышая бѣю-
щаяся жила. *Mesenterica*
arteria superior.

а а а а. Раздѣлившіяся по
брижейкѣ въпви ворот-
ной жилы. *Rami venæ*
portæ, per mesenterium dif-
fusi.

б б б б. Вѣтви бѣющей
жилы, по бриженкѣ раз-
раздѣлившіяся. *Rami*
arteriæ, per mesentorum
divisi.

Н Н. Самая брижейка, на
которой верхняя плѣва
отнята. *Mesenterium*
ipsum, membrana superi-
ore denudatum.

і і. Селезеночные сосуды,
которые спали видны
по разрѣзаніи поджелу-
дочной желѣзы. *Vasa*
splénica, inciso pancreate
detecta.

Фигура 2. изображаю-
щая поджелудочную,
пригожемясную желѣзу.

А А. Желѣзистое плѣо
пригожемясной поджелу-
дочной желѣзы, нату-
рально изображенное.
Corpus callosum pancreatis,
naturali schemate expref-
sum.

Фигура 3. изображающая задней видъ, заднюю спорону пригожемясной желѣзы съ обращенною внизъ селезенкою.

А А А. Существо или тѣло пригожемясной желѣзы обнаженное. *Corpus f. substantia pancreatis denudata.*

В В В. Новоизобретенный пригожемясной желѣзы протокъ. *Canalis pancreatis, noviter inventus.*

С. Желчный протокъ, соединенный съ новоизобрѣленнымъ протокомъ поджелудочной желѣзы. *Forus biliaris cum invento noviter pancreatis canale conjunctus.*

Д Д Д. Часть двенадцатиперстной и тощей кишекъ отрѣзанная. *Portio duodeni et jejunii abscissa.*

Е. Общее отверстіе, которое составляютъ желчный и пригожемясной желѣзы протоки, и посредствомъ котораго протоки сѣи изливаютъ жидкости свои въ двенадцатиперстную кишку. *Ductus cholidochus sive orificium commune, quo forus biliaris et pancreatis canalis sese exonerant in duodenum.*

F F F. Внутренній видъ селезенки. *Facies interna lienis.*

G G G. Кровевозрапныя и бѣгущіяся жилы, простирающіяся къ селезенки.

Фигура 4. изображающая выпуклую спорону печени.

А А. Выпуклая часть печени, вверхъ обращенная. *Pars jecoris convexa.*

В. Ошдѣленная отъ печени паѣва. *Membrana, a jecore separata.*

С С. Перегородочная связка печеночная. *Ligamentum jecoris septale.*

Д Д. Широкія вѣтви большой полрой жилы, въ печеньку входящія. *Rami ampli venae cavae in hepaticam protensi.*

Фигура 5. изображающая выпуклую спорону печени.

А А. Выпуклая часть печени, вверхъ обращенная. *Pars jecoris convexa furium conversa.*

В. Доля печеночная, съ которою соединяется сальникъ. *Lobus jecoris, cui omentum junctum est.*

С.

- С. Дожбина у печени, откуда низходитъ пупочная кровезовратная жила. *Fistula hepatis, unde descendit vena umbilicalis.*
- Е. Пупочная кровезовратная жила, вверхъ обращенная. *Vena umbilicalis, sursum converfa.*
- Г. Желчный пузырь, подъ печенкою находящійся. *Vesica fellea.*
- Г. Пузырежелчный протокъ. *Canalis cysticus.*
- Н Н. Желчный протокъ, съ пузырежелчнымъ соединенный, и въ печень проведенный, который соединяется съ частицею двенадцатиперстной кишки, означенною буквою М.
- И. Пень воротной жилы, отъ печени внизъ идущій. *Truncus Venae portae, a jecore descendens.*
- К. Правая брюшная бѣгущая жила. *Arteria coeliasa dextra.*
- Л. Чувствительная жила или нерва, отъ спленической реберныхъ нервовъ происходящая. *Nervus a plexu nervorum costalium ortus.*
- Фигура 6. изображающая кровезовратную жилу такъ, какъ она обыкновенно учащимся анапоміи показывается публично.
- А А А. Пень воротной жилы, коея верхняя часть, вселившаяся въ правую и лѣвую печени долю, даетъ начало и происхожденіе безчисленнымъ кровезовратнымъ жиламъ. *Truncus venae portae.*
- А. Часть воротной жилы, отъ печени низходящая.
- В. Селезеночная вѣтвь, или селезеночная кровезовратная жила. *Ramus splenicus.*
- Сія жила сперва на большія, а послѣ на самыя маленькія въ селезенкѣ раздѣляется вѣтви или жилки.
- С. Брижейная вѣтвь или жила правая. *Mesentericus ramus dexter.*
- Д. Брижейная вѣтвь лѣвая. *Mesentericus sinister ramus.*
- а а. Пупочная кровезовратная жила. *Vena umbilicalis.*
- б. Кровезовратная пузырежелчная жила. *Vena cystica.*

с. Кровеовратная жила, къ приложимой желѣзѣ простирающаяся. *Vena ad pancreas exposita.*

dd. Правая желудочная кровеовратная жила. *Vena gastrica dextra.*

eee. Вѣшная, желудочная кровеовратная жила, иначе большою дѣвою называемая. *Vena superior gastrica s. sinistra major.*

fg. Дѣвы меньшія желудочныя кровеовратныя жилы. *Venae gastricae sinistrae minores.*

h. Кровеовратная жила, короткимъ сосудомъ называемая. *Vena, quae vas breve dicitur.*

ii. Желудочносальничная кровеовратная лѣвая жила. *Gastroepiploica vena sinistra.*

KK. Желудочносальничная правая кровеовратная жила. *Gastroepiploica dextra.*

ll. Золотая, геморроидальная кровеовратная жила. *Vena hemorrhoidalis. . .*

Сѣя жила происходитъ отъ правой бриженной вѣшныя воронной жилы.

п. Кровеовратная задне-проходной или правой кишки жили. *Vena duodenalis seu intestini duodeni.*

Фигура 7. изображающая селезенку.

А. Выпуклая часть селезенки. *Pars lienis convexa.*

В В. Селезеночная плева, отъ селезенки отдѣленная.


С С. Багровое грибоватое вещество селезенки, или паренхима. *Parenchima lienis nigricans.*

Фигура 8.

А А А. Вогнутая часть селезенки, принимающая въ себя сосуды. *Pars concava lienis, vasa excipiens.*

В. Селезеночная кровеовратная жила, на три вѣтви раздѣленная. *Vena splenica, in tres ramos divisa.*

С. Бѣющая селезеночная жила такимъ же образомъ раздѣленная прежде вхожденія своего въ селезенку.





Ж
З
С
П

Е
Н
П
С
А

В
С
П

Таблица пятая, изображающая почки, съ ихъ желѣзами, кровеносными жилами, мочевыхъ пузыремъ и мочепочниками. При чемъ открывае-ся начало и печеніе сѣмененосныхъ сосудовъ и шакъ.

Фигура 1. изобража-
етъ почки съ ихъ при-
надлежностями, на ко-
порой примѣчательны
супъ :

А А. Почечныя желѣзы,
или сумочки, собирающія
и содержащія черную
желчь. *Glandulae renales,
sive suprarenales
vel capsulae atræ bilis.*

В. Облупленная правая поч-
ка. *Ren dexter, membrana
denudatus.*

С. Лѣвая почка. *Ren sini-
ster.*

Д. Пень дуплостой или полой
большой жилы, внизъ
идушій. *Venæ cavae
truncus descendens.*

Е. Боевой великой или
начальственной жилы
внизъ идущій пень. *Ar-
teriæ magnæ sive aortæ
truncus descendens.*

Г Г. Правый мочепочникъ.
Ureter dexter.

Г Г. Лѣвый мочепочникъ.
Ureter sinister.

Н Н. Правые сосуды, при-
готовляющіе сѣмя. *Va-
sa semen præparantia dex-
tra.*

И И. Лѣвые сосуды такого
же состоянія. *Vasa si-
nistra eiusdem conditionis.*

К. Часть мочевого пузыря,
воздѣ которой относя-
щѣ сѣмя сосуды вхо-
дятъ излучистымъ об-
разомъ въ животъ. *Por-
tio vesicæ, iuxta quam va-
sa deferentia in abdomen
reflectuntur.*

Л. Отрѣзанная часть задне-
проходной кишки. *Por-
tio intestini recti abscissa.*

Фигура 2. изобража-
етъ подробнѣе почки
и соединеніе оныхъ съ
сосудами.

А А. Общая почечная сал-
ная плева, отдѣленная
отъ почки. *Commonis
membrana renum adipe
perfusæ, separata.*

В В.

- В В. Черножелчный сумоч-
ки или прибавочныя поч-
ки. *Capiole atrabiliarie*
f. *genes succenturiati*.
- С. Правая почка. *Ren dex-*
ter.
- Е. Лѣвая почка. *Ren finifter*.
- Д. Отдѣленная отъ почки
собственная ея лѣвоч-
ка.
- Ф. Пеньъ крововозвратной
полой жилы, внизъ иду-
щій. *Truncus venę cavę*
descendens.
- Г. Пеньъ начальственной
боевой жилы, внизъ иду-
щій. *Truncus aortę de-*
scendens.
- Н. Крововозвратная почеч-
ная лѣвая жила. *Vena*
emulgens finiftra.
- И. Правыя такого же со-
стоянія жилы. *Dextrę*
emulgentes venę.
- а а. Правыя бѣющіяся поч-
ечныя жилы. *Arterię*
emulgentes dextrę.
- б б. Такого же состоянія
лѣвыя жилы. *Arterię*
emulgentes finiftra.
- с. Лѣвая бѣющаяся сѣмен-
ная жила. *Arteria sper-*
matica finiftra.
- д. Лѣвая крововозвратная
сѣменная жила. *Vena*
spermatica finiftra.
- е. Правая крововозвратная
сѣменная жила. *Vena*
spermatica dextra.
- г. Бѣющаяся правая сѣмен-
ная жила. *Arteria dextra*
spermatica.
- г. Крововозвратная салъная
жила, происходящая
здѣсь отъ почечной кро-
вовозвратной жилы. *Vena*
adipofa, ab emulgenteorta.
- и. Салъная бѣющаяся жила.
Arteria adipofa.
- К К К К. Моченочники, съ
обѣихъ сторонъ пуло-
выща. *Ureteres utriufque*
lateris.
- Л Л Л Л. Сосуды, пригото-
вляющіе или вырабаты-
вающіе сѣмя. *Vafa femen*
pręparantia.
- М М. Мешонка съ находя-
щимися въ оной янрами.
Scrotum cum inelouis te-
stibus.
- Н Н. Относящіе сѣмя со-
суды. *Vafa femen defe-*
rentia.
- О. Мочевой пузырь, съ ко-
порого сянна вѣшняя
плевѣ. *Vefica urinaria*
externa tunica demdta.

Фигу-

Фигура 3. изобража-
етъ правую сумоч-
ку или прибавочную
почку.

A. Сумочка или правая же-
лѣза почки. *Capfula f.
dextra glandula renis.*

B. Кровевоозвратная жила,
отъ полых жилъ въ су-
мочку входящая. *Vena
a cava in capfulam por-
recta.*

Фигура 4. изобража-
етъ лѣвую сумочку.

A A. Разрѣзанная на двое
сумочка. *Capfula difsecta.*

B B. Пазуха сел сумочки,
нѣсколько раздвинутая.

Фигура 5. изобража-
етъ внутреннѣйшій видъ
почки.

A. A. Внутреннѣйшій видъ раз-
рѣзанной почки.

B B. Кровевоозвратная по-
чечная жила, на многія
вѣтви въ почкѣ раздѣ-
ляющаяся. *Vena emul-
gens, in renet ramis suis
diffusa.*

C. Бѣгущая почечная жила,
также на вѣтви раздѣ-
ленная. *Arteria emulgens,
in ramos dispersa.*

Фигура 6. изобража-
етъ разрѣзанную поч-
ку.

A A. Разрубленная, разрѣзан-
ная почка. *Ren difsectus.*

B. Пазуха мочеочная, возлѣ
почки находящаяся. *Si-
nus ureteris circa renet.*

C. Круглой видъ мочеочни-
ка, отъ почки внизъ
простирающагося. *For-
ma teres ureteris, a rene
descendentis.*

D D. Трубочки мочеочни-
ковыя. *Tubuli ureteris.*

E E E. Сосочныя мясцы въ
почкѣ, мочу собиратель-
ныя шлѣзы или желѣзы
въ почкѣ. *Capunculæ ra-
pillares.*

Фигура 7. изобража-
етъ мочевой пузырь и
его чашки.

A A. Общая мочевого пу-
зыря плева, отъ него
отдѣленная и назадъ
отведенная.

B B B.

В В В. Средняя плева пузыря и его дно. Media vesicæ eiusque fundus.

С. Внутренняя плева пузыря.

Д. Отверстіе пузыря, чрезъ которое моча вытекаетъ вонъ.


Е Е. Шея мочевого пузыря, съ предстоятельными желѣзами, по причинѣ которыхъ она видится раздупою. Cervix vesicæ cum glandulis prostaticis, quibus intumescit.

Ф Ф. Части моченочниковы, вселяющіяся въ мочевой пузырь. Partes ureterum, in vesicam se se innuantes.



узы-
ны-
при-
ви-
ervix
pro-
cit.

оы,
евоы
ete-
inf-





Т
НЫ
ПО
МО
С
А.
В.
С
D.
E.
F
G.
H
I.

Таблица шестая, изображающая кромѣ сѣменныхъ сосудовъ, япра, мошонковыя плевы и дѣшпородный мужескій членъ, вкупѣ съ почками и мочевымъ пузыремъ.

Фигура 1.

- | | |
|--|---|
| <p>A. Правая почечная желѣза, Glandula renalis dextra.</p> <p>B. Лѣвая почечная желѣза или прибавочная лѣвая почка. Glandula renalis sinistra.</p> <p>C C. Почки по обѣимъ сторонамъ.</p> <p>D. лѣвая почечная кровезоврашная жила. Vena emulgens sinistra.</p> <p>E. Правая такая же жила. Vena emulgens dextra.</p> <p>F F. Бѣющая почечная жила правая и лѣвая. Arteriae emulgentes dextra et sinistra.</p> <p>G. Правая сѣменная кровезоврашная жила. Vena spermatica dextra.</p> <p>H H. Пень полая кровезоврашная жила, внизъ идущій. Truncus venae cauae descendens.</p> <p>I. Лѣвая подвздошная вѣтвь кровезоврашной подож</p> | <p>жилы. Ramus iliacus sinister venae cauae.</p> <p>K. Правая такая же вѣтвь. Ramus iliacus dexter venae cauae.</p> <p>L. Бѣющая правая сѣменная жила. Arteria spermatica dextra.</p> <p>M M. Пень начальственной боевой жила, внизъ идущій. Truncus aortae descendens.</p> <p>N. Правая подвздошная вѣтвь начальственной боевой жила. Aortae ramus iliacus dexter.</p> <p>O. Тоя же артерія лѣвая вѣтвь.</p> <p>P. Бѣющая лѣвая сѣменная жила. Arteria spermatica sinistra.</p> <p>Q. Кровезоврашная лѣвая сѣменная жила. Vena spermatica sinistra.</p> <p>R R. Лѣвой мочешочникъ. Ureter sinister.</p> <p>S S. Правой мочешочникъ. Ureter dexter.</p> |
|--|---|

Т Т. Приготовляющіе сѣмя
сосуды. *Vasa semen præ-*
parantia.

т т. Тѣже самые сосуды,
въ какомъ мѣстѣ начи-
нающъ оныя составляющъ
винограднолиственные,
на виноградной то есть
листь похожіе сосуды.
Eadem vasa, quo loco vasa
ampniformia constitu-
ere incipiunt.

V V. Относящіе сѣмя со-
суды, позади мочевого
пузыря проходящіе. *Va-*
sa semen deferentia, retro
vesicam euntia.

X X. Мошонка съ янтрами.
Scrotum cum testibus.

У. Мочевой пузырь. *Vesi-*
ca urinaria.

Z. Шея мочевого пузыря.
Cervix vesicæ.

а а. Двѣ подъбемныя муже-
скаго члена мышцы.
Duo elevatores penis.

б б. Двѣ мышцы, спводѣ
разширяющія. *Duo ure-*
tram dilatantes muscoli.

с. Тѣло мужескаго уда. *Cor-*
pus penis.

d. Конечная плоск. кожа.
Præputium.

Фигура 2.

А А. Отдѣленная отъ мо-
шонки наружная кожа.

В В В. Мягкая плеча мо-
шонковая, сжимаемая
называемая. *Dartus.*

с с. Внѣшняя красная часть
влагалищной оболочки
или плевы. *Pars exter-*
na rulicunda ebythroidis.

D D. Подбемляющая янтра
мышца, имѣющая про-
исхожденіе свое надъ
поперечными чревными
мышцами. *Cremaster*
musculus.

Е Е. Внутренняя часть вла-
галищной шулящной о-
болочки. *Interna sive*
nervea pars elythroidis.

Ф Ф. Бѣлочная собственная
шулящная плеча или о-
болочка, отъ янтра от-
дѣленная. *Albuginea pro-*
pria testis membrana, se-
parata.

Г. Также самая оболочка съ
янтрами соединенная.

Г. Желѣзно сосудистое
янтра существо или тѣ-
ло. *Substantia testis vas-*
culofo glandulosa.

Н. Пирамидальной, пирами-
дообразной или вино-
градно листо подобный
сосудъ. *Vas pyramidale*
s. ampuniforme.

II.

II. Яичные прибавки. *Perididymis*.

К. Надшудятные, напряжнымъ жиламъ подобные извивыстые сосуды. *Parastatae variciformes*.

Фигура 3.

ж. Часть приготавливающихъ сѣмя сосудовъ. *Portio praeperantium vasorum*.

А А. Пирамидообразные сосуды. *Vasa pyramidalia*.

В В. Шудятной прибавокъ, надшудятной сосудъ. *Epididymis*.

С С С. Напряженнымъ жиламъ подобные надшудятные сосуды. *Parastatae variciformes*.

Д. Янро, покрытое собственною пласвою или оболочкою. *Propria testis*.

Е. Часть относящихся назадъ сѣмя сосудовъ. *Pars deferentium vasorum*.

Фигура 4.

А А. Бѣущіяся кровевозвращающія жилы, раздѣленные на пирамидообразные сосуды. *Arteriae et venae, in vasa pyramidalia divisae*.

Часть IV.

D D. Часть относящаго сѣмя сосуда.

Фигура 5.

А. Мочевый пузырь, съ котораго снята внѣшняя плева.

В В. Часпи мочеточниковъ. *Partes ureterum*.

С С. Часпи относящихся сѣмя сосудовъ.

Д Д. Сумочки. *Capulae*.

d d. Концы сумочекъ. *Finis capsularum*.

Е Е. Сѣменные пузырьки. *Vesiculae seminales*.

Г Г. Предстоятельные, предстательныя желѣзы. *Glandulae prostaticae*.

Г Г. Мочевой стволъ. *Urethra*.

Н Н. Подъемныя мышцы. *Musculi erectores*.

II. Разширяющія стволъ мышцы. *Dilatatores urethrae musculi*.

К К. Два мясистыя пещеристыя шѣла дѣтороднаго члена. *Duo corpora penis cavernosa*.

Л. Затянутая вверхъ плоть. *Præputium retractum*.

М.

X

М. Желѣза съ уздочкою.
Glandula cum freno.

Фигура 6.

А. Внутренняя плѣва оп-
твореннаго или разрѣза-
наго мочевого пузыря.
Intima tunica vesicæ aper-
tæ.

В В. Часъ мочепочниковѣ.

С С. Устья мочепочниковѣ,
въ пузырь опривающія-
ся или въ пузыри раз-
ширенныя.

Д Д. Происхожденія сумо-
чекѣ. Carfularum initia.

Е Е. Сѣменные пузырьки.
Vesicæ feminales.

Г Г. Раздѣленные предспа-
дельныя желѣзы. Gland-
ulæ prostaticæ divisæ.

Л. Дыра или отверстіе,
изъ сумочекѣ въ стволѣ
при самомѣ его началѣ
открывающееся, имѣю-
щее заслоночку. Foramen,
e capsulis in urethram ad
initium ejus patulum, val-
vula præditum.

Фигура 7.

А. Ондѣленная отъ мяси-
стаго плѣва дѣтороднаго
члена плѣва.

В. Черное внутреннее су-
щество сего же плѣва.

С. Обнаженная головка или
плѣшка дѣтороднаго чле-
на. Glans penis denuda-
tæ.




па-
лан-

пѣ,
волѣ
алѣ
бю-
мен,
ad
vai-

си-
наго

су-
а.

или
чле-
нда-





по
пол
роз
поя

с
ща
дно
пуз

a.

b.

c.

d.

e.

ф
ща
суд
кро
ные
свя
кон

A.

Таблица седьмая, изображающая женскія дѣ-породныя часпи, первое въ натуральномъ ихъ положеніи, попомъ въ особливости каждую по-рознь, а наконецъ дѣвспвенную плеву и ея поясъ.

Фигура 1. изображающая сѣменные сосуды, дно матки и мочевого пузыря.

- а. Правые сосуды, приготавлиющіе сѣмя. *Vasa dextra seminis praeparantia.*
- б. Лѣвые сосуды того же рода.
- с. Часть заднепроходной кишки. *Portio intestini recti.*
- д. Дно матки, которое вышше мочевого пузыря выдалось. *Fundus uteri, supra vesicam eminent.*
- е. Мочевой пузырь.

Фигура 2. изображающая почки съ ихъ сосудами, кровеносные и кровезовратные, сѣменные сосуды, матку, ея связи и яичники, и наконецъ мочевой пузырь.

- А. Правая прибавочная почка или правая почечная

желѣза. *Glandula renalis dextra.*

- В. Такая же лѣвая желѣза.

С С. Почки по обѣимъ сторонамъ.

Д Д. Правостороннія кровезовратныя почечныя жилы. *Venae emulgentes dextrae.*

Е Е. Бѣущіяся правыя почечныя жилы. *Arteriae emulgentes dextrae.*

Ф Ф. Пень полая кровезовратная жила, раздѣленной на двѣ подвѣздныя вѣтви, на правую поестъ и лѣвую. *Truncus cavæ, in duos ramos, divisus, in dextrum et sinistrum.*

Г. Кровезовратная лѣвая почечная жила. *Vena emulgens sinistra.*

Н Н. Лѣвыя почечныя бѣущіяся жилы. *Arteriae emulgentes sinistrae.*

І І. Кровезовратная сѣменная правая жила. *Vena spermatica dextra.*

К.

- К. Бѣющая правая сѣменная жила. *Arteria spermatica dextra.*
- Л. Бѣющая лѣвая сѣменная жила. *Arteria spermatica sinistra.*
- М. Кровеовозвращная лѣвая сѣменная жила. *Vena spermatica sinistra.*
- ММ. Нѣнь начальственной боевой жилы, раздѣленный на правую подвздошную, и лѣвую подвздошную же жилы. *Truncus aortae, in ramum iliacum dextrum, et iliacum sinistrum divisus.*
- ОО. Женскія ядрышки. *Testes muliebres.*
- РР. Части широкихъ маточныхъ связокъ. *Portiones ligamentorum uteri latorum.*
- QQQQ. Маточныя трубы, съ обѣихъ сторонъ внизъ опведенныя съ нѣмъ, чтобы видѣть можно было ядрышки. *Ut testes appareant.*
- Р. Дно матки. *Fundus uteri.*
- SS. Снизу отрѣзанныя маточныя круглыя связки. *Ligamenta uteri teretia.*
- Т. Шея у матки. *Cervix uteri.*
- У. Подвздошныя кровеовозвращныя жилы съ обѣихъ сторонъ.
- Х. Бѣющіяся подвздошныя жилы съ обѣихъ же споронъ. *Venae tyrogastricae et arteriae hypogastricae in utroque latere.*
- Всѣ сѣи сосуды вселяются въ матку или утробу.
- У. Рукавъ матки. *Vagina uteri.*
- З. Мочевой пузырь, внизъ обращенный. *Velica, deorsum conversa.*
- а а. Доли мочепочниковъ, возлѣ пузыря отрѣзанныя.
- б б. Доли мочепочниковъ, у почек отрѣзанныя.
- с с. Приготовляющіе сѣмя сосуды, около ядрышковъ разширенные. *Vasa semen praeparantia, circa testes dilatata.*
- д д. Относящіе сѣмя проходы. *Ductus semen deferentes.*
- Фигура 3. изображающая разрѣзанное дно матки, ея впадину, шею и прочая.
- А А. Дно матки поперѣ разрѣзанное. *Uteri fundus, transversim dissectus.*
- В В. Впадина маточнаго дна. *Cavitas fundi.*

- Е. Шея матки. *Cervix uteri.* Е. Дно матки. *Fundus uteri.*
- Д. Отверстiе въ маточной шей у такой женщины, которая уже нѣсколько разъ рождала.
- Е.Е. Морщиноватый видъ разрѣзаннаго маточнаго рукава. *Facies rugosa, dissectae uteri vaginae.*
- Ф.Ф. Снизу стрѣзанныя круглыя маточныя связки. *Ligamenta uteri teretia, inferius abscissa.*
- Н.Н. Доли мочепочниковъ.
- Г. Мочевой пузырь, обѣятый рукавомъ матки, и нѣсколько вверхъ поднятый.
- Г.Г. Дѣтъ мышковатый или мясистый голени поточки. *Duo clytoridis supra masculosa.*
- К. Самое мѣло поточки. *Ipsum corpus clytoridis.*
- Фигура 4. изображающая женскія ядрышки, ихъ проходы въ матку, дно матки и прочая.
- А. Правое ядрышко. *Testiculus dexter.*
- В.В. Правая труба, внизъ подавленная. *Tuba dextra depressa.*
- С. Лѣвое ядрышко. *Testiculus sinister.*
- б.б. Проходы изъ ядрышекъ въ матку.
- Д.Д. Лѣвая труба у матки. *Tuba sinistra uteri.*
- Фигура 5. принадлежноти женскихъ внѣшнимъ часней изображающая.
- А. Выдавшаяся подъ кожей поточечная головка. *Caput clytoridis, sub cute eminens.*
- В.В. Растянутые внѣшнiе край или губы женскаго уда. *Labia externa pendendi distracta.*

СС. Крылья, нимфы, или
дѣпородоудныя сережки
п а к ж е расшнущыя.
*Alae, five nymphae pariter
difentae.*

Д. М я с ц о, окружающее
мочевый протокъ.

Проходъ оный означенъ здѣсь
спрочной буквою а.





ЕЕ. Два преведенныя мир-
тообразныя мясышки.
*Duae sagunculae purty
formes.*

FF. Пленочныя или перепон-
чныя продолженія лож-
бину окружающія и ея
содержащія.

Фигура 6. изображаю-
щая плену, показыва-
ющую дѣвспво.

А. Плева поперегъ тай-
ному уду проведенная,
которую называютъ обы-
кновенно дѣвспвненною
плевою. Нумен.

Фигура 7. изобража-
етъ пайноудныя часпи
младенцы, которыя па-
ковое же имѣющъ значе-
нiе, какъ и подъ пя-
тою фигурою изображен-
ныя часпи.





В
Н
Р
Х
К
В
К
В
Н
Н
Б
П
Б
Ж

Ю
М
П
Н
А

В В

С О

Таблица восьмая, шѣмъ болѣе заслуживающая вниманіе, что подъ первую фигуру изображаетъ натуральное положеніе младенца въ матерней утробѣ, уже наканунѣ исхожденія своего на свѣтъ находящагося, а подъ 2 фигуру показывается ясно, какимъ образомъ совершается круготеченіе крови во младенцѣ, находящемся въ матерней утробѣ. Карпина сія еще и по тому заслуживаетъ наше вниманіе, что нерѣдко случается, что младенецъ, будучи зависпливою какою либо фортуною не натурально положенъ въ маткѣ, пребываетъ при недаспачныхъ силахъ напурь, помощи повывальнаго искусства, безъ котораго бы онъ могъ лишиться своей драгоценныя жизни, или опнытъ оную у своей матери.

Фигура 1. изображающая зрѣлый плодъ въ матерней утробѣ въ натуральномъ и желанномъ положеніи.

А А А А. Растянутыя части матерняго разрѣзаннаго живота или чрева.

В В В В. Тѣло матки, на четыре части раздѣленное. *Corpus uteri, in quatuor partes diductum.*

С С С С. Верхняя младенческая оболочка или сорочка, и внутренняя водная плева еще въ соединеніи находящіяся, которыя одножъ суть разрѣзанныя углами. *Chorion et amnios adhuc conjunctæ & in angulos dissectæ.*

D. Зародышъ или младенецъ, внизъ головою обращенный. *Fætus, capite deorsum conversus.*

Фигура 2. изображающая младенца, изъ утробы изыашаго, съ раздѣленными при самомъ ихъ происхожденіи пуповными сосудами.

А. Пупочная крововозвратная жила, отъ печенки проведенная. *Vena umbilicalis, a pectore protersa.*

В В. Двѣ бѣущія пуповныя жилы къ пуповинѣ идущія, коихъ произшествіе смотрѣть должно на слѣдующей картинѣ. *Duæ arteriæ umbilicales.*

С. Мочеточный младенческий или зародышевъ каналъ въ связи съ пупови-

повиною находящійся.
Utrachus umbilico con-
junctus.

DD D. Пуповина или пупочная шенива, даже до мѣста проведенная. *Umbilicus ad placentam productus.*

Е Е. Внутренняя зародышева сорочка, или водная оболочка, отъ верхней оболочки или сорочки отдѣленная. *Amnios a chorio, seipsum.*

Подъ сею сорочкою видѣть можно нѣкоторую часть пуповины.

FF F. Верхняя сорочка, на четьре угла разрѣзанная. *Chorion in quatuor angulos dissecta.*

GG G. Кровевозрастная и дѣбѣющіеся пуповныя жилы, на безсѣбныя вѣтви въ мѣстѣ раздѣлившіеся. *Vena et arteriae umbilicales, in placentam in numeros ramos dispersae.*

Фигура 3. изображающая дѣтскаго мѣста шу сторону, копорю оно соединяется съ машкою.

А А. Выпуклая сторона мѣста или послѣда. *Pars convexa placentae.*

В В В В. Верхняя сорочка младенческая, подъ мѣстомъ находящаяся. *Chorion placentae.*

Фигура 4. изображающая кости, къ головѣ принадлежащія.

А А. Лобная или чельная кость, посредствомъ шва раздѣленная. *Os frontis futura distinctum.*

В В. Дѣ переднія головы кости. *Os duo incisivi.*

С. Перепончатое мѣсто или маковка у младенца. *Vertex infantis adhuc membranofus.*

Д. Низшая челюсть, на двѣ части раздѣленная. *Maxilla inferior, in duas partes distincta.*

Фигура 5. изображающее костяное, въ младенцахъ обрѣщаемое колцо, къ копорю прирастается перепонка ушнаго шимпана. *Annulus offeas, cui membrana tympani aurium annectitur.*

Фигура 6. изображающая слуховыя кости, въ натуральнаго положенія находящіяся.

А. Молошокъ. *Malleus.*

В. Наковальня. *Incus.*

С. Стремено. *Stapes.*

Д. Маленькія косточки, соединенныя со связкою стременевою.

D.

D. Косточка, Сильвѣмъ изображенна.

Фигура 7. изображающая лабиринтъ и завитую раковину въ слуховой кости въ натуральномъ ихъ спроекти.

A. Овальная дыра въ тимпанѣ. Foramen ovale in labyrintho.

B. Круглая въ тимпанѣ дыра, находящаяся по срединѣ лабиринта и завитой въ слуховой кости раковины. Foramen rotundum in tympano inter labyrinthum et cochleam medium.

ССС. Три костные круги или круговые каналы лабиринта. Tres circuli ossei labyrinthi.

DD. Улитка, раковина ушная, блокъ. cochlea aurium.

Фигура 8. изображающая внутренній видъ слуховой раковины, съ лабиринтомъ.

A. Овальная дыра. Foramen ovale.

B. Грудная дыра. Foramen rotundum.

ССС. Три лабиринта костные круги, нѣсколько

отверстыя. Tres circuli ossei labyrinthi non nihil aperti.

DD. Разломанная раковина, внутренній дырчатый кругъ изображающая. Cochlea effracta, gyrgulum internum porosum exhibens.

Фигура 9. изображающая младенческой позвоночникъ, на три части раздѣленный.

A. Первая или задняя часть позвонка. Pars primae posterior vertebrae.

B. Вторая часть задняя же. Pars secunda posterior.

C. Третья часть передняя. Pars anterior.

Фигура 10. изображающая шейные позвонки и грудные кости спереди видныя.

A. Верхняя только часть грудныхъ костей, съ которою прочія суть соединены.

Фигура 11. изображающая спину, ея позвонки и спановую кость, не имѣющую еще отростковъ.

Фигура 12. изображающая поясничные позвонки вкупѣ съ костью, составляющими лонно или тазъ.

A. Пять позвонковъ поясничныхъ, неимѣющихъ еще отростковъ.

E. Крестцовая кость, изъ шести частей состоящая. *Os sacrum, sex partibus constans.*

CC. Подвздошные кости. *Ossa ilium.*

DD. Лобковые кости. *Ossa pubis.*

EE. Сѣдалищныя кости. *Ossa ischiadica.*

Фигура 13. изображающая всѣ ручныя кости.

a b d. Придѣлочные костныя еще хрящевыя. *Appendices adhuc cartilagineae.*


c. Хрящевыя кости ручной кости. *Ossa cartilaginea carpi.*


Фигура 14. изображающая ножныя кости.

a b d. Хрящевыя костныя придѣлочки.

c. Нѣсколько хрящевыхъ костей кожной плюсны. *Aliquot ossa cartilaginea tarsi.*







но
де

ща
ка
их

А

В.

С

Д

Е.

Г.

Г

Таблица девятая, изображающая всѣ внутренности, находящіяся въ животѣ и груди младенца.

Фигура 1. изображающая мясные пупки такъ, какъ проспымымъ глазомъ ихъ видѣть можно.

А А А. Выпуклая часть, печенка. Pars jecoris convexa.

В. Желчный пузырь. Vescica biliaria.

С С. Пупочная кровеносная жила, верхъ поднятая. Vena umbilicalis, sursum flexa.

Д Д. Желудокъ, вверхъ поднятый. Ventriculus, sursum convexus.

Е. Низшее или правое устье или отверстие желудка, ниткою пережатое. Pylorus, filo confectus.

Г. Часть отрезанной поперечной кишки около праваго отверстия желудка. Portio intestini jejuni, prope pylorum abscissa.

Б Б Б. Великая поджелудочная, иначе прилегающая называемая желѣза. Pancreas, magnitudine grande.

Н Н. Младенческая селезенка. Lien foetus.

И И. Правая почка, общаю плечую покрывная. Ren dexter, membrana communis tectus.

К. Лѣвая почка, такимъ же образомъ покрывная. Ren sinister, pariter occultatus.

Л Л Л. Разширенная брыжейка. Mesenterium expansum.

М М &. Кишки, связанными брыженкою. Intestina, mesenterio nexa.

а а а. Нѣсколько млечныхъ жилъ, отъ поджелудочной желѣзы проспиряющихся къ печенкѣ, изъ коихъ здѣсь не много и примѣтъ не большихъ изображено. Venae lacteae, a pancreate ad hepatis exprorectae.

б б б. & ceter. Нѣсколько млечныхъ жилъ, отъ поджелудочной желѣзы къ кишкамъ проспиряющихся. Aliquot venae lacteae, a pancreate ad intestina protensa.

д д. Въшивы брыжейки бѣжущихъ жилъ.

Фигу-

Фигура 2. изображающая почки, ихъ сосуды и прочая.

А: Правая почечная желѣза или прибавочная почка. *Glandula dextra renis, siue ren dexter succenturiatus.*

В. Правая желѣзистая почка. *Ren dexter glandulosus.*

С. Лѣвая почечная желѣза. *Glandula renalis sinistra.*

Д. Лѣвая почка. *Ren sinister.*

Е. Начальственная низходящая крововозвратная жила. *Vena cava descendens.*

Г Г. Вѣя внутреннїя подвздошныя вѣтви. *Rami ejus iliaci interni.*

Г Г. Подвздошныя вѣтви дупласной жилы. *Venæ cavæ rami iliaci externi.*

Н Н Н. Начальственная бѣющая жила съ ея вѣтвиными подвздошными вѣтвями. *Aorta cum eiusdem ramis iliacis externis.*

І І. Внутреннїя подвздошныя вѣтви сеп жилы.

Interni rami iliaci hujus arteriæ.

К К & ceter. Обѣ пупочныя бѣющїяся жилы, внизѣ наклоненныя.

Л. Дно маточное, нѣсколько сжатое. *Fundus uteri pressæ rotunditatis.*

М. Шея матки. *Cervix uteri.*

Н. Мочевой пузырь, внизѣ опивденный. *Vesica urinaria, deorsum flexa.*

О. Мочеточный каналъ зародышевъ. *Urachus.*

Р. Узелъ оторѣзанной пуповины. *Nodus umbilici abscissi.*

а. Правая крововозвратная жила почечной желѣзы.

б. Правая бѣющая почечной желѣзы жила. *Arteria glandulæ renalis dextra.*

с. Правая почечная бѣющая жила. *Arteria emulgens dextra.*

д. Правая почечная крововозвратная жила. *Vena emulgens dextra.*

е. Правая крововозвратная сѣменная жила. *Vena spermatica dextra.*

f.

- | | |
|--|--|
| <p>f. Правая бѣгущая сѣменная жила. <i>Arteria spermatica dextra.</i></p> <p>g. Бѣгущая жила лѣвой почечной желѣзы. <i>Arteria glandulae renalis sinistra.</i></p> <p>h. Лѣвая крововозвратная жила почечной желѣзы. <i>Vena glandulae renalis sinistra.</i></p> <p>i. Лѣвая крововозвратная почечная жила. <i>Vena emulgens sinistra.</i></p> <p>k. Лѣвая почечная бѣгущая жила. <i>Arteria emulgens sinistra.</i></p> <p>l. Лѣвая крововозвратная сѣменная жила. <i>Vena spermatica sinistra.</i></p> <p>m. Лѣвая сѣменная бѣгущая жила. <i>Arteria spermatica sinistra.</i></p> <p>п п. Сосуды, приготавливающие сѣмя. <i>Vasa semen praeparantia.</i></p> <p>о о. Ядрышки, которыя здѣсь весьма хорошо видѣнь можно. <i>Testes satis hic conspici.</i></p> | <p>р р. Широкая маточная связка. <i>Ligamenta uterina lata.</i></p> <p>р р. Маточныя трубы, внизъ наклоненныя. <i>Tubae uterinae deorsum flexae.</i></p> <p>г г. Круглыя маточныя связки. <i>Ligamenta teretia uteri.</i></p> <p>г г. Доли отрубзаннымъ мочеточниковъ.</p> <p>Фигура 3. изображающая легкое съ сердцемъ.</p> <p>А А. Легкое раздѣленное. <i>Pulmo diductus.</i></p> <p>В. Сердце. <i>Cor.</i></p> <p>С. Пень начальственной боковой жилы, изъ сердца выходящій. <i>Truncus aortae, e corde emergens.</i></p> <p>Д. Частъ тойже жилы внизъ идущей.</p> <p>Е. Легочная бѣгущая жила. <i>Arteria pulmonalis.</i></p> <p>а а. Каналъ или протокъ между легочною бѣгущею и начальственной бо-</p> |
|--|--|

бювою жилами. *Canalis inter venam arteriosam et aortam.*

б. Начало правой подклю-
чевой бѣющей жи-
лы. *Principium arteriæ sublu-
viæ dextræ.*

с. Начало лѣвой сонной
бѣющей жи-
лы. *Initium
arteriæ carotidis sinistræ.*

д. Окончаніе лѣвой сон-
ной бѣющей жи-
лы. *Exitus arteriæ carotidis
sinistræ.*

Фигура 4. изобража-
ющая разрѣзанное серд-
це.

А А. Раздѣленное легкое.

В. Сердце кѢ правому пу-
сырѣ или желудку
разрѣзанное. *Cor versus*

*Ventriculum dextrum in-
cisu.*





С. Дуплстая жила, у серд-
ца разрѣзанная. *Vena
cava, juxta cor aperta.*

Д. Соустіе, соединеніе ду-
плстой кровооборот-
ной и легкой жи-
лы. *Ana-
stomosis inter venam sa-
vam & arteriam pulmo-
nalem.*

Е. Заслопочка, у сего со-
устія находящаяся. *Val-
vula in anastomosi ob-
via.*

Фигура 5. изобража-
ющая подѣ буквою:

А. Грудную желѣзу, зоб-
ною называемую. *Thy-
mus.*



III
НО

III

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Таблица десятая, изображающая грудныя мышцы, кости, оболочки и грудобрюшную перепонку.

Фигура 1. изображающая грудныя мышцы.

- | | |
|--|--|
| <p>A. Грудная мышца въ натуральномъ положеніи. <i>Musculus pectoralis in suo situ.</i></p> <p>B. Таже самая мышца въ своего положенія находящаяся. <i>Idem musculus extra situm.</i></p> <p>C. Зубчатая передняя большая мышца нѣсколько видная въ своемъ натуральномъ положеніи. <i>Serratus anticus maior.</i></p> <p>D. Таже мышца въ своего положенія.</p> <p>E. Зубчатая передняя меньшая мышца въ натуральномъ положеніи. <i>Serratus anticus minor in suo situ totus.</i></p> <p>F. Подключевая мышца въ натуральномъ положеніи. <i>Subclavius in situ suo.</i></p> | <p>G. Дужка или распорка подъ грудною мышцею. <i>Clavicula sub musculo pectorali.</i></p> <p>G G. Мышечное разширеніе на передней сторонѣ шеи. <i>Platysma myoides.</i></p> <p>G G et cet. Междуребрённые Вѣшнія мышцы въ натуральнаго положенія. <i>Intercostales externi extra situm.</i></p> <p>H H et cet. Междуребрённые внутреннія мышцы въ натуральномъ положеніи. <i>Musculi intercostales interni in situ.</i></p> <p>I I. Часть грудобрюшной перепонки въ натуральномъ положеніи. <i>Portio diaphragmatis in situ.</i></p> <p>K. Часть низходящей начальной боевой жилы. <i>Pars aortae descenditis.</i></p> <p>L. Дуга въ грудобрюшной перепонки, чрезъ которую</p> |
|--|--|

- рую проходитъ ѣстествен-
ный каналъ. Foramen
pro gula.
- М. Дира для низходящей
дубластой кровевозвра-
тной жилы. Foramen pro
vena cava descendente.
- Н Н. Четвероугольные поя-
сничные мышцы въ
натуральномъ положе-
нїи. Musculi lumborum
quadrati in suo situ.
- О О. Ловеческая, склоняю-
щая на передъ плуови-
ще мышца. Musculus
pectoralis.
- Сѣя мышца здѣсь видна такъ,
какъ она есть въ самой
натурѣ.
- Фигура 2. изображаю-
щая грудныя кости.
- А А. Грудина, грудная
кость. Os sterni.
- В. Заостренной хрящъ,
оспрокопечїе помянутой
кости. Cartilago sterni
mucronata.
- С С &. Хрящевыя реберныя
части.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Истин-
ныя кости. Costæ veræ
8. 9. 10. 11. 12. Ложныя ко-
сти. Costæ spuriae.
- Фигура 3. изображаю-
щая ребра съ позвонка-
ми и ихъ спинными оп-
расками, позади спины
видимыми.
- Фигура 4. изображаю-
щая вскрытую грудь.
- А А. Средостѣїе въ груди,
на бокъ отведенное. Me-
diaſtinum, ad latus retor-
tum.
- В В. Плевы груднаго средо-
стѣїя. Tunicæ media-
ſtini.
- С. Правая доля легкаго,
нѣкоторымъ образомъ
видимая. Lobus dexter
pulmonis, aliquoties con-
spicuus.
- Фигура 5. изображаю-
щая ребра съ подребер-
ною плевою.
- А А. Часть оторженной отъ
реберъ подреберной пле-
вы

вы и на сторону опве-
денной. *Pars plevræ annu-
fa et ad latus retorta.*

В В. Ребра обнаженные своею
плевры.

С С. Ребра, покрытые сво-
ею реберною плевою.

Фигура 6. изображаю-
щая грудобрюшную пе-
репонку, отдѣленную
отъ реберъ и позвонковъ,
съ которыми она соеди-
нялась.

А А А. Мягкая часть
грудобрюшной перепон-
ки, покрытой своею пле-
вою. *Carnosa pars dia-
phragmatis, membrana sua
testi.*

В В. Бѣгущаяся перепон-
ки жилы. *Arteriæ phre-
nicæ.*

С С. Кровеовратная сея
перепонки жилы. *Venæ
phrenicæ.*

Д. Проходная дыра дупли-
стой или полой крове-
овратной жилы. *Fora-
men venæ cavæ pervi-
um.*

Часть IV.

Е. Дыра, чрезъ которую
проходитъ вѣснвенный
каналъ. *Foramen, quod
gula transit.*

Г Г Г. Перепончатая часть
грудобрюшной перепонки.
*Pars membranosa diaphrag-
matis.*

Г. Полость или раздѣле-
ніе мясистыхъ частей гру-
добрюшной перепонки,
чрезъ которое низходитъ
начальственная боевая
жила.

Фигура 7. то же са-
мое изображающая.

А. Лѣвая нерва, лѣвая чув-
ствительная жила гру-
добрюшной перепонки.
*Nervus sinister diaphrag-
matis.*

В. Правая нерва того же
самого мѣста. *Dexter
nervus.*

С. Вышней части плева
грудобрюшной перепон-
ки, здѣсь отдѣленная.
*Pars separata superioris
membranæ diaphragmatis.*

Д.



Ц

D. Обнаженное мясистое существо грудобрюшной перепонки.	G G G. Перепончатая часть грудобрюшной перепонки. Pars membranosa diaphragmatis.
E. Дира, которую переходитъ Ёсвенный каналъ. Foramen pro gula.	H H H. Мясистая доля той же перегородки, промежъ коихъ низходитъ начальственная боевая жила.
F. Дира низходящей полой кровезоверашней жилы.	






часть
репон-
а dia-

о ли
одки,
изхо-
енная



IV *Tafel X.*





сг.
и з
ло,
мя

юш

А.

В.

С.

Д.

Е.

Ф.

Г.

Таблица одинадцатая, изображающая сердце, его оболочки, сосуды, пуспыри или полоспи и заслоночки, попомѣ легкое и дихапсельное горло, опидѣленное опѣ легкопной паренхимы, или мягкаго ноздревапаго легкопнаго существа.

Фигура 1. изображающая сердце вообще.

- | | |
|---|--|
| <p>A. Сердечный мѣшокѣ, или сердечная оболочка, огграждающая сердце. <i>Pericardium.</i></p> <p>B B. Легкѣя, содержащѣя или окружающѣя сердце пакѣ, какѣ то бывающѣ въ натуральномѣ состоѣанѣи.</p> <p>C. Начальшвенная, или полая кровевозвратная жила; опѣ сердца вверхѣ идущая. <i>Vena cava supra cor adscendens.</i></p> <p>D. Происхожденѣ или начало безпартныя кровевозвратныя жилы. <i>Principium venae azygos.</i></p> <p>E. Правая кровевозвратная подключевая жила. <i>Subclavia vena dextra.</i></p> <p>F. Правая шейная кровевозвратная жила. <i>Vena ingularis dextra.</i></p> <p>G. Лѣвая такая же жила. <i>sinistra jugularis.</i></p> | <p>H. Лѣвая подключевая кровевозвратная жила. <i>Vena subcluvia sinistra.</i></p> <p>I I. Правая и лѣвая сонныя бѣющѣяся жилы. <i>Dextra et sinistra arteriae arotides.</i></p> <p>K K. Правая и лѣвая подключевнѣя бѣющѣяся жилы. <i>Dextra et sinistra arteriae subclaviae.</i></p> <p>L L. Нервы шестой пары, идущѣя въ легкое. <i>Nervi sexti paris, ad pulmones descendentes.</i></p> <p>M. Начало большой боевой, внизѣ идущей, жилы. <i>Aortae descendantis principium.</i></p> <p>N. Воздухоносный каналѣ, опрѣзанѣ подѣ глоткою. <i>Arteria aspara, sub larynge abscissa.</i></p> |
|---|--|

Ц 2

Фигура 2. изображающая въ особливости опѣ сердца происходящѣя и вселяющѣяся въ легкое сосуды. Которыя наслѣдующей картанѣ

пинѣ еще особо видѣнь
можно.

А. Около сердечная оболочка, отъ сердца отдѣленная. *Pericardium, a corde separatum.*

В. Сердце, усѣянное крововозвращными и бѣющими въночными жилами. *Cor, coronariis venis et arteriis confpersum.*

С. Пень боевой начальственной жилы, изъ сердца выходящей. *Truncus aortae, e corde emergens.*

Д. Низходящая часть онаго, вверхъ обращенная.

Е. Бѣущая легочная жила, съ лѣвой стороны въ легкое входящая и шамъ перлюющаяся. *Vena arteriosa sinistrorsum ad pulmones distributa.*

Г. Каналъ или протокъ между легочною и начальственной боевыми жилами.

Д. Правая ветвь легочно бѣущейся жилы. *Ramus dexter venae arteriosae f. pulmonalis.*

Н. Правая и лѣвая вѣтви легочной крововозвращной жилы. *Dexter & sinister rami venae pulmonalis, antiquis arteriae venosae.*

И. Сердечное ушко, или ушко въ сердцѣ. *Auricula cordis.*

К. Предстоящія серд у легких. *pulmones, cordi adfistentes.*

Л. Собственная легочная оболочка, прочъ отдѣленная.

Фигура подъ знакомъ 4 тосепъ Юпитера, изображаетъ цѣлое младенческое сердце.

А. Собственная сердечная плева, отъ сердца отдѣленная.

В. Обнаженная паренхима, или обнаженное сердца внушреннее, проциживающее кровъ, существо. *Parenchyma cordis nudum.*

С. Правое и лѣвое ушки сердца. *Auriculae cordis dextra et sinistra.*

Д. Начальственная боевая жила, изъ сердца выходящая.

Е. Часть начальственной полой крововозвращной жилы.

Фигура подъ знакомъ сонца, ☉ изображаетъ разрѣзанное сердце.

А. Часть въ поперекъ перрѣзаннаго сердца.

В.

В. Лѣвая полость, лѣвый пуспырь сердца. *Ventriculus sinister.*

С С. Правый пуспырь сердца. *Dexter ventriculus cordis.*

Д Д. Средостѣніе въ сердѣ. *Septum cordis.*

Фигура 3. изображающая большую кровезвращную полу ю жилу вкупѣ съ разрѣзаннымъ сердцемъ.

А. Устье кровезвращной вѣнечной жилы. *Orificium venae coronariae.*

В. Соустіе или соединеніе большія полныя жилы съ легкошною кровезвращною жидю. *Anastomosis inter venam cavam et venam pulmonalem s. arteriam venosam.*

С С С. Три оспроконечныя презубчесныя заслоночки. *Valvulae tricuspidales.*

Д Д Д. Отвершая правая полость или пуспырь сердца. *Ventriculus dexter cordis apertus.*

а а. Проходы между плевъ, окончивающихся въ средостѣніе сердца.

Фигура 4. шже почки самое изображающая.

А. Легкошная кровезвращная жила, въ правомъ пуспыри сердечномъ разрѣзанная. *Vena arteriosa, in cordis ventriculo dextro dissecta.*

В В В. Полулунныя, сигмоидальныя заслочки легкошной бѣющей жилы. *Valvulae sigmoideae s. femilunares venae arteriosae s. arteriae pulmonalis.*

С С С. Правая полость, правый пуспырь сердца открытый. *Dexter cordis ventriculus apertus.*

Фигура 5. изображающая дальнѣйшее соспояніе сердца.

А. Начальственная боевая жила, возлѣ сердца отрѣзанная. *Aorta, juxta cor dissecta.*

В В В. Сѣя жилы полулунныя заслоночки. *Eiusdem valvulae femilunares.*

С С. Лѣвая сердечная полость. *Cordis ventriculus sinister.*

Д. Заволоченная часть лѣваго сердечнаго пуспыря.

Фигура 6. изображающая соспояніе легкошной кровезвращной жилы.

А. Разрѣзанная легочная кровезовратная жила. *Arteria venosa difsecta.*

В. Слѣдѣ или знакѣ соустья между кровезовратною легочною и полою жилами. *Vestigium anastomofyos inter venam pulmonalem et cavam.*

В.В. Проходы между плевѣ идущіе въ сердечное пространство.

С С. Двѣ митрообразныя заслоночки. *Dux valvulae mytrales.*

Д Д. Отвореная лѣвая полость сердца. *Ventriculus cordis sinister apertus.*

Фигура 7. изображающая задней видѣ легкаго и дыхательнаго горла, съ сердцемъ соединенныхъ.

А. Правая чувствительная жила шестой пары, идущей къ легкому. *Nervus dexter sexti paris, ad pulmones veniens.*

В. Таковая же лѣвая чувствительная жила.

С. Средняя вѣтвь межъ ребѣрныхъ нервѣ, или чувствительныхъ жилъ.

Д. Продолженіе оной, простирающееся къ сердечному мышечку.

Е Е. Двѣ большія вѣтви дыхательнаго горла, которыя позади суть перепончатые. *Duo majores rami asperae arteriae posterius membracosi.*

Е Е. Задняя часть легкихъ.

Г. Собственная легочная пленочка. *Membranula pulmonum propria.*

Н Н. Оставленная часть сердца сердечнаго мышечка.

І. Сердце, находящееся въ естественномъ своемъ положеніи.


Фигура 8. изображающая въ особенности дыхательное горло.


А. Дыхательное горло, отрѣзанное при самой глоткѣ. *Aspera arteria, sub laryge abscissa.*

В. Правая вѣтвь, сначала на двѣ части раздѣляющаяся.

С. Лѣвая вѣтвь таковаго же состоянія.

д д д. &c. Кончики упомянутыхъ вѣтвей, въ перепончатые или пленочные трубочки или пузырьки окончивающіеся.





ш
бо
пе
сп

ш
вр
А.

В

С.

Д

а

З.

б

с

е

д

е

Таблица двенадцатая, изображающая пни большой полый крововозвратной, и начальственной боевой жилы съ ихъ главнѣйшими или оцупительнѣйшими вѣтвями, во всѣ части плеча простирающимися.

Фигура 1. изображающая большую крововозвратную полую жилу.

А. Начало или происхождение выше сердца простирающейся полый крововозвратной жилы.

В В. Происхождение подоплевыхъ вѣтвей. *Initium subclavium ramorum.*

С. Начало низходящаго пня. *Trunci descendens initium.*

Д Д. Подвздошныя вѣтви правая и лѣвая. *Rami iliaci dexter et sinister.*

а а а &. Безпаяная, одинакая крововозвратная жила. *Vena azygos.*

Здѣсь видны и вѣтви сего жилы, идущія къ ребрамъ.

б б. Вышняя крововозвратная междуреберная жила. *Vena intercostalis superior.*

с с. Внутренняя млечная крововозвратная жила. *Mammaria interna.*

* Грудосредостѣнная крововозвратная жила. *Vena mediastina.*

д д. Позвоношная крововозвратная жила. *Vertebris Vena.*

е е. Крововозвратная шейная жила, подъ чер-

помъ отсѣзанная. *Ingularis vena, sub cranio abscissa.*

ф ф. Вѣтвистая крововозвратная шейная жила. *Vena Ingularis externa.*

Сей жилы низшая или глубоже проходящая вѣтвь низходящъ къ орудіямъ голоса и слова, а потомъ подъ кожей разпростирается по лицу, вискамъ и позади ушей.

г г. Зашеечная крововозвратная жила. *Vena cervicalis.*

h h. Продолженіе подъ основными костями проходящихъ вѣтвей. *Processus ramorum subclavium.*

и и. Лопатковая внутренняя крововозвратная жила. *Scapularis interna vena.*

К К. Вѣтвистая крововозвратная лопатковая жила. *Vena scapularis externa.*

з з. Крововозвратная жила, къ плеченеподъемной мышцѣ идущая. *Vena, ad deltoiden lata.*

1 1. Вышняя грудная крововозвратная жила. *Thoracica vena superior.*

м м. Крововозвратная головная, здѣсь отсѣзанная жила. *Vena cephalica abscissa.*

п п.

- п п. Внутренняя ручная или печеночная кровевозвратная жила. *Vena basilica.*
- о о. Грудная низшая кровевозвратная жила. *Thoracica inferior.*
- р. Лѣвая кровевозвратная грудобрюшной преграды жила. *Vena phrenica sinistra.*
- р. Правая такая же жила.
- г г. Большая вѣтвь, разстилающаяся по выпуклой поверхности печени.
- ff t &. Продолженіе сея вѣтви, на лѣво и право распространяющіяся.
- и и. Вышшія поясничныя кровевозвратныя мышковыя жилы. *Supiores venæ musculæ lumbaræ.*
- у у. Кровевозвратныя жилы почечныхъ желѣзъ. *Venæ glandularum rena- lium.*
- Х Х. Почечныя кровевозвратныя правая и лѣвая жилы. *Venæ emulgentes dextra et sinistra.*
- З З. Кровевозвратныя сѣменные правая и лѣвая жилы. *Venæ spermaticæ dextra et sinistra.*
- к к. Происхожденіе поясничныхъ кровевозвратныхъ жилъ. *Exortus lumbarium venarum.*
- б б. Кровевозвратная мышковая поясничная жившая жила. *Vena muscula lumbaris interior.*
- у у. Крестцовая кровевозвратная жила. *Vena sacra.*
- А А. Внѣшняя подвздошная вѣтвь. *Ramus iliacus externus.*
- Е Е. Кровевозвратная надчеревная жила. *Vena epigastrica.*
- д д. Внутренняя подвздошная вѣтвь. *Ramus ilicus internus.*
- е е. Ягодичная кровевозвратная жила. *Vena glutea.*
- з з. Подчеревныя кровевозвратныя жилы. *epigastricæ venæ.*
- и и. Кровевозвратныя дѣспородныхъ частей жилы. *Venæ pudendæ.*
- ѳ ѳ. Паховая кровевозвратная жила. *Vena inguinalis.*
- К К &. Вѣтвь в голенной кровевозвратной жилы. *ramus venæ cruralis.*
- і і. Кровевозвратная вѣтшная бердоплюсовая жила. *Vena saphena.*
- л л. Сѣдалищная кровевозвратная жила. *Vena ischiadica.*
- Фигура 2. изображающая вѣ особливоспи вѣночную кровевозвратную сердечную жилу.
- Фигура 3. изображающая боевую легкошную жилу, изѣ праваго сердечнаго пустыря происходящую.
- А. Сея жилы происхожденіе.
- В В. Ея вѣтви, кѣ правой части легкаго идущія.
- С С. Ея же вѣтви, вѣ лѣвую часть легкаго входящія.

Фигу-

Фигура 4. изображающая начальспвенную боевую жилу или аорту.

А. Начало сей жилы, отъ сердца возникающей. *Initium aortæ, e corde affurgentis.*

В В. Начало и продолженіе подостовыхъ боевыхъ жилъ.

С. Пень низходящей начальспвенной бѣющейсѣ жилы. *Truncus aortæ descendentis.*

Д Д. Подздошныя вѣтви правая и лѣвая. *Rami iliaci dexter & finister.*

а а. Сонная бѣющаяся жила. *Arteria carotis.*

б б. Вѣшняя вѣтвь сѣя жилы, проспирающаяся къ зѣвамъ, лицу и задней спороу ушей.

с с. Снотворная бѣющаяся внушренная жила, подъ черепомъ отрѣзанная. *Carotis interna, sub cranio abrupta.*

д д. Позвоношная бѣющаяся жилѣ. *Arteria vertebralis.*

Здѣсь она отрѣзанна.

ѣ ѣ. Зашеешная мышковая бѣющаяся жила. *Cervicalis muscula arteria.*

е е. Внушренная шитечная бѣющаяся жила. *Mammaria arteria interna.*

ф ф. Вѣтви вышшей междуреберной бѣющейсѣ жилы. *Rami arteriae intercostalis superioris.*

г г. Внушренная лопатковая бѣющаяся жила. *Scapularis arteria interna.*

h h. Вѣшняя лопатковая бѣющаяся жила. *Externa scapularis.*

i i. Вышшая грудная бѣющаяся жила. *Arteria thoracica superior.*

k k. Низшая такаѣ же жила.

l m. Бѣющіѣя жилы, разсѣяшіѣя по мышцамъ, покрывающимъ рама.

n n. Междуребренныя низшіѣя бѣющіѣя жилы. *Arteriae intercostales inferiores.*

о о. Бѣющіѣя грудобрюшной преграды жилы. *Arterie phrenicae.*

p. Большая брюшная бѣющаяся жила. *arteria insignis coeliaca.*

q. Сѣя жилы правая вѣтвь, на при часи раздѣляющаяся, изъ коихъ двѣ вѣтки то естѣ вышшая и низшая идущѣ къ печенкѣ, а третіѣя средняя проспираетсѣ къ желудному пѣзырю.

г. Лѣвая вѣтвь брюшной бѣющейсѣ жилы.

с. Правая желудочная бѣющаяся жила. *Arteria gastrica dextra.*

т. Селезеночная бѣющаяся жила. *Arteria splenica.*

п. Сальничная бѣющаяся жила. *Epiplioica arteria.*


п г. Бѣющаяся сальничножелудочная жила. *Arteria gastroeiploica.*


х. Бѣющаяся жила, идущая къ надпочечной желѣзѣ. *Arteria, ad glandulam suprarenalem exposita.*

- у у у &. Брижейная вышшая бѣющая жила, на многія вѣтви раздѣленная. *Arteria meferaica, in plures ramos divisa.*
- z z. Почечныя бѣющіяся жилы. *Arteriae emulgentes.*
- « « &. Происхожденіе поясничныхъ бѣющихъ жилъ.
- б б. Сѣмennyя бѣющіяся жилы. *Arteriae spermaticae.*
- у у. Брижейная вышшая жила, на многія вѣтви раздѣленная. *Arteria mefenterica inferior, in ramos divisa.*
- б. Крестцовая бѣющая жила. *Arteria sacra.*
- Δ Δ. Подвздошная вѣшняя бѣющая жила. *Arteria iliaca externa.*
- δ δ. Внутренняя бѣющая такая же жила. *interna.*
- и и. Ягодничная бѣющая жила. *Glutea.*
- з з. Подчеревная бѣющая жила. *Arteria hypogastrica.*
- ♀ ♀. Подчеревная бѣющая жила, къ маткѣ идущая. *Ad uterum exprogesta.*
- Сіа сартерія нѣчто особеннаго имѣетъ.
- с с. Пупочная бѣющая жила. *Arteria umbilicalis.*
- Е Е. Надчеревная бѣющая жила. *Arteria epigastrica.*
- θ θ. Дѣтородныхъ часней бѣющая жила. *Arteria pudenda.*
- і і. Сѣдалищная бѣющая жила. *Arteria ischiadica.*
- к к. Низшая бѣющая мышечная жила. *Arteria muscula inferior.*
- λ λ. Бѣющая жила, внутренней подчеревной мышцѣ идущая.
- Фигура 5. изображающая въ особливости вѣточную сердечную бѣющуюся жилу.
- Фигура 6. изображающая легкошную кровезоврапную жилу.
- А. Происхожденіе оной или лучше сказать окончаніе въ левой пустырѣ сердца.
- В В. вѣтви оной въ правую часть легкаго проникнувшія.
- С С. Подобныя же вѣтви, въ лѣвую часть легкаго вселяющіяся.



исл
са-
яся
уса.
пей
егия
яся
са.
ш-
ш-
из,
ной
аю-
пи
ю-
аю-
ве-
или
ча-
ырь
вую
ну-
еъ
все-





НЫ
КО
МБ
МЯ
МИ
ЭВ

Щ
Щ

Щ
Щ

Щ
Щ

Щ
Щ

Б
Э

П
П

П

Таблица принадлежная, изображающая глоточные хрящи и мышцы оныхъ; рогоязычную кость съ ея мышками; языкъ съ чувствительными его жилами и мышками; язычекъ съ двумя парами мышцъ и окололежащихъ зѣвныхъ мидаловидныхъ желѣзъ; наконецъ шейные позвонки и склоняющіе ихъ мышцы.

Фигура 1. изображающая внѣшній видъ щитовиднаго хряща.

хрящъ съ его принадлежностями.

A. Щитовидный хрящъ. *Cartilago thyroïdes fivefcutiformis.*

Фигура 2. изображающая внутренній видъ щитовиднаго хряща.

В. Пара мышцъ рогоязычной кости и щитовиднаго хряща. *Par musculorum hyothyroïdeorum.*

Фигура 3. изображающая задней видъ кольцеобразнаго хряща.

С С С С. Пара мышцъ груднощитовидныхъ или грудной кости и щитовиднаго хряща. *Par musculorum sternothyroïdeorum.*

Фигура 4. изображающая передній видъ кольцеобразнаго хряща.

D D. Маленькія мышцы кольцеобразныхъ хрящей. *Parv. musculi cricothyroïdei.*

Фигура 5. и 6. изображаютъ черпалообразные хрящи.

Фигура 7. изображающая глоточный или надглоточный хрящикъ.

Фигура 9. изображающая надглотку или надглоточный хрящикъ съ его мышцами.

Фигура 8. изображающая щитовидный

A. Внѣшній видъ надглоточнаго хрящика, соединен-

- единеннаго съ глоткою. *Epiglottidis facies externa.*
- В В. Щипочерпалообразныя мышцы, или мышцы щипообразнаго хряща и хряща черпаловиднаго, которыя сжимають глотку. *Musculi thyroarythenoidei.*
- С С. Коллечерпалообразныя боковыя или коллцеобразнаго и щиповиднаго хрящей мышцы, расширяющія глотку. *Cricothyroarythenoidei musculi.*
- Д. Кольцеобразный хрящъ. *Cartilago cricoides.*
- Е Е. Частнца дыхательнаго горла или воздухоноснаго канала, спереди видимая. *Partio aspera arteriae.*
- Фигура 10. изображающая внутреннй видъ надглоточнаго хряща и прочія части ему сопредѣльныя.
- А. Внутренней видъ надглоточнаго хряща.
- а а. Возвышенія черпалообразныхъ хрящей.
- В В. Мышцы черпалообразныхъ хрящей, съ обеихъ сторонъ отрѣзаныя. *Arithenoidei musculi.*
- С С. Кольцеобразнаго хряща задня мышца. *Cricoidi musculi postici.*
- Д. Пространнѣйшая часть коллцеобразнаго хряща.
- Е Е. Часть плечовая или перепончатая воздухоноснаго канала, позади видная.
- Фигура 11. изображающая язычную кость и прочая.
- А. Основаніе рогоязычной кости. *Basis ossis hyoidei.*
- С С С С &. Придѣлочки язычной кости, кобылкою именуемой.
- Фигура 12. изображающая рогоязычную же кость.
- А. Внутреннй видъ язычной кости, представляющій основаніе.
- В. Бока той же кости.
- С С. Хрящевыя язычной кости придѣлочки.
- Фигура 13. изображающая бока и мышцы рогоязычной кости.
- А. Бока рогоязычной кости.

В В. Бородорогоязычные, внизъ обращенныя мышцы. *Geniohyoidei musculi.*

С С. Внутреннія бородорогоязычными именуемыя мышцы. *Musculi geniohyoidei interni, vulgo genyoglossi dicti.*

Д Д Д Д. Грудинорогоязычныя мышцы, низележающія прямо внизъ язычную кость. *Musculi sternohyoidei.*

Е Е. Шилорогоязычныя, шлообразнаго тоесть опростка и рогоязычной кости, мышцы влекущія вверхъ наискось язычную кость. *Musculi styloglossi.*

Е Е Е. Рогоязычныя мышцы. *Ceratohyoidei musculi.*

г г. Посредственная, въ срединѣ лежащая сугожимая часть.

Фигура 14. представляющая языкъ и его мышцы.

А. Низшая конечная часть языка.

В В В В. Основноязычныя основанія, то есть язычной кости и языка мышцы, внизъжимающія языкъ. *Basiloglossi musculi.*

б б. Чувственожилное существо, между мышцами находящееся.

С С. Рогоязычныя, роговъ тоесть язычной кости и самого языка мышцы, здѣсь нѣсколько грубо изображенныя. *Ceratoglossi musculi.*

Д Д. Шилоязычныя мышцы. *Styloglossi musculi.*

Е Е. Кореннозубоязычныя мышцы. *Musculi myloglossi.*

а а. Язычныя чувствительныя жилы.

б б. Чувствительныя же язычныя жилы, отъ разныхъ источниковъ происходящія.

Фигура 15. изображающая язычокъ въ горлѣ и прочая.

А. Язычекъ въ горлѣ. *Uvula, gargarion.*

В В. Внѣшняя пара мышцъ. *Par musculorum exterius.*

б б. Сухая язычная жила, проходящая лобжинку или бороздочку.

с с. Внутренняя пара мышцъ, нѣсколько сжатая.

Д. Часть неба, отъ которой зависятъ язычекъ. *Parapala-*

palati, a qua cuncta rep-
det.

Фигура 16. и 17. изоб-
ражающѣ миндаловид-
ныя желѣзы, по спо-
ронамѣ эффовѣ лежащія.
Paristhmia, antias, amygdalæ,
tonsillæ.

Фигура 18. изобража-
ющая шейныя мышцы.

А А. Длинные мышцы,
шею склоняющія.

В В. На бокѣ склоняющія
шею, и вверхъ подни-
мающія ребра мышцы.
Musculi scaleni.

и и. Пара чувствительныхѣ
жилѣ, къ раменамѣ про-
спирающаяся.

С С. Наклоняющія голову
мышцы. Mastoidei cum
ceteris.

Фигура 19. изобража-
ющая семѣ шейныхѣ
позвонковѣ.

Фигура 20. изобража-
ющая первый шейный

позвонокѣ и его бразды
и дыры.

а а. Двѣ лобжины, воспрі-
емлющія зашылочѣ. Duo
latus, occiput suscipientes.

б б. Боковыя дыры, сквозь
которыя проходятѣ въ
мозгѣ боевыя жилы.

Фигура 21. изобража-
ющая впорый позвонокѣ
шеи и прочая.

а. Зубообразный отростокѣ
сего позвонка. Dentifor-
mis processus.

б. Раздвоенная спина.

Фигура 22. изобража-
ющая седьмой шейный
позвонокѣ, на кото-
ромѣ

а. Изображаетѣ простую
спину или отростокѣ.
Впрочемѣ онѣ подобенѣ
есть другимѣ спиннымѣ
или хребешнымѣ поз-
вонкамѣ.







Таблица четырнадцатая, представляющая мышцы, ницъ положеннаго трупa, лежащія на шеѣ, лопаткахъ, спинѣ и чреслахъ или поясницѣ.

Фигура 1. изображающая слѣдующія мышцы.

А А. Колпакообразныя или на трапеціѣ находящіяся мышцы. *Musculi trapezii.*

В В. Ромбоидальная или чеповероугольная мышца. *Rhomboideus musculus.*

С С D D. Самая широкая спинная мышца. *Musculus latissimus dorsi.*

С С. Мясная часть сея мышцы.

D D. Перепончатое происхожденіе пространнѣйшей спинной мышцы, начинающееся возлѣ поясницы или чресла.

Фигура 2. изображающая разныя мышцы задней стороны трупa.

А А. Неправильночетвероспоронная или колпакообразная въ естественномъ положеніи находящаяся мышца. *Trapezius extra situm positus.*

В В. Ромбоидальная мышца, вслѣ въ естественномъ положеніи находящаяся. *Rhomboideus in situ totus apertus.*

С. Также самая мышца, въ положеніи своего находящаяся, однако еще прикрѣпленная къ основанію лопатки.

D D. Мышцы, поднимающія лопатку. *Levatores scapulae.*

Е. Зубчатая задняя мышца въ своемъ естественномъ положеніи. *Serrati postici in suo situ.*

Е. Большая задняя зубчатая мышца въ своемъ положеніи. *Serratus major posticus in suo situ.*

Г. Также мышца въ своего положеніи.

Н Н. Треугольныя, или соепообразныя заднія, назадъ голову склоняющія мышцы. *Splenii musculi.*

І І. Часть, объемлющихъ или разносплеменныхъ мышцъ. *Portio complexorum musculorum.*

К К. Соепообразныя мышцы, сверху нѣсколько отрушенныя. *Massoidei superius separati.*

Л Л. Крестцовопоясничныя мышцы находящіяся въ своемъ естественномъ положеніи. *Sacrolumbares in suo situ.*

М М. Самая длинная спинная мышца въ своемъ положеніи.

Н Н. Соединенныя происхожденія крестцовою поясничной и самой длинной спинной мышцъ.

О О. Открытыя нѣкопорымъ образомъ четвероспоронная поясничныя мыш-

мышцы. *Quadrati lumborum.*

Фигура 3. изображающая прочія мышцы.

А А. Соединенныя начала крестцовопоясничной и самой длинной спинной мышце.

В В В В. Поясничныя и крестцовыя мышцы, нѣсколько отъ мѣста своего отдаленныя и на сухія жилы раздѣленныя.

С С С С. Самые длинныя мышцы, отъ мѣста своего отдаленныя и на сухожилныя свои концы раздѣленныя.

D D. Междупинныя еще не отдѣленныя отъ своего мѣста мышцы. *Musculi interspinati nondum separati.*

Е. Объемлющая головная въ своемъ положеніи мышца. *Capitis complexus musculus in suo situ.*

F. Таже самая мышца, съ мѣста своего опята.

G G. Протягивающія шею, въ естественномъ положеніи, находящіяся, мышцы. *Musculi coli extensores in suo situ.*

Н. Часть сосцевидной мышцы.

И. Прямая большая головная мышца, отдѣленная нѣсколько съ плѣмъ на мѣреніемъ, что бы прямую мышцу выдѣль можно было.

К. Вышая косая головная мышца. *Obliquus superior capitis.*

L. Косая низшая мышца. *Obliquus inferior.*

Фигура 4. изображающая поясничныя мышцы.

А А &. Спинная, хребетная мышца, съ естественнаго своего мѣстоположенія отдѣленная съ плѣмъ, что бы видѣть можно было рядъ сухихъ жилъ.

В В. Поясничная съ своимъ положеніи мышца. *Musculus lumborum.*

С С. Часть четверосторонней поясничной мышцы. *Quadrati lumborum portio.*

D D. Шейныя между спинныя въ своемъ положеніи мышцы. *Musculi colli spinati in suo situ.*

Е Е. Поперечныя шейныя мышцы. Здѣсь онѣ нарочно большими и длинными изображены и сняты съ своего мѣста съ плѣмъ, что бы можно было видѣть рядъ сухихъ жилъ.

F F. Сосцевидныя отъ груди отдѣленныя, и назадъ завернутыя мышцы. *Mastoides a femore separati et ad posteriora reflexi.*


G G. Низшія кости головныя мышцы.

Н Н. Косыя вышнія головныя мышцы.

И. Прямая большія головныя мышцы, нѣсколько раздѣленныя.

К К. Меншія прямыя головныя мышцы, въ естественномъ положеніи находящіяся.

да,
аю-
ы-
ная
вен-
ло-
сб
бнъ
хъ
емъ
лф-
ней
цы.
то.
ин-
нги
сои
ныя
на-
ин-
сия-
сб
жно
су-
ру-
адъ
цы.
gati
i.
лов-
лов-
лов-
ько
лов-
ше-
на-






Таблица пятнадцатая, изображающая лич-
ные и низшей челюсти мышиды, также ко-
сти черепа и обихъ челюстей.

Фигура 1. предспа-
вляющая головныя по-
крывы, черепъ, мышиды
лба, глазныхъ вѣкъ,
носа и прочая.

А А. Опаѣленная отъ голо-
вы кожа.

В В. Опаѣленная мясистая
оболочка, покровъ подъ
кожею. *Panniculus car-
nosus separatus.*

С С. Снятая съ черепа пле-
ва, надчерепною имену-
емая. *Pericranium de-
tractum.*

Д Д. Обнаженный черепъ.
Cranium nudum.

Е. Челюная или лобная мы-
шица. *Musculus frontis.*

Ф Ф. Смыкающая глазныя
вѣки мышца. *Musculus
palpebrarum clausor.*

Г. Первая носовая мышца.
Musculus nasi primus.

Н. Другая носовая мышца.

И. Разширяющая носъ, или
носовые боковые хрящи
мышца. *Musculus, alas
nasi dilatans.*

К. Мышица, поднимающая
губу. *Labrum attolens.*

Л. Вверхъ возводящая губу
мышца. *Sarsum abducens.*

М. Внизъ губу влекущая
мышца. *Deorsum abdu-
cens labrum.*

Н Н. Сжимающая губы мы-
шица. *Constrictor labi-
orum.*

п. Внизъ подавляющая гу-
бу мышца. *Deorsum
labrum deprimens.*

О. Ланищная, щечная мы-
шица. *Buccinator.*

Р Р. Височная, на своемъ мѣ-
стѣ находящаяся, мыши-
ца. *Temporalis in suo
situ.*

Q. Поднимающая прямо
ухо мышца. *Attolens
auriculam.*

Р. Косодвижушая ухо мы-
шица. *Oblique movens.*

С. Жевательная въ есте-
ственномъ положеніи
мышца. *Masseter in situ.*

Т Т. Отрѣшенная двучре-
вная мышца. *Digastric-
us, a principio solutus.*

Часть IV.

Ч

Фигура

Фигура 2. представляющая височныя и другія мышцы.

А А А. Височная мышца, въ своего положенія находящаяся, по причинѣ разломанной челюсти.

а а. Приращеніе оной къ остроконечному челюстному отростку. *Insertio.*

В В. Жевательная мышца, съ мѣсна своего снятая. *Maffeter ferparatus.*

С С. Двучеревная мышца: съ конца опрушенная и раздѣленная.

Д Д. Внутренняя клинообразнаго отростка мышца. *Pterygordeus internus.*

Е Е Е Е. Вѣтшняя пакая же мышца.

Г. Четвересторонняя мышца, или мышечное разширеніе. *Expanfio mufculofa.*

Фигура 3. представляющая головныя кости, швы и прочая.

А. Челюная кость, чело. *Os frontis.*

а а а. Вѣнечный шовъ, или связь. *fatura coronalis.*

а. Дира челюной кости, сквозь кошорую проходящій чувствительная жила третей пары.

В. Правая передняя головная кость. *Sinciput dextrum.*

в в. Мечеобразный шовъ. *Sutura fagittalis.*

С. Передняя лѣвая головная кость. *Siniftrum os fincipitis.*

Д. Височная кость. *Os temporum.*

с с. Чешуйчатая головного черепа шивка. *Lambdoides, mendofa futura.*

д. Сосцеобразный отростокъ. *proceffus maftoideus.*

е. Скуловый отростокъ височной кости. *Proceffus jugalis offis temporum.*

Е. Первая кость вышней челюсти. *Os primum maxillæ fuperioris.*

Г. Ея скуловый отростокъ.

Г. Другая кость вышней челюсти.

Н. Тоя же челюсти третія кость.

І. Четвертая кость вышней же челюсти.

і.

- і. Дирочка въ оной для проходу чувствительной жилы третьей пары.
- К. Пятая кость той же челюсти.
- Л. Низшая челюсть. *Maxilla inferior.*
- І. Дира въ оной, сквозь которую проходитъ чувствительная жила четвертой пары.
- М. Острый отростокъ низшей челюсти.
- Н. Тупый отростокъ низшей челюсти. *Processus maxillae inferiores retusus.*
- Фигура 4. изображающая по же почти самое.
- А. Лѣвая кость передней части головы.
- а а. Мечевидный шовъ. *Sutura sagittalis.*
- В. Правая кость передней части головы.
- в в. Задній шовъ головного черепа. *Sutura lambdoidea.*
- С. Затылочная кость. *Os occipitis.*
- Д. Треугольная косточка. *Ossiculum triangulare.*
- Ф. Частица височной кости съ сосцевиднымъ отросткомъ.
- Фигура 5. изображающая впадины и прочія кости головныя.
- А А. Впадины Затылочной кости внутри черепа, гдѣ содержится меньшій мозгъ. *Sinus, ubi cerebellum recumbit.*
- В. Внутренній видъ клиновидной кости. *Facies interna ossis sphenoides.*
- С С. Дирчатая, решетчатая кость. *Os ethmoides.*
- Д. Впадина чельной кости по выше носа.
- а а. Первая дира клиновидной кости.
- а а. Вторая дира той же кости.
- в в. Третья дира клиновидной же кости.
- с с. Шестая дира той же кости.
- +. Седьмая дира той же кости.
- д д. Пятая дира той же кости.

е е. Первая дыра височной кости. Foramen primum ossis temporum.	Е Е. Скуловой отростокъ. Processus jugalis.
г г. Каменистой отростокъ височной кости. Processus petrosus ossis temporum.	Г. Внѣшній видъ клинообразной кости.
з з. Третья дыра височной кости.	Г Н Г Н. Крылообразные отростки. Processus aliformes, pterygoides.
и и. Четвертая и пятая дыры затылочной кости.	І. Раздѣляющая ноздри кость. Vomer.
Фигура б. изображающая затылокъ и прочая.	К К. Шестая кость верхней челюсти.
А А. Затылочная кость снизу видимая.	К Р. Дирочки, сквозь которыя проходятъ часть четвертой пары чувствительныхъ жилъ къ небу.
а а. Затылочной кости отростки, съ которыми соединяются первой шейной позвонокъ.	Л Л. Часть четвертой кости верхней челюсти.
В В. Часть височной кости.	м. Четыре передніе зубы. Dentes quatuor incisores.
С С. Сосцеобразный отростокъ. Mammiiformis processus.	п п. Пески зубы. Dentes canini.
Д Д. Шилообразная прищѣпочки. Appendix styloformis.	о о. Прочіе коренные зубы. Molares dentes.












Таблица шесънадцатая, представляющая мозгъ, его покровы, пазухи, отростки и прочая.

Фигура 1. представляющая мозговую твердую оболочку и прочая.

А А. Твердая оболочка, покрывающая мозгъ. *Dura mater, cerebrum operiens.*

а а. Боевые и кровезовратныя жилы, разбѣянные по твердой мозговой оболочкѣ. *Arteriae et venae per meningem sparsae.*

В. Мозгъ, тонкою оболочкою покрытый. *Cerebrum, pia matre testum.*

б б. Закаулки мозговые. *Anfractus cerebri.*

с с с. Сосуды, отъ третьей пазухи или впадинны къ тонкой оболочкѣ идущіе.

С. Жесткая, твердая мозговая твердой оболочка, и прочая.

Фигура 2. изображающая продолженія мозговой твердой оболочки и прочая.

А А. Отростокъ длиннѣе прочихъ отростковъ твердой оболочки, называемый мечеобраз-

нымъ, который здѣсь опредѣленъ отъ своего мѣстоположенія. *Falciaformis, five longior progreffus duræ matris.*

а а. Третья пазуха твердой мозговой оболочки, здѣсь открывшая. *Tertius sinus.*

б б. Той же оболочки меньшая низшая пазуха.

В В. Частица мозолистого тѣла здѣсь открывшая. *Portio corporis callosi detecta.*

С С С С. Мозгъ, нѣсколько на стороны или бока раздвинутъ.

с с с с. Сосуды, происходящія отъ четвертой пазухи и разпространяющіеся по волокнистой части мозга, мозолистымъ тѣломъ именуемой.

Д Д. Твердая мозговая оболочка, съ обѣихъ сторонъ вѣсящая.

Фигура 3. изображающая внутреннія части мозга.

А А. Существо мозга, надѣль разными частями разбѣзанное.

В В. Мозолистое тѣло нѣсколько наружу выставленное. *Corpus callosum.*

б б.

В В. Два пропяхженія сводо-
подобнаго существа въ
мозгу. *Cruca fornicis.*

С. Назадъ опведенная ме-
чеобразная мозговая па-
зуха.

Д Д. Правый переднй пу-
стырь, или правая пе-
реднйшая полоснь въ
мозгу, сверху откры-
тая. *Ventriculus dexter
anterior, desuper apertus.*

Е Е. Лѣвая такая же по-
лоснь.

Г Г. Ликосоставное спле-
щеніе сосудовъ, въ выш-
ше упомянутыхъ пола-
стяхъ. *Plexus choroï-
deus.*

Г. Часть прозрачнаго про-
стѣника въ мозгу.

Н Н. Твердая мозговая обо-
лочка, съ обѣихъ сто-
ронъ опшиорженная.

Фигура 4. предспа-
вляющая прочія части
мозга.

А А. Мозъ, на розныя ча-
сти раздѣленный.

В. Съ верху опдѣленное и
внизъ закрывденное сво-
доподобное существо въ
мозгу. *Fornix sublata et
deorsum reflexa.*

С С. Раздѣленная вышшая
часть правой передней
мозговой полости.

Д Д. Такая же часть лѣ-
вой полости.

Е. Лещевина или лобжина,
означающая третью моз-
говую полость. *Rima,
tertium ventriculū defig-
nans.*

Г Г. Твердая мозговая обо-
лочка. *Dura mater.*

а. Шишкѣ подобная въ моз-
гу желѣза, конической
видѣ имѣющая мозговая
желѣза. *Glundula pine-
alis, conarium. (*)*

Д

(*) Сія желѣза находится въ мозгу между чертогами
зрительныхъ чувствительныхъ жилъ и возвышеніи.
Картезиі утверждалъ, что сія желѣза составляетъ
жилище души, или по крайней мѣрѣ источникъ пер-
воначальнѣйшихъ ея способностей, но не справедливо.
Опвергается утвержденіе его имѣмъ, что есть такіа
животныя, которыя хотя и имѣютъ сію желѣзу и
при-

в в. Возвышенія въ мозгу, задницами называемыя, два шоесть бугорка въ мозгу, шару подобный видъ имѣющіе, по задѣ черпеговъ зримельныхъ чувствительныхъ жилъ находящіяся.

с с. Два яврамъ подобныя заднія возвышенія въ мозгу, лежащія подлѣ душевной желѣзы. *Testes cerebri ad glandulam pinealem.*

д. Продолговатая лобжинка между мозговыми возвышеніями находящаяся, у анатомиковъ тайнымъ женскимъ удомъ называемая. *Vulva cerebri.*

Сія лобжинка на слѣдующей таблицѣ яснѣе изображається.

Фигура 5. изображающая мозгъ и его полости.

А А В В С С. Мозгъ, и его переднія полости, сверху открытыя.

г. Часть ликосоставнаго сосудовъ сплетенія, сверху чрезъ полости пропущенная.

Д. Отростокъ твердой оболочки, который прочихъ есть коротче.

Е Е Е. Серповидный отростокъ. *Fasciformis processus.*

Г. Мѣсто соединенія чепирехъ твердой оболочки пазухъ, Герофиловыми

Ч 4

ши-

припомъ довольно великую, однакожъ ни воображенія, ни памяти, ни другихъ высокихъ и первоначальныхъ способней душевныхъ не имѣющъ. Чтожъ принадлежитъ до ея употребленія, то можно думать, что она прѣмлемъ въ себя сыворошочныя влаги, отъ крови отдѣляемая, и содержишь въ себѣ до тѣхъ поръ, пока кровезовращныя жилы или другіе какіе либо прошеки, опорожнившись, всосутъ оныя въ себя и изведутъ въ другія изъ головы мѣста. Подозрѣніе же одного изъ весьма ученыхъ сочинителей, что якобы въ сей желѣзѣ отдѣлялась нѣкоторая острая щелочная соль, подобная летучей пряной соли, и, проникнувши въ пень спанбвой жилы, оживляла жизненные соки и предохраняла ихъ отъ сгущенія, оставляемыхъ на изслѣдываніе другимъ.

писками называемыя.
Togulag Negrofilii.

Г. Снятая твердая мозго-
вая оболочка.

а. Первая твердой оболоч-
ки, возвращающая изъ
мозгу кровь сердцу пазу-
ха. Sinus primus duræ
matris.

б. Вторая той же оболочки
подобная первой пазуха.

с с с. Третья такая же па-
зуха.

d d d. Пазуха, которая есть
меньше въ серповидномъ
отростки мозговой
твердой оболочки.

е. Четвертая пазуха твер-
дой мозговой оболочки.

Фигура б. предста-
вляющая меньший мозгъ
и его отростки.

А А В В С С f f. Литеры сѣи
поже самое изобража-
ющѣ, что и на пятой
фигурѣ.

D D. Меньшій мозгъ еѣ сво-
емъ естественныхъ по-
ложеніи. Cerebellum in
suo situ.

Е. Червообразный меньшаго
мозга отростокъ. Vermis
formis cerebelli processus.

Ф Ф. Твердая оболочка, внизъ
высящая.

Г Г. Также самая оболочка,
внизъ съ пазухами опу-
щенная.


па-
згб

сїи
жа-
шой

сво-
по-
in

аго
ermi
Hus.
изб

нка,
пу-



IX



бо.
мо.
мо.

юш
пер
сп
про
ны
пр
и
ил
вк
па
до
су
Ар
ско
ло
чер
А А

В.

С С

Д Д

Таблица семнадцатая, представляющая въ большомъ видѣ какъ большого, такъ и меньшаго мозга пазухи такъ, какъ то древнихъ покушеніе могло оныя изслѣдовать и открытъ свѣту.

Фигура 1. изображающая низшую пазуху переднихъ мозговыхъ пустырей или полосей, произхожденіе зрительныхъ жилъ, часть шрепяго же пустыря, и четвертый пустырь или четвертую полость вкупѣ съ возвышеніями, также протяженія сводоподобнаго мозгового существа, и то, что Аранціи сравнялъ съ морскою рыбою, похожую на лошадь, или шелковымъ червякомъ

А А А А. Съ обѣихъ сторонъ отрывающаяся твердая мозговая оболочка.

В. Гребню подобный отростокъ решетчатой кости. *Processus ossis cribiformis, cruræ similis*

С С. Часть клиновидной кости, подъ плевою, еспыли подняты мозгъ, глазамъ представляющаяся.

Д Д. Переднѣе отростки клиновидной кости, отчасти производяще впадину турецкаго сѣдалища, *Ephippi pars.*

Е Е Е Е. Оставшаяся часть мозга послѣ разрѣзанія.

Г. Переднѣе протяженія сводоподобнаго мозолистого существа въ мозгу.

Г Г. Разширенія мозолистого сводоподобнаго существа въ мозгу, копоры именуются задними протяженіями.

Н Н. Отростки переднихъ полосей мозга, называемыя Аранціемъ морскими лошадьми или шелковыми червяками. *Hippocampi five bombices Arantii*

І І І І. Низшая пазуха или впадина переднихъ пустырей или полосей мозга.

К. Конечность мозолистого пѣла, или существа въ мозгу, выдающаяся на подобіе ягодницъ.

Л. Шишкѣ подобная желѣза. *Glandula pinealis.*

М М. Возвышенія, япрамъ подобныя. *Protuberantiae testibus æquiparatae.*

Н Н. Впадина, между большихъ и малыхъ мозговъ называемая обыкновенно четвертымъ пустыремъ или полостью мозга. *Ventriculus quartus.*

О О О О. Часть дикосоставнаго сосудовъ сплетенія завернувшая, копоры про-

ходила поверхъ пазухи мозговыхъ полосей.

P P. Передняя часть мозгового основанія.

Q. Дно третьей полости мозга, гдѣ задняя дѣра, которую сравниють съ проходомъ, простирается къ началу спановой мозговой жилы, а передняя, которой предполагается возвышеніе, женскому уду подобное, идетъ къ воронкѣ или каналу либо протоку, чрезъ который сывороточныя влаги изъ мозговыхъ полосей низтекаютъ къ мокротной желѣзѣ.

R R R R. Часть много составнаго сплетенія сосудовъ.

S S. Корни зрительныхъ чувствительныхъ жилъ.

T. Соединеніе зрительныхъ чувствительныхъ жилъ.

V V. Соединенныя зрительныя жилы, идущія къ глазамъ.

Фигура 2. изображающая собственную меньшаго мозжечка полость, которую лучшіе анатомики называютъ чепвершою полостью, впадиною или чепвершымъ пуспыремъ мозга.

A A A. Малаго мозга обѣ доли, въ цѣлости находящіяся. *Cerebelli portiones integrae.*

B B B B. Внутренній видъ малаго мозга, помощію разрѣза видимый.

C C. Червообразный малаго мозга отростокъ, коего часть верхняя здѣсь отрѣзана.

D D. Собственная меньшаго мозга полость, имѣющая двѣ борозды.

E. Бугорокъ промежъ двухъ бороздъ.

F. Дѣра прохода, или протока, который начинается отъ третьей полости мозга и идетъ къ началу спановой мозговой жилы.

G. Валина или бразда спановой мозговой жилы, писательному перу подобная. *Calamus scriptorius, five sinus calamo similis.*

H. Лобжинка въ вышепомянутой браздѣ.

I I. Отрѣзанный пенъ или спиколь нисходящей спановой мозговой жилы. *Truncus medullæ spinalis abscissus.*








Таблица восемнадцатая, показывающая происхождение въ черепѣ чувствительныхъ жилъ, попомѣ главнѣйшія вътѣви претѣй и четвертой пары; по семѣ мокрошную желѣзу, съ воронкою или прошомкомъ къ оной; удивительнаго спроенія сътѣ, четвертую полость желудка, и знатнѣйшія или ошупишельнѣйшія чувствительныя жилы, происходящія отъ спановой мозговой жилы.

Фигура 1. изображающая мозгъ, коего большая часть сверху срѣзана, также малой мозгъ, на бокъ склоненный или сдвинутый.

А. Обонятельная чувствительная жила. Nervus olfactorius.

а. Ея опросокъ, сосцеобразнымъ называемый.

В. Зрительная чувствительная жила, по естѣ претѣй пары. Opticus nervus.

С С. Чувствительная жила второй пары. Nervus secundi paris.

Д Д. Чувствительная жила претѣй пары.

Е Е. Чувствительная жила четвертой пары.

Г Г. Чувствительная жила пятой пары.

Г Г. Чувствительная жила шестой пары; жила седьмой пары, по причинѣ глубокаго происхожденія своего здѣсь не видна.

Фигура 2. изображающая со стороны головы чувствительныя жилы.

А. Чувствительная жила претѣй пары.

В. Ея вътѣвь, которая проходитъ сивозъ диру чельной кости.

С. Вътѣвь, той же пары, которая проходитъ сивозъ

- сквозь диру четвертой кости верхней челюсти.
- D. Чувствительная жила четвертого соединенія или совокупленія.
- E. Ея вѣтвь, простирающаяся къ зубамъ и деснамъ верхней челюсти.
- F. Вѣтвь четвертого совокупленія чувствительныхъ жилъ, простирающаяся къ языку.
- G. Ея вѣтви, входящія въ низшую челюсть.
- H. Также самая вѣтвь, которая выходитъ изъ передней дыры нижней челюсти.
- Фигура 3. изображающая исподній видъ мозга и спанавой мозговой жилы, гдѣ слѣдующія вещи примѣчанія доспойны:
- A A. Озонашелыя чувствительныя жилы. *Olfactorii nervi.*
- a a. Ихъ сосцеобразные отростки. *Processus mammillares.*
- B B. Два протяженія первой пары чувствительныхъ жилъ. *Circa primi paris.*
- C C. Большая внутренняя вѣтвь сонной боевой жилы, соединенная съ позвоночною боевою жилкою. *Ramus carotidis internus.*
- D. Мокротная желѣза. *Glandula pituitaria.*
- E. Воронка, лѣтельному сосуду подобный промокъ въ мозгу. *Infundibulum.*
- F. Бугры, возвышенія, лежащія проходу мозга, ведущему мокроту къ воронкѣ подобному пропуску. *Qui ad infundibulum pituitam ducit.*
- G G. Отрѣзанныя чувствительныя жилы второй пары.
- H H. Начало чувствительныхъ жилъ третьей пары.
- I I. Происхожденіе чувствительныхъ жилъ четвертой пары.
- K K. Начало чувствительныхъ жилъ пятой пары.
- L L. Происхожденіе чувствительныхъ жилъ шестой пары.
- M M. Начало седьмой пары такихъ же жилъ.
- N N N.

Н Н Н. Начало спановой мозговой жилы, которая изъ черепа идетъ въ первый шейный позвонокъ.

О О. Общая вѣтвь позвоночныхъ боевыхъ жилъ, которая послѣ соединенія раздѣляется, и когда соединяется со сонною боевою жилосо СС; то подлѣ сѣдалищу подобной лобжинки клинообразной кости соспавляеиъ сѣпи подобное сосудовъ сплетеніе.

Р Р Р Р. Меньшія вѣтки бѣ-
ющихся жилъ, которыя
иные чудесною сѣпью
называютъ. Rete mirabile.

Фигура 4. изобража-
ющая меньшаго мозга
опростки.

А А. Меньшіи мозгъ. Cerebellum.

В. Червообразный сего моз-
га опростокъ.

С С С С. Опростки мень-
шаго мозга, представля-
ющіе видъ мостика. Pro-
cessus cerebelli, pontem in-
nuentes.

Д Д. Начало спановой моз-
говой жилы. Principium
medullæ spinalis.

Е. Борозда спановой моз-
говой жилы, писально-
му перу подобная.

Е. Четвертая полоса, отъ
части здѣсь открывающаяся.

Фигура 5. предста-
вляющая пенъ спановой
мозговой жилы; также
чувствительныя, отъ
оной происходящія, жи-
лы.

А. Пенъ, пуловыще, спволъ
низходящей спановой
мозговой жилы, которая
здѣсь такъ представле-
на, какъ на нее гладѣть
можно со стороны раз-
рубленной спановой ко-
сти.

В В. Вѣтви, происходящія
изъ прехъ шейныхъ, да
двоихъ грудныхъ поз-
вонковъ, раздѣльныя по
рукъ.

В В. Опростки, идущіе къ
лопаткѣ.

С С. Первая пара ручныхъ
чувствительныхъ жилъ.
D D.

- | | |
|--|--|
| <p>DD. Вторая пара такихъ же жилъ.</p> <p>EE. Третья пара.</p> <p>FF. Четвертая пара.</p> <p>GG. Пятая пара.</p> <p>HH. Шестая пара, которая иначе еще называлась заочною парю чувствительныхъ жилъ.</p> <p>III. Пара между ребреныхъ чувствительныхъ жилъ, изъ коихъ впрочемъ двѣ простираются къ поясницѣ.</p> | <p>K. Первая пара, идущая къ ногѣ.</p> <p>L L. Вторая пара.</p> <p>M M. Третья пара чувствительныхъ ножныхъ жилъ.</p> <p>N N. Четвертая и самая большая пара.</p> <p>O. Самые малинкія спановой чувствительной жилы въшки, которыя распростираются къ мочевою пузырю, ягоднишныхъ мышцахъ и дѣшороднымъ часнямъ обоего пола.</p> |
|--|--|










PLATE 1



Таблица девятнадцать, представляющая глазъ со всѣми его спавными частями и мышцами.

Фигура 1. изображающая наружныя части глаза.

А А. Поднимающая верхнее глазное веко мышца. *Elevator palpebrae superioris.*

В. сухая жила, здѣсь тонко распростертая.

В С. Рѣсничники глазныхъ векъ. *Tarfi palpebrarum.*

С. Слезное место во внутреннемъ углу глаза. *Lacrymula lacrymalis in angulo interno.*

д д. Слезеночивыя точки. *Puncta lacrymalia.*

Е. Вышній уголъ глазного века.

Фигура 2. представляющая глазной жиръ и прочая.

А А. Жиръ, лежащій позади глазъ.

В В. Глазные мышцы, здѣсь неопредѣленные.

С С. Часть Глазныхъ мышцъ, сухими жилами покрываемая.

Фигура 3. представляющая глазныя мышцы.

А. Прямая, глазъ поднимающая мышца. *Rectus elevator oculorum.*

а а а &. Чувствительныя жилы, производящія

движущую силу и чувство въ мышцахъ.

В. Прямая глазъ опускающая мышца. *Rectus oculum deprimens.*

С. Прямая глазъ приводящая мышца. *Rectus oculum adducens.*

Д. Прямая отводящая глазъ мышца. *Rectus abducens oculum.*

Е. Низшая косая мышца, коея сухая жила вкупѣ съ послѣдующею тонкою опчасни опдѣлена.

Е. Вышшая косая мышца.

Г. Блокъ той же мышцы. *Trachlea obliqui superioris.*

Н. Твердая оболочка, позади глазъ облекающая. *Sclerotica, a tergo oculum velans.*

И. Часть зрительной чувствительной жилы, въ глазъ проникающей.

Фигура 4. изображающая овечей глазъ, дабы представитъ въ немъ ту верхнюю мышцу, коея у человека не находится.

А. В. С. Д. Четыре прямые мышцы.

Е. Низшая косая мышца, здѣсь широкою представленная.

Г. Тонкая Вышшая косая мышца.

Г.

Г. Блокъ той же мышцы.

Н. Седьмая, у скотовъ находящаяся мышца, которая глазъ привлекаетъ.

І. Задняя часть глаза, сухою мышечною жилою покрываемая.

К. Часть зрительной чувствительной жилы, въ седьмой мышцѣ заключающаяся.

Фигура 5. прочія части глаза представляющая.

А. В. С. D. Липеры сѣи то же означающѣ, что на предѣдущей фигурѣ.
а а а а. Общая оболочка, безъименною называемая. *Innominata*.

в в. Райку подобный кружечикъ или плевочка, связывающая роговую плеву видимая. *Iris, trans corneam apprens.*

Фигура 6. представляющая плевы глазныя.

А А А. Разрѣзанная твердая глазная оболочка. *Sclerotica difsecta*.

В. Рогоподобная оболочка. *Cornea*.

С. Часть зрительной чувствительной жилы.

Фигура 7. представляющая внутреннія оболочки глаза.

А. Ягодная, ягоднишная плева, оболочка. *Uvea*.

а. Зѣница, дыра помянутой плевы. *Pupilla*.

В В. Волокнистая связка, рѣсницѣ подобная связка съ распростертыми волокнами. *Ligamentum ciliare, cum fibris exporrectis*.

С С. Черная лигосоставная плева. *Choroides nigricans*.

Фигура 8. изображающая сѣпи подобную плеву въ глазѣ.

А А. Сѣпчатая плева. *Retiformis tunica*.

а а. Разрывъ оныя надъ сводо подобной плевѣ, котораго то есть разрыву по причинѣ мягкости избѣжать невозможно при отдѣленіи сѣпчатой пленки.

В В В. Лигосоставная оболочка, здѣсь неотдѣленная. *Choroides nondum separata*.

С С С. Толстоюна твердой оболочки.

Д. Остатокъ зрительной чувствительной жилы.

Фигура 9. изображающая глазныя влаги, коихъ числомъ три поспавляющѣ Анапомики.

А. Крысталловидная влага, въ нѣдрѣ стекловидной содержимая. *Humor crystallinus*.

В В. Слѣзы рѣсничныхъ волоконъ.

С С. Стекловидная влага. *Humor vitreus*.

Д Д. Водяная влага, окружающая стекловидную влагу. *Humor aqueus, vitreo circumfus.*






PLATE 1




Таблица двадцатая, изображающая какъ внѣшнія уши съ ихъ мышками и хрящами, пакъ и внутреннее главнѣйшее орудіе слуха или слышанія, и слѣдственно всѣ его впадины, косточки, проходы и чувствительныя жилы пакъ, какъ искуснымъ разсѣченіемъ во взрослыхъ по изслѣдовавъ и представивъ глазамъ возможно.

Фигура 1. изображающая ухо съ его наружными частями.

A A. Передній завитокъ уха. *Helix*.

B B. Задній завитокъ уха. *Anthelix*.

C. Передущекъ. *Tragus*.

D. Задній завитокъ уха. *Anthitragus*.

E. Доля вѣшного уха.

F F. Раковина вѣшного уха. *Concha*.

G G. Впадина, лобжина между передними ушными завитками, нынѣ называемая ладьею. *Scapha*.

H. Мышка, вверхъ прямо ухо поднимающая. *Angicula m. fursum tollens m. scula*.

I I I. Мышица, при сухія жилы имѣющая. Сія мышка влечетъ косо ухо вверхъ, и кромѣ сего на три доли раздѣляется. *Musculus oblique tollens auriculam*.

Фигура 2. изображающая задней видъ уха.

Часть IV.

A A. Кожа съ перепонкою вверхъ и внизъ по разрѣзаніи проведенная.

B B. Хрящъ, составляющій ухо. *Cartilago, constituens aurem*.

C. Дира, отверзающаяся въ слуховой проходъ.

D. Частница ушной наружной связи.

E. Частница ушка.

Фигура 3. представляющая внутренній видъ уха.

A. Часть височной кости, составляющая каменистый отростокъ. *Processus petrosus*.

B. Слуховой проходъ. *Meatus auditorius*.

C. Порогъ, слухового прохода. *Limen meatus auditorii*.

D. Соцеобразный отростокъ. *Processus mastoideus*.

E. Шилообразный отростокъ, заѣвъ отломленный. *Styliformis processus*.

Фигура 4. изображающая, кость предидущей

III

щей

щей фигуры, въ которой слуховой проходъ пилкою разрёзанъ съ тѣмъ, что бы видѣть можно было барабанную перепонку или кожу.

А А. Слѣдъ слухового прохода.

В В. Перепонка слухового барабана. *Membrana tympani*.

С. Видимая сквозь перепонку ножечка молотку подобной слуховой кости. *Mallei pars*.

Д. Сосцеобразный опростокъ.

Е. Придѣлочка шиловидная. *Styiformis appendix f. processus*.

Фигура 5. изображающая внутреннія ушныя мышцы.

А. Мышка, барабанную перепонку съ косточкою, молоточку подобною напередъ движущая. *Musculus, extrosum movens*.

В. Кожица, перепонка слухового тимпана. *Membrana tympani*.

С С. Мышица, назадъ влекущая перепонку барабана вкупѣ съ молоточкомъ.

С. Головка молоточка. *Capitulum malleoli*.

Фигура 6. представляющая внутреннее

спроеіе слуховаго орудія.

А. Часть слуховаго прохода, идущая къ тимпану.

В С. Тимпанная или барабанная впадина или полость. *Cavitas tympani*.

В. Овальная, яйцеобразная дыра, которую видѣть можно по спаденіи стременивидной слуховой косточки. *Foramen ovale, remotum ita pede confpicuum*.

С. Круглая дыра той же полости.

Фигура 7. представляющая камениспый опростокъ височной кости, вкупѣ съ барабанными косточками въ натуральномъ ихъ положеніи.

А. Молотокъ, косточка молотку подобная. *Malleolus*.

В. Косточка, на наковальню похожая. *Incus*.

С. Вишшая часть стременивидной косточки.

Д Д. Излучины слуховой улитки, которыя здѣсь въ натуральной изображены величинѣ.

Фигура седьмая же, представляющая слуховыя

выя косточки, внѣ ихъ естественнаго положенія.

А. Молотокъ съ двумя отростками, короткимъ то есть и длиннымъ, котрой описалъ Фабрицій Акванденскій, и другіе подобные ему сочинители.

В. Наковальня, соединенная съ молодкомъ. Incus.

С. Спремено. Stapes.

Малинькая косточка, соединенная со связкою спременовидной кости.

Фигура 8. изображающая низшей видъ височныхъ костей.

А А. Части, гусиныхъ перьевъ видъ имѣющія, пронизующія въ конечный проходъ слуха чрезъ проходъ, идущій къ устному небу. Реппѣ aperire.

В В. Тотъ же проходъ, нѣсколько разломанъ.

Фигура 9. представляющая слуховую раковину, со всѣми ея принадлежностями.

А А. Полость или впадина, слуховой раковины, коея пространнѣйшая часть идетъ къ Лавиринеу.

В В. Впадина Лавиринеа, гдѣ ящеобразная дѣла

по причинѣ разломанія кости съ боку учиненнаго, представляется арбнѣю: чепыре другія дыры, опровергающіяся въ полости, полукруглымъ подобныя, заѣсь черными красками изображенныя: пѣная въ послѣднемъ кругѣ или послѣдней и злучинѣ слуховаго блока или улитки разломанна. Чпожъ касается до обѣихъ впадинъ; то естли кто желаетъ видѣть ихъ такъ, какъ онѣ находятся въ зародышѣ; то шѣ долженъ смотрѣть таблицу шу, гдѣ предлагается о зародышѣ и его частяхъ.

Фигура 10. изображающая первую скважину височной кости и прочая.

А А. Начало прохода височной кости, въ копорую входитъ слуховая чувствительная жила.

В В. Каменистый отростокъ височной кости, гдѣ вышепоказанныя содержатся впадины и полости.

Фигура 11. изображающая конецъ слуховаго прохода и прочая.

А В С D. Конецъ прохода, къ копорому простирается

ется слуховая чувствительная жила, представляющаяся глазамъ по разрѣзаніи пилою кости.

В. Лобжина, въ которой мягкая часть слуховой жилы содержится при самомъ центрѣ блока или зашеишной ушной раковины.

С. Придѣпочка, выдававшаяся наподобіе мостика межъ обѣихъ частей чувствительной слуховой жилы.

Д. Другая лобжина, изъ которой чрезъ дыру, видную здѣсь по причинѣ разломленія кости, древними слѣпою называемую, а фаллопеемъ воднымъ протокомъ именуемую, (aquæ ductus) проходитъ косо часть слуховой чувствительной жилы та, которую Анастомикки жестчею или твердѣйшею называютъ. Portio durior.

Е. Е. Два слѣда полукруглыхъ круговъ; ведущія къ Лавиринеу, кои сморщивъ должно на восьмой таблицѣ.



Фигура 12. изображающая, часть височныхъ костей, гдѣ по разломаніи слухового прохода, и уничиженіи тимпана представляются глазамъ слѣдующія явленія:

А. А. Мягкая часть слуховой чувствительной жилы. Portio mollior nervi auditorii.

В. В. В. Твердая часть той же жилы, которая подъ тимпаномъ косо выпускается и при исходѣ становится толще.

С. С. Жилочка, спѣ четвертой пары происходящая и соединяющаяся съ низходящею твердѣйшею частицею слуховой жилы.








Таблица двадцать первая, представляющая строение и связь всѣхъ частей человѣческаго тѣла, которое строение и связь обыкновенно называющъ скелетомъ или костякомъ. Гдѣ представляющяся непомко кости какъ вообще, такъ и въ особливости; но и изображается ихъ естественное положеніе, фигура и взаимнообразное соединеніе помощію связокъ различного рода.

Фигура 1. изображающая скелетъ.

А А. Внутренній видъ обѣихъ лопатокъ. *Scapulae utriusque internum latus.*

В В. Обѣ дужки, или грудныя распорки. *Clavicula utraque.*

С С. Раменныя или ручныя кости. *Ossa humerorum.*

а а. Голова раменной кости.

б б. Вышній наростъ или горбокъ обѣихъ раменныхъ костей. *Tubercula.*

с с. Внутренніе горбочки.

Д Д. Локопная кость, называемая лучемъ или лучеобразною костью. *Radius.*

Е Е. Настоящая локопная кость, называемая прямо локомъ. *Ulna.*

Ф Ф. Восемь кисточекъ ручнаго запястья. *Ossa carpi.*

Г Г. Большой палецъ, изъ трехъ костей состоящій. *Pollex.*

Н Н. Пастъ у руки, составленная изъ четырехъ костей. *Metacarpus.*

І І. Четыре пальца, изъ коихъ каждый состоитъ изъ трехъ кисточекъ.

К К. Бедра или голени. *Femora, tibiae.*

Л Л. Чашка на коленѣ. *Patella.*

д д. Голова бедренной кости, иначе вышнюю приушковою называемая. *Caput femoris.*

е е. Шея той же кости.

ф ф. Большой коловоротъ на бедрѣ. *Trochanter major.*

г г. Меньшій коловоротъ. *Minor rotator.*

н н. Нижнія бедреннокостныя приушочки или головки. *M. M.*

М М. Ость голени, оба берца или берцовыя кости. *Tibia utraque.*

Н Н. Дудошная кость. *Fibula.*

І І. Внутреннія лодыжки. *Malleoli interni.*

К К. Внешнія лодыжки.

О О. Семь косточекъ, спереди видныхъ ножнаго заплюстья. *Septem ossa.*

Р Р. Пять косточекъ ножной плюсны. *Quinque Ossa metatarsi.*

Q Q. Кости, составляющія пальцы.

•• &. Прицѣпочки раменной кости, локошной кости, бедренной кости и берца, опъ прочихъ костей черною линейкою отдѣленные.

Фигура 2. изобращающая лопатку и основую кость, съ коими раменная, локопныя и ручныя кости соединяются.

А. Левая основная кость.

а. Основной кости лобжина, по средствомъ которой соединяется она съ грудною костью. *Cum sterno.*

б. Другая конечность основной кости, помощію которой соединяется она со спиннымъ лопатковымъ отросткомъ.

В. Лопатка. *Scapula.*

с. Короткій лопатковый отростокъ, воспріемлющій ramo.

д. Лопатковый на вороновъ носъ похожій отростокъ, здѣсь нѣсколько видимый. *Coracoides processus.*

е. Спинный, на остъ похожій лопатковый отростокъ. *Processus spinosus.*

ф. Вышшій уголъ.

г. Низшій уголъ.

h h. Основаніе лопатки. *Vasis scapulae.*

С. Раменная позади видимая кость.

ф. Большая или вышшая лобжина раменной кости. *Sinus superior humeri.*

г. Назадъ закрывленный локопный отростокъ. *Ulnæ processus recurvus.*

Д. Локопная кость. *Os ulnæ.*

Е. Лучевая кость. *Radius os.*

Ф. Внешній видъ запястья ручнаго. *Facies externa carpi.*

Г.

С. Мѣсто ручной пастпи, изъ чепырехъ костпочекъ состоящей. *Metacarpī regio.*

Н. Большой, изъ трехъ костпочекъ состоящій, палецъ. *Pollex.*

II. Рядъ пальцевъ. *Phalax digitorum.*

Фигура 3. изображающая восемьъ костей ручнаго запястья, которыя здѣсь изображены по больше сѣпѣмъ, что бы ихъ лучше узнать и одну отъ другой отличать можно было.

Фигура 4. изображающая подвздошнія кости, соединенныя сѣ сѣдалищными и лобковыми костями вкупѣ сѣ ладвейными, берцовыми и ножными костями.

А. Внѣшній видъ подвздошной кости. *Ossis ischii externa facies.*

В. Ея впадина, укосуницею именуемая, которая содержитъ голову ладвейной кости. *Acetabulum, caput femoris continens.*

С. Ладвейная кость позади видная.

а. Вышняя прицѣпочка. *Arpēdix superior.*

б. Большой коловращатель. *Trochater major.*

Δ. Жесткая линія ладвейной кости. *Alpega linea femoris.*

с. Меньшій коловращатель. *Minortroetanter.*

d. Задняя бразда или лобжина низшей прицѣпочки.

е е. Головки низшей прицѣпочки.

f. Возвышеніе или горбокъ берцовой кости.

D. Позади видимая берцовая кость. *Tibia posterius confusa.*

г. Лодыжка внутренняя. *Malleolus internus.*

Е. Дудѣшная кость. *Fibula.*

h. Внѣшняя лодыжка. *Externus malleolus.*

* г. Прицѣпочки берцовой кости.

Г. Заплюснѣе. *Tarsus.*

Г. Плюсна ножная. *Metatarsus.*

Н. Большой палецъ, изъ двухъ костпочекъ состоящій. *Pollex.*

Фигура 5. изображающая подробнѣе косточки ножнаго запястка или запялюсныя.

А. Таранная кость. Astragalus.

В. Сступенная кость, пяшу составляющая. Calcaneum.

С. Ладьеобразная кость. Scaphoideum seu simboforme os.

Д. На кубъ похожая кость. Cubiforme os.

Е Е Е. Три прочія клинообразныя кости. Tria cuneiformia ossa.

Фигура 6. изображаетъ большія и меньшія сочевицеобразныя косточки. Sessamoidea officula.

Фигура 7. Вышшую часть бедренной кости, вкупѣ съ яминою или вершлугомъ подвздошной кости, воспріемлющемъ голову кости лядвейной.

а а. Широкая связка. Ligamentum latum.

Сїа связка окружаетъ членосоединеніе, но здѣсь она разрѣзана.


б. Связка, проведенная отъ оградаы.

с с. Берцовыя лобжины или впадины, содержащія лядвейную кость.

д. Колесцо, чашка коленная. Patella.

Здѣсь она виситъ на небольшой частицѣ сухой жилы.





XXVII



XXVIII



Таблица двашцать вторая, представляющая
мышцы, принадлежащія къ рамамъ или плечамъ,
локтямъ и самымъ рукамъ, посредствомъ коихъ
человѣкъ разныя дѣйствія производить въ со-
спояніи.

Фигура 1. изобража-
ющая мышцы, къ ру-
камъ принадлежащія.

A. Поднимающая рамена
мышца, отдѣленная
отъ своего мѣста. Del-
thoides musculus.

B. Нижелопатковая мыш-
ца. Infrascapularis mus-
culus.

C. Меньшая круглая мыш-
ца. Minor rotundus.

D. Большая круглая мыш-
ца. Major rotundus.

E. Грудная мышца, отъ
груди отдѣленная. Pec-
toralis.

F. Мясистая часть про-
страннѣйшей спинной
мышцы. Portio latissi-
mi dorsi.

G. Двуглавная мышца.
Biceps.

H. Меньшая, поднимающая
плечо мышца.

I I. Ручная, подъ двуглавною
находящаяся, мыш-
ца. Brachialis.

K. Ладонная мышца. Pal-
maris.

L L. На взнучь обращающая
лучевую кость мышца.
Supinator.

M. Внѣшная, загибающая
ручное запястье, мыш-
ца. Flexor carpi exten-
sus.

N. Такая же внутренняя
мышца.

O. Сгибающая второе чле-
носоединеніе перстовъ
мышца.

P. Такая же мышца треть-
яго состава перстовъ.

Q. Сгибающая первый со-
ставъ большого перста
мышца въ натураль-
номъ положеніи.

R. Такіе же мышцы, сги-
бающія второй составъ
большого перста также
въ натуральномъ по-
ложеніи.

S. Отводящая мизинецъ мышца. *Abductor minimi digiti.*

а а. Внутренний видъ лопатки.

b. Сухая жила ладонной мышцы. *Tendo palmaris muscoli.*

c. Часть сухой жилы, сгибающей претий составъ большого перста.

d. Связка ручного запястья въ натуральномъ положеніи. *Ligamentum carpi in situ.*

Фигура 2. изображающая прочія ручныя мышцы.

A. Меньшая мышца, поднимающая плеча. *Minor, attolens humerum.*

B. Цѣлая ручная мышца. *Brachialis integer.*

C. Круглая, на взничь обращающая лучеобразную ручную кость, мышца. *Teres pronator radii.*

D. Склоняющая претий составъ большого перста мышца въ своего положенія.

E. Четверосторонняя, на взничь обращающая руч-

ной лучъ, мышца. *Quadratus pronator radii.*

F. Сгибающая первый составъ большого перста въ положенія.

G. Тая же мышца въ второго состава большого перста.

а а. Внутренний бокъ лопатки.

b. Плечевая или ручная кость. *Os humeri.*

c. Лучевая кость. *Os radii.*

d. Локотная кость. *Os ulnæ.*

е е. Перепончатая связка локтя и лучевой кости.

f f f f. Мышцы, вообще приводящими называемыя.

g h. Особенная отводящая мизинецъ мышца.

Фигура 3. изображающая лопатковыя мышцы.

A. Первая надлопаточная мышца. *Suprascapularis primus.*

B. Другая така же мышца.

C.

- | | |
|--|--|
| <p>С. Круглая меньшая мышца. <i>Minor rotundus</i>.</p> <p>Д. Большая круглая же мышца. <i>Rotundus major</i>.</p> <p>Е. Длинная протягивающая локоть мышца.</p> <p>Г. Короткая, распягивающая локоть, мышца.</p> <p>Г. Внутренняя, распягивающая ручное запястье, мышца.</p> <p>Н. Внешняя такая же мышца.</p> <p>И. Особенная, отводящая большой палец, мышца.</p> <p>К. Соединенная протягивающая второй и третий составъ пальцевъ, мышца.</p> <p>Л. Распягивающая третий составъ большого пальца мышца.</p> <p>М. Протягивающая первый составъ большого перста мышца.</p> <p>а а. Остеобразный отростокъ лопатки. <i>Processus spiniformis</i>.</p> <p>ж. Протягивающая локоть мышца. <i>Anconæus</i>.</p> <p>ь б. Раменная, ручная кость. <i>Os humeri</i>.</p> | <p>с. Внешний горбокъ раменной кости. <i>Extremum tuberculum humeri</i>.</p> <p>д. Внутренний горбокъ той же кости.</p> <p>е. Протягивающая связи мышца.</p> <p>ff &. Сухія жилы, прикрѣпляющіяся къ каждымъ составамъ.</p> <p>г. Последняя или задняя связка ручного запястья, колцеобразнымъ называемая. <i>Ligamentum annulare</i>.</p> <p>Фигура 4. изображающая внешний видъ лопатки.</p> <p>А. Внешний видъ лопатки.</p> <p>В. Обнаженная раменная кость, съ которой надкостная снята плечовка. <i>Perioftio nudum</i>.</p> <p>С. Лучная кость. <i>Os radii</i>.</p> <p>Д. Локотная кость. <i>Os ulnæ</i>.</p> <p>Е. Длинная навзничъ обращающая чувевую кость мышца.</p> <p>Г. Распягивающая локоть мышца. <i>Anconæus</i>.</p> <p>Н.</p> |
|--|--|

Н. Перепончатая связка луч-
ной локотной кости.
*Ligamentum membrane-
um radii et ulnæ.*

III. Три между костями
мышцы. *Tres interossei
musculi.*

К. Отводящая большой
палецъ мышца.

Фигура 5. изобража-
ющая послѣднія руч-
ныя мышцы.

А. Проведенная мышца.
Perforatus musculus.

а а. Ея сухія жилы. *Ten-
dines ejus.*

В. Прободающая мышца.
Perforans.


в в. Ея сухія жилы, про-
ходящія сквозь разсѣ-
дину вышепомянутой
мышцы.

С С С. Червообразныя мы-
шцы, сгибающія пер-
вый рядъ перстовъ. *Lum-
bricales musculi.*

Д Д. Сгибающая большой
палецъ въ натуральномъ
положеніи мышца.

с с. Частица сухой жилы,
третьей составъ боль-
шого перста склоняющей.








Таблица двадцать претія, представляющая
мышцы бедренныхъ, берцовыхъ и ножныхъ ко-
стей, помощію которыхъ разныя производятся
движенія, самое природою опредѣленные.

Фигура 1. изображаю-
щая всѣ подвздошныя
и ножныя мышцы.

А. Большая часть лопаточес-
кой, напередъ плуви-
це склоняющей, мышцы.
Portio musculi, psoas dis-
ti.

Сію мышцу лучше видѣть
можно, и въ натураль-
номъ ея положеніи
выше, а здѣсь она отъ
своего отдѣлена мѣста
и соединена со внутрен-
нею подвздошною мыш-
цею.

В. Внутренняя подвздошная
мышца. *Iliacus internus.*

С С. Треугольная нѣсколько
открытая мышца, ко-
торую слѣдующая фи-
гура цѣлою предствл-
яетъ. *Triceps musculus.*

Д. Сильная, гребенною еще
называемая мышца, ко-
торая движетъ лядвен-
ную кость. *Lividus f.*
pectinæus musculus.

Е. Перепончатая мышца.

Ф Ф. Прямая мышца. *Rec-*
tus musculus.

Г. Пространная, широ-
кая вѣшняя мышца.
Vastus.

Н Н. Пространная же ши-
рокая мышца, но ея
есть внутренняя мышца.
Internus vastus.

І І. Разпяденая, или пле-
чочная мышца, двига-
ющая берцо. *Fascialis*
musculus live arenevro-
ticus.

К. Передняя берцовая мы-
шца. *Tibialis anticus*
musculus.

Л Л. Дудочная, дудочной
кости мышца. *Pero-*
næus musculus.

М М. Протягивающая боль-
шой палецъ мышка. *Ex-*
tenfor pollicis.

а а. Придѣлочка подвздош-
ной кости, спереди отъ
крытая.

б. Конечность лобковой ко-
сти.

с с с. Перепончатой мы-
шцы сухая жила. *Mu-*
sculi tendo membranei.

д д. Часть двойной или
двухначальной мышцы.
Gastrocnemii musculi par-
tio.

Сію

Сію мышцу видѣшь можно
явспениѣ, пожавши
внизъ берцовую кость,
внѣ же своего положенія
подъ претією фигурою,
гдѣ она буквами К К
изображается.

е. Перепончатая связка,
жежду берцовъ и дудо-
шною костью находя-
щаяся.

ffff. Сухія жилы претіе
членосоединеніе костей
пропятивающей мыш-
цы.

г. Поперечная отдѣленная
связка.

Фигура 2. изображаю-
щая подвздошной ко-
сти видѣ и послѣдую-
щія мышцы.

А. Внутренній видѣ под-
вздошной кости.

В. Часть большой задни-
шой или ягодичной мы-
шцы. *Glutæi portio*
majoris.

ССС. Трехглавая мышца.
Triceps musculus.

DD. Двойная мышца и
часть подошвенныхъ мы-
шцъ. *Gastrocnemii et*
portio soleorum.

ЕЕ. Берцовая задняя мы-
шца. *Tibialis posticus.*

FF. Первая согблнная
мышца. *Peroneus pri-*
mus.

Г. Пропятивающая прина-
длежащую къ ней часть
мышца. *Extensor.*

а а а а. Междукостные но-
жные опвдощія мыш-
цы. *Interossei abductores*

Фигура 3. предста-
вляющая ягодичныя и
другія мышцы.

А. Отдѣленная большая
ягодичная мышца.
Gluteus major separatus.

В. Средняя ягодичная мы-
шца въ своемъ положе-
ніи.

С. Грушевидная, или чеп-
верочастная мышца.
Pyramiformis f. quadrigem-
inus musculus.

Д. Круговращающая ляд-
вейную или бедренную
кость мышца, назы-
ваемая чепвероугольною.
Quadratus.

Е. Затыкающая, закрыва-
ющая дыру внутренняя
мышца. *Obturator in-*
ternus.

FF. Тонкая мышца. *Grac-*
ilis.

GG. Полусухожильная мы-
шца. *Semimembranosus*
musculus.

Н Н.

Н Н. Подуперепончатая мышца. *Semimembranosus musculus.*

І І І. Двуглавная мышца. *biceps.*

К К. Внизъ опведенная двойственная, или двоена-начальная мышца. *Gastrocnemius deorsum flexus.*

Съ началомъ сая мышиды соединены сущъ сочевицеобразныя косточки.

Л Л. Подошвенная мышца въ своемъ положеніи. *Soleus in suo situ.*

М. Малая подошвенная мышца.

Н. Сухая жила, отъ пяты подъ ногу протяженная.

О. Отводящая большой палецъ мышца. *Abductor pollicis.*

Р. Отводящая самой меньшей палецъ мышца. *Abductor digiti minimi.*

Q. Междукостная мышца, принадлежащая къ самому меньшему персту или мизинцу.

а а. Край подвздошной кости.

б. Мясистый кошелекъ, то есть мышца, окружающая овальную дыру подвздошной кости.

с с. Продолговатая сухая жила подошвенной мышцы.

Фигура 4. изображающая внутренній видъ подвздошной кости и прочая.

А. Внутренній видъ подвздошной кости.

В. Ягоднишная меньшая мышца въ своемъ положеніи. *Gluteus minor in suo situ.*

С. Ягоднишная средняя мышца въ своего положенія.

Д. Грушевидная мышца. *Pyriformis.*

Е. Четвероспоронная мышца. *Quadratus.*

Е. Вѣшняя закупоривающая мышца. *Externus obturator.*

Г. Внутренняя такая же мышца.

Г. Мышца, такъ называемая мясистой кошелѣкъ, о коей мы выше упомянули. *Marsupium.*

Н. Подколеночная мышца. *Popliteus musculus.*

І І. Прободающая мышца. *Perforans musculus.*

К.

К. Склоняющая претѣй
згибѣ большого перста
мышца. *Flectens ter-*
tium internodium pollicis.

Л. Прободеная мышца въ
своемъ положеніи. *Per-*
foratus in suo situ.

М. Отводящая мизинецѣ
мышца. *Abductor mi-*
nimi digiti.

Н. Отводящая большой па-
лецѣ мышца. *Abductor*
pollicis.

Фигура 5. изобража-
ющая мышцы больша-
го ножного перста.

а. Приводящая большой па-
лецѣ мышца. *Adductor*
pollicis.

б б. Отводящая большой па-
лецѣ. *Abductor pollicis.*

д д д д. Внутреннія между
костными мышцами. *Inter-*
ossei interni muscoli.

е. Меньшая проводящая боль-
палецѣ мышца.

Фигура 6. изобража-
ющая ножныя мыш-
цы.

А. Прободевшая ножная мы-
шца. *Musculus pedis*
perforatus.

В. Склоняющая претѣ чле-
носоединеніе или еоставѣ
большого перста мыш-
ца.

С. Прободеющая мышца,
склоняющая по естѣ
претѣи составѣ перста.

Д Д. Часть мышечнаго мя-
са, соединенная съ нача-
лами червообразныхъ
мышцѣ.

е е е е. Червообразныя мы-
шцы. *Lumbricales mus-*
culi.

ф ф ф ф. Между костныя мы-
шцы, екупѣ съ отвод-
ными большого пальца
и мизинца мышцами.







Таблица двадцать четвертая, представляющая кровезовратныя, боевыя и чувствительныя жилы безъ дальнѣйшаго самоменчайшихъ оныхъ изслѣдованія, могущаго пошемнить большія вѣтви и обрѣмнить память зашверживающихъ оныя.

Фигура 1. изображающая ручныя кровезовратныя жилы.

А. Подмышечная вѣтвь большой полрой жилы. *Ramus axillaris venae sauae.*

В В. Головная кровезовратная жила. *Cephalica vena.*

С С С. Внутренняя ручная, печоночная именуемая, кровезовратная жила. *Balica vena.*

а. Лопатковая вѣтвиная кровезовратная жила. *Scapularis externa.*

б. Головной жилы вѣтвь идущая къ поднимающей плеча мышцѣ.

с д. Вѣточка головной кровезовратной жилы къ локтю идущая.

е. Глубоколежащая головной кровезовратной жилы вѣтвь.

ф ф. Внутренняя вѣтвь кровезовратной головной жилы, состоящая изъ части среднюю локтевую жилу. *Mediana constituens.*

г. Средняя локтевая, низъ идущая кровезовратная жила. *Mediana descendens.*

Часть IV.

h. Головная ручная кровезовратная жила. *Cephalica manns.*

і і. Вѣтвиная вѣтвь головной кровезовратной жилы.

з з. Ручная къ мизинцу идущая кровезовратная жила. *Salvatella manus.*

к. Внутренняя лопатковая кровезовратная жила.

л. Вышняя грудная кровезовратная жила и нижняя же жила.

п п п. Идущая къ сгибающимъ локтевымъ мышцамъ вѣтви внутренней кровезовратной жилы. *Basilicae rami.*

о о. Глубоколежащая вѣтвь помянутой жилы.

р. Особенное продолженіе помянутой вѣтви, соединяющейся съ четвертою парю чувствительныхъ къ локтю нисходящихъ жилъ.

q. Вѣтвиная вѣточка глубоко лежащей вѣтви внутренней ручной жилы.

г. Внутренняя вѣточка помянутой вѣтви.

f. Зажоженная вѣтвь внутренней ручной жилы. *Subcutaneus basilicae ramus.*

t t. Помянутой вѣтви внутренней кровезовратной

Щ

ная жила составляющая съ головою шакую же жилую срединною локотною крововератную жилу.

и и. Продолженіе вышписанной жилы.

х. Внѣшняя крововератная жила закою вѣтви внутренней ручной крововератной жилы.

у у. Большая оспрадь закою вѣтвей вѣтви.

з. Той же вѣтви меньшая оспрадь.

Фигура 2. изображающая боевыя жилы, по рукѣ разсѣяныя.

А. Вѣтвь подмышечной боевой жилы. *Arterix garmos subaxillaris*.

а. Внутренняя бѣгущая лопаточная жила. *Scapularis interna arteria*.

б. Такая же вѣтвей вѣтви.

в. Вышняя грудная бѣгущая вѣтвь. *Thoracica superior*.

д. Такая же низшая жила.

е f g. Вѣтви бѣгущей жилы, разсѣяныя по мышцамъ, къ раму принадлежащимъ.

h h. Вѣтви бѣгущей жилы, разсѣяныя по членосоединенію локтя.

В. Внѣшняя на локтѣ вѣтвь бѣгущей жилы.

С. Внутренняя той же жилы вѣтвь.

и i. Продолженіе той же жилы, идущей къ локотнымъ мышцамъ.

к. Продолженіе той же самой бѣгущей жилы, идущее къ локотнымъ мышцамъ.

l m n o. Продолженіа отъ внутренней вѣтви проспирующіяся къ ручному запястью, мизинцу, колѣночному палцу и среднему палцу же.

р р. Продолженіа, отъ вѣтвей вѣтви къ послѣднимъ частямъ руки идущія.

q q r f. Продолженіа, проспирующіяся къ большому палцу, также указательному и среднему палцамъ.

Фигура 3. изображающая чувствительныя жилы, по рукѣ разсѣяныя.

4. 5. 6. 7. Четыре шейныхъ позвонковъ.

г. Первый грудной, къ груди то есть принадлежащій, позвонокъ.

а b c d e. Пять вѣтвей чувствительныхъ жилъ, изъ позвоночныхъ дѣръ происходящихъ.

f f. Первая пара чувствительныхъ жилъ, низходящая отъ сплетенія жилъ, означеннаго крестами ++.

g g. Вторая пара.

h h. Третья пара.

i i. Четвертая пара.

k k. Пятая пара.

l l. Шестая пара чувствительныхъ жилъ, которая подъ кожей находилась.

Фигура

Фигура 4. изображающая ножныя кровезо-
вратныя жилы.

А. Головная вѣтвь полой
большой жилы. *Ramus*
caput venae cruralis.

а а а. Внутренняя явная
голенная, ко внутрен-
ней лодыжкѣ идущая
кровоизвратная жила.
Saphena.

б б б. Вѣтви сея жилы,
разсѣявшіяся по вну-
треннимъ частямъ ля-
двей.

с с. Сѣдалищная кровезо-
вратная жила. *Ischiadica*
vena.

д д. Внутренняя вѣтвь по
мышкамъ раздѣлившей-
ся кровезоизвратной жи-
лы.

е е. Внѣшняя мышковая кро-
везоизвратная жила.

ф ф ф. Подколѣнная кровезо-
извратная жила, изъ двухъ
источниковъ приходя-
щая. *Poplitea.*

г г. Внутренняя вѣтвь го-
ленной или берцовой кро-
везоизвратной жилы.

н н. Той же жилы внѣшняя
вѣтвь.

і. Первое продолженіе внѣ-
шней вѣтви.

к к. Второе такое же про-
долженіе.

ІІ. Остальная часть берцо-
вой вѣтви.

т. Можная сѣдалищная жи-
ла. *Vena ischias pedis.*

Фигура 5 изображаю-
щая боевыя ножныя жи-
лы.

А А А. Берцовая или голен-
ная бѣгущая жила. *Ar-*
teria cruralis.

а. Бѣгущая дѣтородного
члена жила. *Pudenda*
arteria.

б. Бѣгущая жила, прости-
рающаяся по внутрен-
ней подвздошной мыш-
цѣ.

с. Бѣгущая сѣдалищная
жила. *Arteria ischias.*

д. Внѣшняя мышковая жи-
ла.

е. Внѣшняя такая же жила.

ф ф ф. Бѣгущія жилы, по
перепонкѣ и шуку раз-
сѣявшіяся.

г г. Подколенная бѣгущая
жила. *Subpoplitea.*

н н. Икровыя бѣгущія жи-
лы. *Surales arteriae.*

і і. Передняя вѣтвь берцо-
вой бѣгущей жилы.

к к. Первая послѣдняя или
задняя вѣтвь берцовой
бѣгущей жилы.

ІІ. Вторая вѣтвь той же
жилы.

Фигура 6. предста-
вляющая чувствитель-
ныя ножныя жилы.

2. 3. 4. 5. Четыре пояснич-
ныхъ позвонковъ.

6. 6. Крестцовая кость. *Os*
sacrum.

А. Пара чувствительныхъ
жилъ, принадлежащая
къ брюху.

В В. Первая пара чувстви-
тельныхъ но ж н ы хъ
жилъ.

с с. Вторая пара но ж н ы хъ чув-
ствительныхъ же жилъ.

а а а.

- а а а. Вѣпвь шой же жилы.
- б б б. Прочія вѣпви шой же жилы.
- Д Д. Третья пара чувствительныхъ и о ж н ы х ъ жилъ.
- Е Е Е. Четвертая пара о ж н ы х ъ чувствительныхъ жилъ, коюрая есть всѣхъ больше.
- с. Ея вѣпвь, распростерзаяся по ягодицамъ и лядеямъ.
- д д д. Вѣпви, разсѣавшіяся по сгибающихсяъ берцо мышцамъ.
- е е е. Низшія по кожѣ разсѣавшіяся вѣпочки.
- f. Вѣпвь, служащая движению подошвенной мышцы и протягивающей задюсныя мышкы.
- g h. Двѣ вѣпвїи вѣшки, къ о ж н ы м ъ перстамъ, и мышкамъ лудонной кости принадлежащія.
- i. Внутренняя вѣпвь, идущая къ большому и указательному перстамъ.
- к 1. Внутренняя вѣпви, принадлежащая совершенно и корнымъ мышцамъ.
- м. Остатокъ шесной пары, двумя вѣпвами отъ подошвы къ перстамъ простирающаея.

Фигура 7. изображающая открытую кровезоврапную мизинцевую жилу, въ коей при простыя заслоночки вверхъ подняты.


Фигура 8. изображающая разсѣченную вѣпвь берцовой жилы, дабы можно было видѣнь двойныя заслоночки и одну простую заслоночку же.

Фигура 9. и 10. изображающѣ частѣ чувствительной жилы шесной пары, на безсмѣпныя вѣпочки, такъ какъ бы на нипи раздѣленную, коими удивительныя производящя дѣйствія.

К О Н Е Ц Ъ Т А Б Л И Ц А М Ъ.







ТОМЪ I.

ПОГРѢШНОСТИ

Стран.	спрок.	напечатано	чидай.
1	—	5	анапомѣя анапомѣю
7	—	7	плѣва плева вездѣ.
92	—	11	запорникѢ запорникѢ
—	—	15	легкошныя легкошныя.
101	—	8	выпуклой, вогнушой вездѣ.
113	—	21	иремѣиѢ предметѢ вездѣ.
126	—	12	сечевицеобразное сочевидцеобразное вездѣ.
127	—	16	сѣпчашаѣ сѣпчешая вездѣ.
128	—	6	хрушталовидной кристалловидной вездѣ.
379	—	9.	бѣлѢ бѣль
391	—	17	онѣменіе онѣмѣніе вездѣ.
201	—	22	сляченонспѣ сляченность.
—	—	26	или или вездѣ.
211	—	14	боязнѣ отѢ воды водоудаленіе.
269	—	9.	преизлишества преизлишества вездѣ.
375.	Фигура 7	вышшую	показывающая бышшую.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Содержание	Листы	Всего
1. Введение	1-2	2
2. Описание	3-4	2
3. Методика	5-6	2
4. Результаты	7-8	2
5. Заключение	9-10	2
6. Литература	11-12	2
7. Приложение	13-14	2
8. Справочные данные	15-16	2
9. Заключение	17-18	2
10. Литература	19-20	2
11. Приложение	21-22	2
12. Справочные данные	23-24	2
13. Заключение	25-26	2
14. Литература	27-28	2
15. Приложение	29-30	2
16. Справочные данные	31-32	2
17. Заключение	33-34	2
18. Литература	35-36	2
19. Приложение	37-38	2
20. Справочные данные	39-40	2
21. Заключение	41-42	2
22. Литература	43-44	2
23. Приложение	45-46	2
24. Справочные данные	47-48	2
25. Заключение	49-50	2
26. Литература	51-52	2
27. Приложение	53-54	2
28. Справочные данные	55-56	2
29. Заключение	57-58	2
30. Литература	59-60	2
31. Приложение	61-62	2
32. Справочные данные	63-64	2
33. Заключение	65-66	2
34. Литература	67-68	2
35. Приложение	69-70	2
36. Справочные данные	71-72	2
37. Заключение	73-74	2
38. Литература	75-76	2
39. Приложение	77-78	2
40. Справочные данные	79-80	2
41. Заключение	81-82	2
42. Литература	83-84	2
43. Приложение	85-86	2
44. Справочные данные	87-88	2
45. Заключение	89-90	2
46. Литература	91-92	2
47. Приложение	93-94	2
48. Справочные данные	95-96	2
49. Заключение	97-98	2
50. Литература	99-100	2

Имб. 981



